

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY
580.7
D45t2

BIOLOGY



Return this book on or before the **Latest Date** stamped below. A charge is made on all overdue books.

University of Illinois Library

AUG 7 1953

NOV 19 1980

JAN 02 1985

JUN 20 2006

L161—H41

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI.

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/tableaudelcole01desf

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI,

Par M. DESFONTAINES, Membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur, Professeur de Botanique, etc.

Desfontaines, René Louiche,

SECONDE ÉDITION.

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 9.

1815.

DE L'IMPRIMERIE DE FEUGUERAY,
rue Pierre-Sarrazin, n° 11.

Reid
580.7
D45t2
Botany Library

AVERTISSEMENT.

Le Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le Jardin du Roi. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Etrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Jardin par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'Ecole de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail; M. de Lamarck m'a communiqué ses herbiers; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du Jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique, et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

447921

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau, et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte ; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité, et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine, les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'Ecole de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection des plantes vivantes cultivées au Jardin du Roi, et dont le nombre est de plus de six mille, sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe ; elle offre un champ vaste à l'étude, et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Ce Jardin est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe, d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même au-delà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol ; en un mot, cet Etablissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

Explication des abréviations et des signes indicatifs de la durée des Plantes.

Af.	Afrique.
Am. m.	Amérique méridionale.
Am. s..	Amérique septentrionale.
Ant. ...	Antilles.
As.	Asie.
As. min.	Asie mineure.
Esp. ...	Espagne.
Eur. ...	Europe.
F.	France.
F. m...	France méridionale.
Ile de F.	Ile de France.
N. Esp..	Nouvelle-Espagne.
N. Holl.	Nouvelle-Hollande.
(alim.).	Alimentaire.
(écon.).	Economique.
(méd.).	Médicinale.
(orn.)..	Ornement.
(vén.)..	Vénéneuse.

Noms d'Auteurs.

All. ped.	Allioni, Flora pedemontana.
— *Auct.*	— Auctuarium.
Andr. Rep.	Andrews, Repository.
Arduin. spec.	Arduini, Specimen.
Balbis, Add.	Balbis, Miscellanea et Additamentum ad Floram pedemontanam.
— *H. Taur.*	— Hortus taurinensis.
Beauv. Agrost.	Beauvois, Agrostographie.
Bellardi, App.	Appendix ad Floram pedemontanam.
Bill. N. Holl.	La Billardière, Novæ Hollandiæ plant. Specimen.
Bonpland, Malm.	Plantes rares de Navarre et de la Malmaison.
— *Equinox.*	— Plantes équinoxiales.
Bosc, Dict.	Dictionnaire d'Agriculture.
— *Soc. Lin. Par.*	— Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
Bot. Magaz.	Botanical Magazin.
Brotero, Fl.	Flora lusitanica.
— *Phyt.*	— Phytographia lusitaniæ Selectior.
Brown. Prodr.	Prodromus Floræ N. Hollandiæ.
Cav. Ic.	Cavanilles, Icones.
— *Diss.*	— Dissertationes.
Correa, S. Lin.	Transactions of the Linnean Society.
Crantz, Austr.	Stirpium austriacarum Fasciculi.
Curtis, Fl.	Flora Londinensis.
Cyrillo, Dec.	Plant. rariorum regni neapolitani Fasciculi.
Dec. Ann.	Decandolle, Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
— *Astr.*	— Astragalogia.

Dec. cat.	Decandolle, Catalogus plant. horti botanici Monspeliensis.
— *Fl.*	— Flore française.
Delile, Fl.	Delile, Floræ ægyptiacæ illustratio.
— *Ægypt.*	— Description de l'Egypte.
Desf. Atl.	Desfontaines, Flora atlantica.
— *Ann.*	— Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
— *Acad.*	— Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris.
Desvaux, Journ.	Journal de Botanique.
Duham. Arbr.	Duhamel, Traité des Arbres et Arbustes.
— *Ed. n.*	— Nouvelle Edition.
Dunal, Sol.	Histoire des Solanum.
Encycl.	Encyclopédie méthodique.
— *Suppl.*	— Supplément. (Poiret.)
Fl. Dan.	Flora danica.
Fl. Per.	Flora peruviana.
Forsk. Fl.	Forskahl, Flora ægyptiaco-arabica.
Gærtn.	Gærtner, de Fructibus, etc.
Good. S. Lin.	Goodnow, Transactions of the Linnean Society.
Gouan, Ill.	Illustrationes.
Guers. S. Philom.	Guersant, Bulletin de la Société philomatique.
Haw. Mesemb.	Haworth, Observations on the genus Mesembryanthemum.
H. K.	Hortus Kewensis, ed. 2ª.
Host, Gram.	Icones et Descriptiones graminum, etc.
Jacq. Amer.	Jacquin, Selectarum Stirpium americanarum Historia.
— *Austr.*	— Flora austriaca.
— *Collect.*	— Collectanea.
— *Fragm.*	— Fragmenta botanica.
— *H. Schœn.*	— Hortus schœnbrunensis.
— *Hort.*	— Hortus vindobonensis.
— *Ic.*	— Icones plantarum.
— *Miscell.*	— Miscellanea.
— *Obs.*	— Observationes botanicæ.
— *Ox.*	— Oxalis.
Juss. Ann.	De Jussieu, Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
Kœler, Gram.	Descriptio graminum.
Lambert, Pin.	A description of the genus Pinus.
Lamk, Ill.	Lamarck, Illustration des genres.
— *Journ. d'Hist. nat.*	— Journal d'Histoire naturelle.
Lapeyr. Pyr.	Lapeyrouse, Histoire des Plantes des Pyrénées.
Laroche, Eryng.	Eryngiorum Historia.
Leers, Herb.	Flora herbornensis.
L'Hérit. Corn.	L'Héritier, Cornus.
— *Ger.*	— Geranologia.

L'hérit. sert.	L'Héritier, Sertum anglicum.
— stirp.	— Stirpes novæ.
L.	Linnæus, Species Plantarum.
— mant.	— Mantissa.
— L. f.	— Filius, Supplementum.
Lois. Fl.	Loiseleur, Flora gallica.
Marsch. cauc.	Marschall, Flora Taurico-caucasica.
Mass. stap.	Masson, Stapeliæ novæ.
Mich. Fl.	Michaux, Flora boreali Americana.
Mich. Arbr.	Michaux fils, Histoire des Arbres forestiers de l'Amérique septentrionale.
— Goett.	— Commentaria Soc. Goettingensis.
Murray, S. veg.	Systema vegetabilium.
Nester, Pot.	Potentillæ genus (*manuscrit*).
Ortega, Dec.	Decades.
Pallas, Astrag.	Species Astragalorum, etc.
— Itin.	— Voyages.
— N. Act. petrop.	— Nova Acta Petropolitana.
— Ross.	— Flora rossica.
Pers. Syn.	Persoon, Synopsis.
Pollich. Palat.	Historia Plant. in Palatinatu sponte nascentium.
Pouret, Act. Tolos.	Mémoires de l'Académie de Toulouse.
Ramat. Journ. d'hist. nat.	Ramatuelle, Journal d'Histoire naturelle.
Ramond, S. phyl.	Bulletin de la Société Philomatique.
Red. Lil.	Redouté, Liliacées.
Retz. obs.	Retzius, Observationes botanicæ.
Salisb. Prodr.	Salisbury, Prodromus.
Schk. car.	Schkuhr, Histoire des Carex (*traduction*).
Schousb. Maroc.	Schousboe, Iagttagelser over vextriget i Marokko.
Schrad. Germ.	Schrader, Flora germanica.
Schreb. Gram.	Schreber, Gramina.
— spicil.	— Spicilegium.
— vert.	— Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species.
Scop. carn.	Scopoli, Flora carniolica.
— insub.	— Deliciæ floræ et faunæ insubricæ.
Smith, Fl.	Flora britannica.
— N. holl.	— A Specimen of the Botany of New-Holland.
— Pict.	— Icones pictæ.
— Soc. Lin.	— Transactions of the Linnean Society.
— spicil.	— Spicilegium botanicum.
Sonn. Itin.	Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc.
Swartz, obs.	Observationes botanicæ.
— orchid.	— Orchides.
— Prodr.	— Prodromus.
Thouin, Ann.	Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
Thuiller, Fl.	Flore des environs de Paris.
Vahl, sp.	Enumeratio Plantarum.

vahl, symb..... Symbolæ botanicæ.
wald. et kitt. hung... Waldstein et Kittaibel, Descriptiones et Icones, Plant. rariorum Hungariæ.
wendl. sert. hann..... Wendland, Sertum Hannoverianum.
vent. choix de pl..... Ventenat, Choix de Plantes.
— *h. cels*..... — Jardin de Cels.
— *inst*..... — Mémoires de l'Institut.
— *malm*..... — Jardin de la Malmaison.
vill. delph..... Villars, Histoire des Plantes du Dauphiné.
willd. enum..... Willdenow, Enumeratio Plantarum horti regii berolinensis.
— *enum. suppl*..... — Supplementum.
— *h. berol*..... — Hortus berolinensis.
— *sp*..... — Species plantarum.
viviani, fragm..... Floræ italicæ Fragmenta.

⊙..... Annuel.
♂..... Bisannuel.
♃..... Vivace.
♄..... Ligneux.
or..... Orangerie.
s. ch..... Serre chaude.

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI.

CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

CLASSE I.

ACTYLÉDONS.

Nota. Cette Classe a été supprimée du Tableau, parce que les Plantes qu'elle renferme ne sont pas susceptibles d'être cultivées.

CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

CLASSE II.

MONOCOTYLÉDONS.

ORDO I.

FILICES.

ORDRE I.

FOUGÈRES.

I. Capsulæ nudæ nec annulo cinctæ.

I. Capsules nues et sans anneau.

Ophioglossum
vulgatum *L.*

Ophioglosse
commune. F. ♃

Botrychium
Lunaria *swartz, syn.*
Osmunda Lunaria *L.*

Botrychium
Lunaire. F. ♆

Hydroglossum
japonicum *willd. H. berol.*
Lygodium japonicum *swartz, syn.*

Hydroglossum
du Japon. S. ch. ♆

OSMUNDA
regalis L.

II. Capsulæ nudæ, annulo cinctæ.

ACROSTICHUM
aureum L.
marantæ L.

CETERACH
officinarum *Willd. sp.*
Asplenium ceterach L.

POLYPODIUM.

1. *Fronde simplici.*

crassifolium L.

2. *Fronde pinnatifidâ.*

phymatodes L. *Mant.*
aureum L.
vulgare L.
cambricum L.

3. *Fronde bipinnatifidâ.*

phegopteris L.

4. *Fronde suprà-decompositâ.*

dryopteris L.

III. Capsulæ indusio velatæ.

ASPIDIUM.

1. *Fronde ternatâ.*

trifoliatum *swartz, syn.*
polypodium trifoliatum L.

2. *Fronde pinnatâ.*

lonchitis *swartz, syn.*
polypodium lonchitis L.
achrosticoides *swartz, syn.*

3. *Fronde bipinnatifidâ, indusio reniformi.*

oreopteris *swartz, syn.*
thelypteris *swartz, syn.*
polypodium thelypteris L.
molle *swartz, syn.*
cristatum *swartz, syn.*

OSMONDE
officinale. F. ♃ (méd.)

II. Capsules nues, entourées d'un anneau.

ACROSTIC
doré. Antilles. s. ch. ♃
de Maranta. F. Alpes. ♃

CÉTÉRACH
officinal. F. ♆ (méd.)

POLYPODE.

1. Feuilles simples.

à feuill. épaiss. Ant. s. ch. ♃

2. Feuilles pinnatifides.

phymatode. Inde. s. ch. ♆
doré. Antilles. s. ch. ♆
commun. F. ♆ (méd.)
lacinié. F. ♃

3. Feuilles deux fois pinnatifides.

phégoptéris. F. ♃

4. Feuillage décomposé.

dryoptéris. F. ♆

III. Capsules recouvertes d'une enveloppe.

ASPIDIUM.

1. Feuilles ternées.

trifolié. Antilles. s. ch. ♃

2. Feuilles pennées.

lonchitis. F. Alpes. ♃
faux acrostic. virginie. ♆

3. Feuilles deux fois pinnatifides; enveloppe réniforme.

oréoptéris. F. ♆
thélyptéris. F. ♆
à feuill. moll. Am. m. s. ch. ♃
à crête. Suisse. ♃

4. *Fronde bipinnatâ triplicato-pinnatâve, indusiis reniformibus.*

4. Feuilles deux ou trois fois pennées, enveloppe réniforme.

FILIX-MAS *swartz. syn.* POLYPODIUM FILIX-MAS *L.*	*Fougère mâle.* F. ♃ (méd.)
FILIX FŒMINA *swartz. syn.* POLYPODIUM FILIX FŒMINA *L.*	*Fougère femelle.* F. ♆
aculeatum *swartz. syn.* POLYPODIUM aculeatum *L.*	*à aiguillons.* F. ♃.
dilatatum *swartz. syn.*	*dilaté.* F. ♃
rigidum *swartz. syn.* fragrans *vill. delph.*	*à feuilles roides.* F. ♃
Halleri *willd. sp.* fontanum *swartz. syn.*	*de Haller.* Alpes. ♃
bulbiferum *swartz. syn.* POLYPODIUM bulbiferum *L.*	*bulbifère.* canada. ♆
fragile *swartz. syn.* POLYPODIUM fragile *L.*	*fragile.* F. ♃
rhæticum *swartz. syn.* POLYPODIUM rhæticum *L.*	*de Rhétie.* Alpes. ♆
montanum *swartz. syn.* myrrhidifolium *vill. delph.*	*des montagnes.* Alpes. ♆
ONOCLEA sensibilis *L.*	*ONOCLEA* *sensible.* AM. S. ♆
ASPLENIUM septentrionale *willd. sp.* ACROSTICHUM septentrion. *L.*	*ASPLENIUM* *du nord.* F. ♆
marinum *L.*	*maritime.* F. ♆
acrostichoides *swartz. syn.*	*faux Acrostic.* AM. S. ♆
TRICHOMANES *L.*	*Trichomanes.* F. ♃
furcatum *swartz. syn.*	*cunéiforme.* cap. or. ♆
RUTA-MURARIA *L.*	*Rue des murailles.* F. ♃ (méd.)
ADIANTUM-NIGRUM. *L.*	*capillaire noir.* F. ♃ (méd.)
SCOLOPENDRIUM officinarum *swartz. syn.* ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM *L.*	*SCOLOPENDRE* *officinale.* F. ♃ (méd.)
BLECHNUM occidentale *L.*	*BLECHNUM* *d'occident.* INDE. S. CH. ♆
boreale *swartz. syn.* osmunda spicant *L.*	*du nord.* F. ♆
WOODWARDIA radicans *swartz. syn.*	*WOODWARDIA* *prolifère.* ITALIE. OR. ♃
PTERIS aquilina *L.*	*PTERIS* *Fougère commune.* F. ♆
arguta *swartz. syn.*	*à feuill. en scie.* CANAR. OR. ♃
serrulata *L.*	*crénelée.* INDE. S. CH. ♆

cretica L.	*de Crète.* or. ♄
longifolia L.	*à f. long.* antill. s. ch. ♆
crispa *swartz. syn.* / osmunda crispa L.	*crépue.* Alpes. ♄
CHEILANTHES	*CHEILANTHE*
odora *swartz. syn.* / polypodium fragrans *desf. atl.* / pteris acrosticha *balbis. add.*	*odorant.* f. m. or. ♄
ADIANTUM	*ADIANTUM*
reniforme L.	*réniforme.* canaries. or. ♆
pedatum L.	*de Canada.* ♆ (méd.)
capillus-veneris L.	*de Montpellier.* ♆ (méd.)
DAVALLIA	*DAVALLIA*
canariensis *swartz. syn.* / trichomanes canariense L.	*des Canaries.* or. ♄
ORDO II.	***ORDRE II.***
RHIZOSPERMÆ.	**RHIZOSPERMES.**
PILULARIA	*PILULAIRE*
globulifera L.	*à globules.* f. ♆
MARSILEA	*MARSILEA*
quadrifolia L.	*à quatre feuilles.* f. ♆
ORDO III.	***ORDRE III.***
CICADEÆ.	**CICADÉES.**
ZAMIA	*ZAMIA*
pumila *encycl.* (non *Lin.*)	*nain.* Am. s. s. ch. ♄
furfuracea *willd. sp.*	*furfuracé.* inde. s. ch. ♄
integrifolia *jacq. ic.*	*à feuill. entières.* inde. s. ch. ♄
spiralis. *salisb. prodr.*	*en spirale.* N. holl. s. ch. ♄
tridentata *willd. sp.*	*tridenté.* N. holl. s. ch. ♄
CYCAS	*CYCAS*
circinalis L.	*en éventail.* inde. s. ch. ♄
revoluta *Thunb. Jap.*	*roulé.* Japon. s. ch. ♄
ORDO IV.	***ORDRE IV.***
EQUISETACEÆ.	**ÉQUISÉTACÉES.**
EQUISETUM	*PRÊLE*
arvense L.	*des champs.* f. ♆
sylvaticum L.	*des bois.* f. ♄
palustre L.	*des marais.* f. ♄
fluviatile L.	*des rivières.* f. ♄

limosum L.
hyemale L.

limoneuse. F. ♄
d'hiver. F. ♄

ORDO V.

NAIADES.

HIPPURIS
vulgaris L.

CHARA
vulgaris L.
tomentosa L.
flexilis L.

CERATOPHYLLUM
submersum L.
demersum L.

NAIAS
major *Dec. Fl.*
monosperma *Willd. sp.*
minor *Dec. Fl.*
caulinia fragilis *Willd. sp.*

SAURURUS
cernuus L.

POTAMOGETON
natans L.
perfoliatum L.
densum L.
lucens L.
crispum L.
compressum L.
pectinatum L.
gramineum L.
pusillum L.

RUPPIA
maritima L.

ZANICHELLIA
palustris L.

CALLITRICHE
verna L.
— angustifolia
— autumnalis L.

LEMNA
polyrhiza L.
minor L.
— gibba L.
trisulca L.

ORDRE V.

NAIADES.

HIPPURIS (onagraires. *decand.*)
aquatique. F. ♄

CHARA
commun. F. ☉
cotonneux. F. ☉
flexible. F. ☉

CERATOPHYLLUM (salicaires. *dec.*)
à fruit lisse. F. ♄
à fruit épineux. F. ♄

NAIADE
à feuilles lancéolées. F. ☉
à feuilles linéaires. F. ☉

SAURURUS
incliné. AM. S. ♄

POTAMOGETON (Alismacées. *dec.*)
flottant. F. ♆
perfolié. F. ♄
bifurqué. F. ♄
luisant. F. ♆
crépu. F. ♆
comprimé. F. ♄
pectiné. F. ♆
à feuilles de gramen. F. ♄
grêle. F. ♄

RUPPIA (Alismacées. *dec.*)
maritime. F. ☉ ?

ZANICHELLE (Alismacées. *dec.*)
des marais. F. ☉

CALLITRIC (onagraires. *dec.*)
printanier. F. ☉
— *à feuilles étroites.*

LEMNA
à larges feuilles. F. ☉
à petites feuilles. F. ♆
— *gibbeux.*
à trois sillons. F. ♆

Plantæ monocotyledones

staminibus hypogynis.

ORDO I.

AROIDEÆ.

I. Spadix spathâ involutus.

ARUM.

1. *Acaulia, foliis compositis.*

crinitum *willd. sp.*
muscivorum *L. f.*
clavatum.
DRACUNCULUS *L.*
DRACONTIUM *L.*
triphyllum *L.*

2. *Acaulia, foliis simplicibus.*

maculatum *L.*
italicum *Encycl.*
ARISARUM *L.*
colocasia *L.*
pictum *L. f.*
tenuifolium. *L.*
divaricatum *L.*
trilobatum *L.*

CALADIUM.

1. *Acaulia.*

reticulatum.
punctatum.
sagittifolium *willd. sp.*
violaceum.
bicolor *vent. II. cels.*

2. *Caulescentia.*

lacerum *willd. sp.*
seguinum *willd. sp.*
auriculatum *willd. sp.*
tripartitum *willd. sp.*

CALLA

æthiopica *L.*
palustris *L.*

Plantes monocotylédones

à étamines sous le pistil.

ORDRE I.

AROÏDES.

I. Spadice entouré d'une spathe.

AMBROSINIA

de Bassi. sicile. or. ♃

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées.

chevelu. minorque. or. ♃

en massue. s. ch. ♃
serpentaire. F. ♃ (méd.)
Dracontium. AM. S. or. ♃
à trois feuilles. AM. S. ♆

2. Point de tiges, feuilles simples.

maculé. F. ♃ (méd.)
d'Italie. ♃
capuchon. F. m. or. ♆
colocase. Égypte. s. ch. ♃
veiné. minorque. or. ♃
à feuilles étroites. F. m. or. ♃
divergent. inde. s. ch. ♆
trilobé. inde. s. ch. ♆

CALADIUM.

1. Point de tiges.

à réseau. s. ch. ♆
moucheté. s. ch. ♃
hasté. ANTILLES. s. ch. ♆
violet. ANTILLES. s. ch. ♆
bicolor. BUÉNOS-AYRES. s. ch. ♆

2. Une tige.

lacéré. ANTILLES. s. ch. ♄
à f. de Balisier. ANTILL. s. ch. ♄
auriculé. ANTILLES. s. ch. ♄
trilobé. CARACAS. s. ch. ♄

CALLA

d'Ethiopie. cap. or. ♃ (orn.)
des marais. F. ♆

Dracontium	*Dracontium*
pertusum L.	*perforé.* Antilles. s. ch. ♄
polyphyllum L.	*à f. nombr.* surinam. s. ch. ♄
Pothos	*Pothos*
crassinervia *Jacq. ic.*	*à gross. nervur.* caracas. s. ch. ♆
lanceolata L.	*lancéolé.* Antilles. s. ch. ♅
cordata L.	*à f. en cœur.* Antill. s. ch. ♆
II. Spadix spathâ destitutus.	II. Spadice sans spathe.
Orontium	*Orontium*
japonicum *Thunb. Jap.*	*du Japon.* s. ch. ♆
Acorus	*Acorus*
calamus L.	*aromatique.* F. ♆ (méd.)
gramineus *H. K.*	*à feuilles étroites.* chine. or. ♅

ORDO II.

TYPHÆ.

ORDRE II.

MASSETTES.

Typha	*Massette*
latifolia L.	*à larges feuilles.* F. ♆
angustifolia L.	*à feuilles étroites.* F. ♆
minima *Dec. Fl.*	*petite.* F. ♆.
Sparganium	*Ruban-d'eau*
erectum L.	*rameux.* F. ♅
simplex *Smith. Fl.*	*à tige simple.* F. ♆
natans L.	*flottant.* F. ♆

ORDO III.

CYPEROIDEÆ.

I. Flores monoici.

ORDRE III.

SOUCHETS.

I. Fleurs monoïques.

Carex.	*Carex.*
1. *Spicâ unicâ simplici.*	1. Un seul épi simple.
dioica L.	*dioïque* F. ♆
pulicaris L.	*pulicaire.* F. ♆
2. *Spicis androgynis.*	2. Épis androgynes.
fœtida *All. Ped.*	*fétide.* Alpes. ♆
baldensis L.	*du mont Baldo.* Italie. ♅
cyperoides *Schk. car.* / bohemica *Schreb. Gram.*	*cypéroïde.* F. ♆
disticha *Schreb. Spic.* / intermedia *Good. S. Lin.* / spicata *Encycl.* / arenaria *Leers, Herb.* (non *Lin.*)	*à deux rangs.* F. ♅

atrata L.	*noirâtre.* Alpes. ♆
arenaria L.	*des sables.* F. ♆
tenella *Thuil. Fl.*	*grêle.* F. ♆
ovalis *Good. S. Lin.*	*ovale.* F. ♄
vulpina L.	*compacte.* F. ♄
muricata L.	*hérissé.* F. ♆
stellulata *Good. S. Lin.*	*étoilé.* F. ♆
divulsa *Good. S. Lin.*	*séparé.* F. ♆
curta *Good. S. Lin.*	*tronqué.* F. ♆
elongata L.	*allongé.* F. ♄
brizoides L.	*brizoïde.* F. ♄
paniculata L.	*paniculé.* F. ♆
teretiuscula *Good. S. Lin.*	*cylindrique.* F. ♄
remota L.	*écarté.* F. ♆

3. *Spicis sexu distinctis, fæmineis sessilibus.*

3. Épis femelles sessiles, séparés des mâles.

digitata L.	*digité.* F. ♄
flava L.	*jaune.* F. ♄
œderi *Roth. Germ.*	*d'Œder.* F. ♆
extensa *Good. S. Lin.*	*à longues bractées.* Anglet. ♄
montana L. / collina *Willd. Sp.*	*de montagne.* F. ♆
tomentosa L.	*cotonneux.* F. ♄
præcox *Jacq. Austr.*	*précoce.* F. ♆
filiformis L.	*filiforme.* F. ♆
distans L.	*distant.* F. ♄

4. *Spicis sexu distinctis, fæmineis pedunculatis.*

4. Épis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.

argentea *Vill. Delph.* / scariosa *Encycl.* / prostrata *All. Ped.* / clandestina *Schk. Car.*	*argenté.* F. ♄.
panicea L.	*faux-panis.* F. ♆
sylvatica *Good. S. Lin.* / Drymeja L. *f.*	*des bois.* F. ♄
pallescens L.	*pâle.* F. ♄
plantaginea *Encycl.*	*à feuill. de plantain.* Am. S. ♄
pseudo-cyperus L.	*faux souchet.* F. ♆.
depauperata *Good. S. Lin.*	*à fruits rares.* F. ♆
pendula *Good. S. Lin.* / maxima *Scop. Carn.*	*à épis pendans.* F. ♄

5. *Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.*

5. Plusieurs épis mâles séparés des femelles.

cæspitosa L.	*gazonnant.* F. ♆
glauca *Scop. Carn.*	*glauque.* F. ♆

stricta *Good. s. Lin.* verna *Encycl.*	*serré.* F. ♆
riparia *Good. s. Lin.*	*des rivages.* F. ♆
paludosa *Good. s. Lin.*	*des marais.* F. ♆
acuta *schk. car.*	*aigu.* F. ♄
secalina *willd. sp.*	*à épi de seigle.* F. ♆
vesicaria *L.*	*vésiculeux.* F. ♄
ampullacea *Good s. Lin.*	*renflé.* F. ♆
hirta *L.*	*velu.* F. ♄
hordeistychos *vill. Delph.*	*épi d'orge.* F. ♄

II. Flores hermaphroditi.

II. Fleurs hermaphrodites.

SCHOENUS.

SCHOENUS.

1. *Culmo tereti.*

1. Chaume cylindrique.

mariscus *L.*	*des étangs.* F. ♄
mucronatus *L.*	*acéré.* F. ♄
nigricans *L.*	*noir.* F. ♆
fuscus *L.* rhincospora fusca *H. K.*	*brun.* F. ♆

2. *Culmo triquetro.*

2. Chaume triangulaire.

compressus *L.*	*comprimé.* F. ♆
albus *L.* rhincospora alba *vahl. sp.*	*blanc.* F. ♆

ERIOPHORUM

LINAIGRETTE

polystachyum *L.* latifolium *schrad. Germ.*	*à larges feuilles.* F. ♄
vaillantii *Poiteau Fl.*	*de Vaillant.* F. ♄
gracile *Roth. catal.* triquetrum *schrad. Germ.*	*grêle.*
angustifolium *schrad. Germ.*	*à feuilles étroites.* F. ♆
vaginatum *L.*	*engaînée.* F. ♆
capitatum *Host. Gram.*	*à fleurs en tête.* F. ♄

SCIRPUS.

SCIRPE.

1. *Spicâ unicâ.*

1. Un seul épi.

articulatus *L.*	*articulé.* Inde. s. ch. ♆
palustris *L.*	*des marais,* F. ♆
cæspitosus *L.*	*gazonnant.* F. ♄
acicularis *L.*	*aiguille.* F. ♆
fluitans *L.*	*flottant.* F. ♄
ovatus *Roth. catal.*	*ovale.* F. ♄
campestris *Roth. catal.*	*des champs.* F. ♆

2. *Culmo tereti polystachyo.*

2. Chaume cylindrique à plusieurs épis.

setaceus *L.*	*sétiforme.* F. ♆
supinus *L.*	*couché.* F. ♆

lacustris *L.*	*des étangs.* F. ♆
holoschœnus *L.*	*à globules.* F. ♆
romanus *L.*	*romain.* F. ♆
3. *Culmo triquetro polystachyo.*	3. Chaume triangulaire à plusieurs épis.
triqueter *L.*	*triangulaire.* F. m. ♆
mucronatus *L.*	*piquant.* F. m. or. ♄
maritimus *L.*	*maritime.* F. ♆
sylvaticus *L.*	*des bois.* F. ♄
annuus *All. ped.*	*annuel.* Italie. ☉
biumbellatus *Forsk. Fl.*	
dichotomus *L.*	
fimbristylis dichotoma *Vahl. sp.*	

CYPERUS. — *SOUCHET.*

1. *Culmo tereti.*	1. Chaume cylindrique.
junciformis *Desf. Atl.*	*jonciforme.* F. m. ♆
articulatus *L.*	*articulé.* Inde. s. ch. ♄
2. *Culmo triquetro.*	2. Chaume triangulaire.
viscosus *Swartz. Prodr.*	*visqueux.* Antilles. ♄
longus *L.*	*odorant.* F. ♆ (écon. méd.)
tenuiflorus *Jacq. Ic.*	*à petites fleurs.* ♄
rotundus *L.*	*rond.* F. ♄ (méd.)
esculentus *L.*	*comestible.* Égypte. or. ♆
vegetus *Vahl. sp.*	*vert.* ♄
compressus *Jacq. Hort.*	
patulus *Willd. Enum.*	*étalé.* Hongrie. ♆
strigosus *Willd. Enum.*	*desséché.* Virginie. ♆
glomeratus *Willd. Enum.*	*aggloméré.* Italie. ☉
flavescens *L.*	*jaunâtre.* F. ♆
fuscus *L.*	*brun.* F. ♆
pannonicus *L. f.*	*de Hongrie.* ♆
papyrus *L.*	*papyrus.* Sicile. or. ♄
alternifolius *L.*	*à feuill. alternes.* Madagascar. s. ch. ♄

KILLINGIA — *KILLINGIA*

triceps *L. f.*	*à trois têtes.* Antilles. s. ch. ♄

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

ORDRE IV.

GRAMINÉES.

CINNA	*CINNA*
arundinacea *L.*	*de Canada.* ♆
Agrostis cinna *Willd. Enum.*	
ANTHOXANTHUM	*FLOUVE*
odoratum *L.*	*odorante.* F. ♆.

amarum *Brotero. Phyt.* glaucum *Vahl. sp.*	*glauque.* portugal. ☿
Crypsis	*Crypsis*
aculeata *H. K.* schœnus mucronatus *L.* Anthoxanthum aculeatum *L. f.* Antitragus aculeatus. *Gœrt. Fruct.* Heleochloa aculeata *Host. Gr.*	*piquant.* F. m. ♆
schœnoides *H. K.* Phleum schœnoides *L.* Heleochloa schœnoides *Host. Gram.*	*faux schœnus.* F. m. ♆
Cornucopiæ	*Cornucopiæ*
cucullatum *L.*	*en capuchon.* orient. ☉
Alopecurus	*Alopécure*
utriculatus *schrad. germ.* Phalaris utriculata *L.*	*à utricules.* F. ☉
bulbosus *L.*	*bulbeux.* F. ♆
agrestis *L.*	*des champs.* F. ☿
pratensis *L.*	*des prés.* F. ☿
arundinaceus *Encycl.* ventricosus *Pers. Syn.*	*arundinacé.* F. ♆
geniculatus *L.*	*géniculé.* F. ♆
Gerardi *Vill. Delph.* Phleum Gerardi *All. ped.*	*de Gérard.* Alpes. ♆
Phleum	*Fléau*
pratense *L.*	*des prés.* F. ☿
nodosum *L.*	*bulbeux.* F. ☿
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
echinatum *Host. Gram.*	*hérissé.* F. ☿
arenarium *L.*	*des sables.* F. ☿
Bellardii *Willd. Enum.* Phalaris bulbosa *L.* Phalaris cylindrica *Dec. Fl.* phleum tenue *Schrad. Germ.*	*de Bellardi.* F. ☿
Leersia	*Léersia*
oryzoides *Willd. sp.* Phalaris oryzoides *L.*	*des marais.* F. ☿
Phalaris	*Alpiste*
aspera *Retz. obs.* Phleum asperum *Jacq. ic.*	*rude.* F. ☉
minor *Retz. obs.*	*mineure.* orient. ☉
canariensis *L.*	*des Canaries.* ☉
paradoxa *L.*	*rongée.* orient. ☉

phleoides L.
phleum Boehemeri *schr. germ.* — *Fléau.* F. ♄
mucronata.
phleum phalaroides *vill. delph.* — *à deux pointes.* F. ♄
capensis *Thunb.* — *du Cap.* Or. ♄
arundinacea L. — *roseau.* F. ♆
— picta. — *panachée.*

BECKMANNIA — *BECKMANNIA*
erucæformis *host. gr.*
phalaris erucæformis L. — *chenillette.* Sibérie. ☉

PASPALUM — *PASPALUM*
stoloniferum *bosc. s. Lin. par.*
racemosum *Jacq. ic.*
milium latifolium L. — *rampant.* Pérou. ♄
membranaceum *Lamk. ill.*
ceresia elegans *willd. enum.* — *membraneux.* Pérou. s. ch. ♆
tenellum *willd. enum.* — *délicat.* s. ch. ♄
kora *willd. sp.* — *kora.* Inde. s. ch. ♆

CYNODON — *CYNODON*
dactylon. *willd. enum.*
panicum dactylon L. — *chiendent.* F. ♆ (méd.)

DIGITARIA — *DIGITAIRE*
sanguinalis *willd. enum.*
panicum sanguinale L. — *sanguine.* F. ♆

PANICUM. — *PANIS.*

1. *Flores spicati.* — 1. Fleurs en épi.

verticillatum L. — *verticillé.* F. ☉
viride L. — *vert.* F. ☉
glaucum L. — *glauque.* F. ☉
geniculatum *willd. enum.* — *coudé.* Antilles. s. ch. ♄
maritimum *encycl.* — *maritime.* ☉
italicum L. — *d'Italie.* ☉
germanicum *willd. sp.* — *d'Allemagne.* ☉

2. *Flores spicati, spicis pluribus.* — 2. Plusieurs épis.

crus-galli L. — *pied-de-poule.* F. ☉
— aristatum. — *barbu.*
echinatum *willd. enum.* — *hérissé.* Am. m. ☉
colonum L. — *tacheté.* Inde. ☉

3. *Flores paniculati.* — 3. Fleurs en panicule.

sulcatum.
plicatum *Lamk. ill.* — *sillonné.* Antilles? s. ch. ♄
plicatum *willd. enum.* — *plissé.* Inde. s. ch. ♄

proliferum *Encycl.* — *prolifère.* Am. s. ☌
virgatum *L.* — *effilé.* Am. s. ☌
coloratum *L.* — *coloré.* Égypte. ☉
miliaceum *L.* — *Millet.* inde. ☉ (écon.)
— nigrum. — *noir.*
capillare *L.* — *capillaire.* Am. s. ☉
latifolium *L.* — *à larg. feuill.* Am. m. s. ch. ♄

LUDOLPHIA — *LUDOLPHIA*

glaucescens *Willd. Enum.* / Panicum arborescens *Lam. Ill.* — *glauque.* inde. s. ch. ♄

MILIUM — *MIL*

paradoxum *L.* — *noir.* F. ☌
effusum *L.* — *étalé.* F. ♆
confertum *L.* — *ramassé.* F. ♆
multiflorum *Schrad. Germ.* / Agrostis miliacea *L.* — *à fleurs nombreuses.* F. ☌

GASTRIDIUM — *GASTRIDIUM*

lendigerum *Beauv. Agr.* / Milium lendigerum *L.* — *tuberculeux.* F. ☉

AGROSTIS. — *AGROSTIS.*

1. *Aristatæ.* — 2. Fleurs garnies d'arêtes.

spica-venti *L.* — *des moissons.* F. ☉
interrupta *L.* — *interrompu.* F. ☉
retrofi acta *Willd. Enum.* / debilis *Encycl. suppl.* — *recourbé.* N. Holl. ☌
racemosa *Mich. Am.* — *à grappes.* Am. s. ♆

2. *Muticæ.* — 2. Fleurs sans arêtes.

foliosa *Mertens.* — *feuillu.* ☌
stolonifera *L.* — *traçant.* F. ♆
alba *L.* — *blanc.* F. ☌
vulgaris *Smith. Fl.* / capillaris *Leers. Herb.* — *commun.* F. ♆
dulcis. — *doux.* orient. ☉
serotina *L.* — *d'automne.* F. m. ♆
pumila *L.* — *nain.* F. ☌
pungens *L.* — *piquant.* F. m. ☌
mexicana *L.* — *du Mexique.* ♆
tenacissima *Jacq. Ic.* — *à feuill. dures.* inde. s. ch. ♆

TRICHODIUM — *TRICHODIUM*

caninum *Schrad. Germ.* / Agrostis canina *L.* — *des chiens.* F. ♆
laxiflorum *Mich. Fl.* / Agrostis cornucopiæ *Lam. Ill.* — *à fleurs lâches.* caroline.
decumbens *Mich. Fl.* — *tombant.* Am. s. ☌

CHAMAGROSTIS	*CHAMAGROSTIS*
minima *schrad. germ.* AGROSTIS minima *L.* KNAPPIA agrostidea *smith. fl.*	*filiforme.* F. ⊙
POLYPOGON	*POLYPOGON*
monspeliensis *desf. atl.* ALOPECURUS monspeliensis *L.*	*de Montpellier.* ⊙
subspicatus *willd. enum.* chæturus subspicatus *beauv. gram.*	*de Portugal.* ⊙
STIPA	*STIPA*
capillata *willd. sp.*	*chevelu.* F. ♆
pennata *L.*	*plumeux.* F. ♄
conferta.	*à fleurs serrées.* ♆
ARISTELLA *willd.*	*à petites barbes.* F. ♆
juncea *L.*	*jonciforme.* F. ♄
tenacissima *L.*	*spart.* ESP. or. ♄
tortilis *desf. atl.*	*tordu.* BARBARIE. ♆
ARISTIDA	*ARISTIDA*
cærulescens *desf. atl.* canariensis *willd. enum.*	*bleuâtre.* BARBARIE. ⊙
SACCHARUM	*SUCRE*
officinarum *L.*	*officinal.* INDE. ♄ (écon.)
— violaceum.	— *violet.*
cylindricum *lamk. ill.* IMPERATA cylindrica *beauv. agrost.* LAGURUS cylindricus *L.*	*cylindrique.* F. M. or ♄
ERIANTHUS	*ERIANTHUS*
saccharoides *mich. fl.*	*faux sucre.* CAROLINE. or. ♆
RAVENNÆ *beauv. agr.* ANDROPOGON RAVENNÆ *L.*	*de Ravenne.* F. M. or. ♆
LAGURUS	*LAGURUS*
ovatus *L.*	*ovale.* F. M. ⊙
PENICILLARIA	*PÉNICILLAIRE*
spicata *willd. enum.* HOLCUS spicatus *L.*	*en épi.* INDE. ⊙ (écon.)
SORGHUM	*SORGHO*
vulgare *willd. enum.*	*commun.* INDE. ⊙ (écon.)
cernuum *willd. enum.*	*penché.* ⊙ (écon.)
saccharatum *willd. enum.*	*sucré.* INDE. ⊙ (écon.)
cafrorum *willd. enum.*	*des Cafres.* AFR. ⊙ (écon.
halepense *L.* HOLCUS halepensis *L.*	*d'Alep.* ⊙

HOLCUS	*HOLCUS*
lanatus L.	*laineux.* F. ♃
mollis L.	*velouté.* F. ♆
ANDROPOGON	*ANDROPOGON*
Allionii *Decand. Fl.* contortum *Allion.* (non *Lin.*)	*d'Allioni.* F. ♆
provinciale *Encycl.*	*de Provence.* F. m. ♆
ischœmum L.	*digité.* F. ♆
annulatum *Vahl. symb.*	*annulaire.* Égypte. or. ♆
nardus *Pers. syn.* citriodorum.	*odorant.* île de F. s. ch. ♆
strictum *Host. Gr.*	*serré.* Hongrie. ♃
hirtum L.	*hérissé.* F. m. or. ♃.
distachyon L.	*à deux épis.* F. m. or. ♆
Gryllus L.	*paniculé.* F. ♃
schœnanthus L.	*jonc odorant.* Inde. s. ch. ♆
macrouros *Mich. Fl.*	*à grande panicule.* caroline. or. ♃
CHLORIS	*CHLORIS*
petræa *Swartz. Prodr.*	*des rochers.* Antilles. s. ch. ♆
ciliata *Swartz. Prodr.*	*ciliée.* Antilles. s. ch. ♃
scoparia. cynosurus scoparius *Encycl.*	*à balais.* Inde. ⊙
radiata *Swartz Prodr.* Agrostis radiata L. Andropogon fasciculatum L. *ex Swartz.*	*rayonnante.* Inde. ⊙
CHONDROSUM *Willd. Mss.*	*CHONDROSUM*
tenue *Willd. Mss.* chloris filiformis *Encycl. Sup.* chloris gracilis *Durand. Diss.*	*filiforme.* Mexique.
TRIPSACUM	*TRIPSACUM*
dactyloides L.	*monoïque.* Am. s. ♆
hermaphroditum L. Antephora elegans *Schreb. Gr.*	*hermaphrodite.* Antilles. ⊙
TRAGUS	*TRAGUS*
racemosus *Desf. Atl.* cenchrus racemosus L. Lappago racemosa *Willd. Sp.*	*à grappes.* F. ⊙
CENCHRUS	*CENCHRUS*
echinatus L.	*hérissé.* Antilles. ⊙
ciliaris L. Pennisetum cenchroides *Pers.*	*cilié.* Cap. ⊙

ECHINARIA	*ECHINARIA*
capitata *Desf. Atl.* cenchrus capitatus *L.* sesleria echinata *Schrad. Ger.*	*à fl. en tête.* F. m. ☉
ÆGILOPS	*ÆGILOPS*
ovata *L.*	*ovale.* F. ☉
triuncialis *L.*	*à longs épis.* F. ☉
squarrosa *L.*	*rude.* Barbarie. ☉
ROTTBOELLIA	*ROTTBOELLIA*
incurvata *L.*	*arqué.* F. ☉
pannonica *Host. Gr.* biflora *Pers. Syn.*	*de Hongrie.* ☉
monandra *Schrad. Germ.* nardus aristata *L.*	*à une étamine.* F. ♄
AIRA	*AIRA*
cæspitosa *L.*	*touffu.* F. ♄
flexuosa *L.*	*tortueux.* F. ♆
juncea *Vill. Delph.* Deschampsia juncea *Beauv. Agrost.*	*jonciforme.* Alpes. ♄
caryophyllea *L.*	*étalé.* F. ☉
præcox *L.*	*printanier.* F. ☉
minuta *L.*	*filiforme.* Esp. ☉.
canescens *L.* corynophorus canescens *Beauv. Agrost.*	*blanchâtre.* F. ☉
pubescens *Vahl. Symb.*	*pubescent.* F. m. ☉
CATABROSA	*CATABROSA*
aquatica *Beauv. Agrost.* Aira aquatica *L.*	*aquatique.* F. ♄
MELICA	*MÉLICA*
ciliata *L.*	*cilié.* F. ♆
pyramidalis *Lamk. Ill.*	*pyramidal.* F. m. or. ♆
Bauhini *Willd. Enum.*	*de Bauhin.* F. ♄
uniflora *Retz. Obs.* Lobelii *Vill. Delph.*	*à une fleur.* F.
nutans *L.* montana *Dec. Fl.*	*à fleurs penchées.* F. ♄
altissima *L.*	*élevé.* Sibérie. ♄
MOLINIA	*MOLINIA*
cœrulea *Beauv. Agrost.* melica cœrulea *L.*	*bleuâtre.* F. ♄
SPARTINA	*SPARTINA*
cynosuroides *Beauv. Agrost.* trachynotia cynosuroides *Mich. Fl.* Dactylis cynosuroides *L.*	*faux cynosurus.* Am. S. ♄

DACTYLIS	*DACTYLIS*
glomerata L.	*aggloméré.* F. ♆
SESLERIA	*SESLÉRIA*
cœrulea *Arduin. spec.*	*bleuâtre.* F. ♆
cynosurus cœruleus L.	*à longs épis.* Allem. ♄
elongata *Host. Gr.*	
DINEBA	*DINEBA*
ægyptiaca *Delile Fl.*	*d'Egypte.* ⊙
Dactylis paspaloides *Willd. Enum.*	
curtipendula *Beauv. Agrost.*	*à fleurs pendantes.* Am. S. ♆
chloris curtipendula *Mich. Fl.*	
CYNOSURUS	*CRETELLE*
cristatus L.	*des prés.* F. ♆
echinatus L.	*hérissée.* F. ⊙
durus L.	*roide.* F. ⊙
LAMARCKIA	*LAMARCKIA*
aurea *Dec. Fl.*	*jaune.* F. m. ⊙
cynosurus aureus L.	
chrysurus cynosuroides *Pers. Syn.*	
ELEUSINE	*ELEUSINE*
ægyptia.	*d'Egypte.* ⊙
cynosurus ægyptius L.	
indica *Lamk. Ill.*	*des Indes.* ⊙
cynosurus indicus L.	
coracana *Lamk. Ill.*	*coracan.* Barbarie. ⊙
cynosurus coracanus L.	
LOLIUM	*LOLIUM*
temulentum L.	*Ivraie.* F. ⊙
perenne L.	*Raygrass.* F. ♆
— tenue.	— *grêle.*
ELYMUS	*ELYME*
arenarius L.	*des sables.* F. ♄
giganteus *Vahl. Symb.*	*gigantesque.* ♆
racemosus *Lamk. Ill.*	
virginicus L.	*de Virginie.* ♄
sibiricus *Schr. Gram.*	*de Sibérie.* ♆
tener L. *f.*?	
canadensis L.	*de Canada.* ♆
glaucifolius *Willd. Enum.*	*glauque.* Am. S. ♄
ramosus.	*rameux.* ♄
europæus L.	*d'Europe.* F. ♆
hordeiformis.	*épi d'orge.* ♆

ASPRELLA	*ASPRELLA*
hystrix *willd. enum.*	
elymus hystrix L.	*divergent.* orient. ♄
HORDEUM	*ORGE*
vulgare L.	*commune.* RUSSIE. ☉ (écon.)
— cœleste.	— *nue.*
hexastichon L.	*hexagône.* ☉ (écon.)
zeocriton L.	*éventail.* ☉ (écon.)
distichon L.	*à deux rangs.* RUSSIE. (écon.)
— nudum.	— *nue.*
maritimum L	*maritime.* F. ☉
secalinum L.	*des prés.* F. ☉
murinum L.	*des murailles.* F. ☉
jubatum L.	*chevelue.* SYRIE. ☉
TRITICUM	*FROMENT*
vulgare *willd. enum.*	*cultivé.* ☉ (écon.)
— hybernum.	— *d'hiver.*
compositum L. *f.*	*rameux.* ☉ (écon.)
durum *desf. atl.*	*corné.* ☉ (écon.)
spelta L.	*épeautre.* ☉ (écon.)
zea *host. gr.*	*zea.* ☉ (écon.)
monococcum L.	*monosperme.* ☉ (écon.)
polonicum L.	*de Pologne.* ☉ (écon.)
cristatum *pers. syn.*	*à crêtes.* ♄
junceum L.	*jonciforme.* F. ♆
rigidum *schrad. germ.*	*rude.* AUTRICHE. ♄
elongatum *host. gram.*	
repens L.	*chiendent.* F. ♄
— aristatum.	— *barbu.*
caninum L.	*des chiens.* F. ♆
glaucum.	*glauque.* ♄
prostratum L. *f.*	*couché.* SIBÉRIE. ☉
patulum *willd. enum.*	*étalé.* ÉGYPTE. ☉
secale pungens *pers. syn.*	
poa *dec. fl.*	*poa.* F. ☉
nardus *dec. fl.*	*filiforme.* F. ☉
unilaterale L.	*unilatéral.* F. ☉
SECALE	*SEIGLE*
cereale L.	*cultivé.* ☉ (écon.)
villosum L.	*cilié.* orient. ☉
BROMUS	*BROME*
mollis L.	*velu.* F. ☉
parviflorus.	*à petites fleurs.* ☉
lanceolatus *roth. cat.*	*lancéolé.* orient. ☉
grossus.	
secalinus L. (*ex swartz.*)	*à gros épis.* F. ☉

squarrosus L. — *rude.* F. ⊙
dumetorum *Lamk. Ill.* / asper L. *f.* — *des buissons.* F. ♆
arvensis L. — *des champs.* F. ⊙
sterilis L. — *stérile.* F. ⊙
maximus *Desf. Atl.* — *à grands épis.* F. ⊙
madritensis L. / gynandrus *Roth. cat.* — *de Madrid.* ⊙
tectorum L. — *des toits.* F. ⊙
pendulinus. / commutatus *Schrad. Germ.?* — *pendant.* ⊙
giganteus L. — *gigantesque.* F. ♆
pratensis *Lamk. Ill.* / perennis *Vill. Delph.* / erectus *Schrad. Germ.* — *des prés.* F. ♆
purgans L. — *purgatif.* canada. ♆
purpurascens *Delile. Fl.* — *pourpre.* F. m. ⊙
rubens L. — *rougeâtre.* F. ⊙
inermis *Willd. sp.* — *sans arêtes.* F. Alpes. ♆

FESTUCA — *FESTUCA*

pinnata. / BROMUS pinnatus L. / TRITICUM pinnatum *Dec. Fl.* — *penné.* F. ♄
sylvatica. / BROMUS sylvaticus *Lamk. Ill.* / FESTUCA gracilis *Schrad. Germ.* / TRITICUM sylvaticum *Dec. Fl.* — *des bois.* F. ♆
scabra *Zea.* — *rude.* ⊙
distachyos. / BROMUS distachyos L. — *à deux épis.* F. m. ⊙
stipoides *Desf. Atl.* / BROMUS stipoides L. — *stipoïde.* F. m. ⊙
bromoides L. — *bromoïde.* F. ♆
ovina L. — *des moutons.* F. ♆
capillata *Lamk. Ill.* — *capillaire.* F. ♆
tenella *Willd. sp.* — *à feuilles menues.* Am. S. ♆
heterophylla *Lamk. Ill.* — *à feuilles variables.* F. ♆
rubra L. — *rouge.* F. ♆
duriuscula L. — *à feuilles dures.* F. ♄
glauca *Lamk. Ill.* — *glauque.* F. ♆
dumetorum L. — *des buissons.* F. ♆
pratensis *Schrad. Germ.* / loliacea *Dec. Fl.* / elatior *Lamk. Ill.* — *des prés.* F. ♆
varia *Host. Cram.* — *panaché.* F. ♄
elatior *Schrad. Germ.* / arundinacea *Vill. Delph.* / loliacea *Lamk. Ill.* — *élevé.* F. ♆

myuros L.	*myuros.* F. ♂
uniglumis *Willd. sp.*	*à une seule valve.* F. ⊙
spadicea. *Willd. sp.*	*jaune.* Alpes. ♆
diandra *Mich. Fl.*	*à deux étamines.* Am. s. ♆
unioloides *Willd. H. Ber.*	*unioloïde.* caroline. ⊙
alopecuros *Willd. Enum.*	*plumeux.* Maroc. ⊙
fascicularis *Lamk. Ill.* / polystachya *Mich. Fl.*	*fasciculé.* Am. s. ♆
virgata *Lamk. Ill.*	*effilé.* Antilles. ⊙
calycina L.	*à grand calice.* Esp. ⊙
divaricata *Desf. Atl.*	*étalé.* Barbarie. ⊙
phleoides *Vill. Delph.*	*fléau.* Alpes. ♄
Danthonia	*Danthonia*
decumbens *Dec. Fl.* / Festuca decumbens L. / Triodia decumbens *Beauv. Agrost.*	*incliné.* F. ♆
Poa	*Poa*
fluitans *Schrad. Germ.* / Festuca fluitans L.	*flottant.* F. ♆ (écon.)
aquatica L.	*aquatique.* F. ♄
alpina L.	*des Alpes.* F. ♄
Molinerii *Balbis Miscell.* / badensis *Willd. sp.*	*de Molineri.* Alpes. ♄
bulbosa L.	*bulbifère.* F. ♄
seslerioides *Mich. Fl.*	*seslérioïde.* Am. s. ♄
cenisia *Allion. Auct.*	*du mont Cénis.* ♆
cæsia *Smith. Fl.*	*bleuâtre.* Écosse. ♄
trivialis L.	*commun.* F. ♆
angustifolia L.	*à feuilles étroites.* F. ♄
debilis *Encycl.*	*foible.* F. ♄
pratensis L.	*des prés.* F. ♄
trinervata *Dec. Fl.* / sylvatica *Pollich. Palat.*	*à trois nervures.*
pilosa L.	*velu.* F. ♆
annua L.	*annuel.* F. ⊙
compressa L.	*comprimé.* F. ♄
nemoralis L.	*des bois.* F. ♆
rariflora.	*à fleurs rares.* F. ♆
ægyptiaca *Willd. Enum.*	*d'Egypte.* ⊙
rigida L.	*roide.* F. ♆
procumbens *Smith. Fl.*	*tombant.* Angleterre. ⊙
maritima *Willd. sp.*	*maritime.* F. ♄
cristata *Willd. sp.*	*à crêtes.* F. ♆
peruviana *Jacq. Ic.*	*du Pérou.* ⊙
glomerata. / elongata *Willd. Enum.*	*aggloméré.* Inde. s. ch. ♆

retroflexa *curtis. Lond.* distans.	*recourbé.* F. ♄
striata *Lamk. Ill.* nervata *Willd. sp.*	*strié.* Am. S. ♆
glauca *Willd. Enum.*	*glauque.* ♆
abyssinica L.	*d'Abyssinie.* ☉
capillaris L.	*capillaire.* Am. S. ☉
tenella L.	*délicat.* Inde. ☉
ciliaris L.	*cilié.* Antilles. ☉
sicula *Jacq. obs.*	*de Sicile.* ☉
megastachya *Kœler. Gram.* Briza Eragrostis L.	*Eragrostis.* F. ☉
Briza	*Briza*
minor L.	*triangulaire.* F. ☉
media L.	*des prés.* F. ♆
maxima L.	*à grandes fleurs.* F. ☉
Uniola	*Uniole*
latifolia *Mich. Fl.*	*à larges feuilles.* Am. S. ♆
Avena	*Avoine*
elatior L.	*Fromental.* F. ♄
— nodosa.	*— bulbeuse.*
striata *Lamk. Ill.*	*striée.* F. Alpes. ♄
sativa L.	*cultivée.* ☉ (écon.)
— nuda.	*— sans barbes.*
orientalis *Willd. sp.*	*d'Orient.* ☉
brevis *Willd. sp.*	*courte.* Brême. ☉
fatua L.	*Avron.* F. ☉
sterilis L.	*stérile.* F. ☉
pubescens L.	*pubescente.* F. ♄
pratensis L.	*des prés.* F. ♄
bromoides L.	*bromoïde.* F. ♄
distichophylla *Vill. Delph.*	*distique.* F. Alpes. ♆
flavescens L.	*jaunâtre.* F. ♆
panicea *Lamk. Ill.*	*panis.* F. ☉
fragilis L.	*fragile.* F. ☉
Arundo.	*Roseau.*
1. *Calix multiflorus.*	1. Calice à plusieurs fleurs.
donax L.	*à quenouille.* F. m. ♆ (écon.)
— variegata.	*— panaché.*
phragmitis L.	*à balais.* F. ♄
2. *Calix uniflorus.*	2. Calice à une fleur.
epigeios L. calamagrostis epigeios *Roth. Germ.*	*épigeios.* F. ♄

calamagrostis L. calamagrostis lanceolata *roth. germ.*	*plumeux.* F. ♃
arenaria L. calamagrostis arenaria *roth. germ.*	*des sables.* F. ♃
ORYZA sativa L.	*RIZ* *cultivé.* Inde. ☉ (écon.)
EHRHARTA panicea *willd. sp.*	*EHRHARTA* *à fleurs de panis.* Cap. or. ♆
NARDUS stricta L.	*NARD* *serré.* F. ♃
LYGEUM spartum L.	*LYGEUM* *sparte.* F. m. or. ♆ (écon.)
ZEA maïs L.	*ZEA* *maïs.* Pérou. ☉ (écon.)
COIX lacryma L.	*COIX* *larme de Job.* Inde. ☉

CLASSIS III.

CLASSE III.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina perigyna).

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines attachées au calice).

ORDO I.

ORDRE I.

PALMÆ.

PALMIERS.

I. Fronde pinnatá.

I. Feuilles pennées.

PHOENIX dactylifera L.	*DATTIER* *cultivé.* Afr. s. ch. ♄ (écon.)
CARYOTA urens L.	*CARYOTA* *brûlant.* Inde. s. ch. ♄
II. Fronde palmatá.	II. Feuilles palmées.
CHAMÆROPS humilis L. hystrix (*an* generis?).	*CHAMÆROPS* *commun.* Barb. or. ♄ (écon.) *hystrix.* S. ch. ♄
SABAL adansonii *guers. s. philom.* chamærops acaulis *mich. fl.* corypha minor *jacq. hort.*	*SABAL* *d'Adanson.* Am. s. or. ♄

LATANIA
chinensis *Jacq. frag.*
borbonica *Willd. sp.*

RHAPIS
flabelliformis *Willd. sp.*

ORDO II.

ASPARAGINEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

DRACÆNA
draco *L. S. veg.*
terminalis *Jacq. ic.*
marginata *Encycl.*
reflexa *Encycl.*
cernua *Jacq. H. sch.*
umbraculifera *Jacq. H. sch.*

DIANELLA
nemorosa *Encycl.*
dracæna ensifolia *Willd. sp.*
cœrulea *Bot. Mag.*

ASPARAGUS
tenuifolius *Encycl.*
officinalis *L.*
— maritimus.
decumbens *Jacq. H. sch.*
crispus *Encycl.*
mauritianus.
retrofractus *L.*
asiaticus *L.*
pectinatus *Red. Lil.*
albus *L.*
acutifolius *L.*
aphyllus *L.*
— horridus.
capensis *L.*
sarmentosus *L.*

MEDEOLA
asparagoides *L.*

TRILLIUM
sessile *L.*

PARIS
quadrifolia *L.*

LATANIER
de Chine. s. ch. ♄

RHAPIS
éventail. chine. s. ch. ♄

ORDRE II.

ASPARAGINÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

DRACÆNA
sang-drag. can. s. ch. ♄ (méd.)
pourpre. chine. s. ch. ♄
à bords rouges. madagascar. s. ch. ♄
recourbé. île de france. s. ch. ♄
en parasol. inde. s. ch. ♄

DIANELLE
des bois. inde. s. ch. ♃
bleue. n. holl. s. ch. ♃

ASPERGE
à feuilles menues. f. ♃
officinale. f. (écon.)
— maritime.
tombante. cap. s. ch. ♄
de l'île de France. s. ch. ♄
coudée. cap. s. ch. ♄
d'Asie. s. ch. ♄
pectinée. or. ♄
blanche. orient. or. ♄
à feuilles aiguës. f. m. or. ♄
sans feuilles. orient. or. ♄
— hérissée.
du Cap. s. ch. ♄
sarmenteuse. ceylan. s. ch. ♄

MEDEOLA
sarmenteux. cap. s. ch. ♄

TRILLIUM
sessile. am. s. ♃

PARISETTE
à quatre feuilles. f. ♃

CONVALLARIA	*MUGUET*
maialis L.	*de mai.* F. ♆ (orn.)
japonica *Thunb. Jap.*	*du Japon.* Or. ♆
ophiopogon japonicus *Bot. Mag.*	
POLYGONATUM	*SCEAU-DE-SALOMON*
vulgare *Desf. Ann.*	*commun.* F. ♆
convallaria polygonatum L.	
multiflorum *Desf. Ann.*	*à plusieurs fleurs.* F. ♆
convallaria multiflora L.	
verticillatum *Desf. Ann.*	*verticillé.* F. ♆
convallaria verticillata L.	
SMILACINA	*SMILACINA*
racemosa *Desf. Ann.*	*à grappes.* Am. S. ♄
convallaria racemosa L.	
stellata *Desf. Ann.*	*étoilé.* Am. S. ♆
convallaria stellata L.	
MAIANTHEMUM	*MAIANTHEMUM*
bifolium *Desf. Ann.*	*à deux feuilles.* F. ♆
convallaria bifolia L.	
II. Flores unisexuales.	II. Fleurs unisexuelles.
RUSCUS	*FRAGON*
aculeatus L.	*épineux.* F. ♄ (méd.)
hypophyllum L.	*sans foliole.* Italie. or. ♄
hypoglossum L.	*à foliole.* Italie. or. ♄
androgynus L.	*androgyne.* Canaries. or. ♄
racemosus L.	*à grappes.* Italie. ♄
SMILAX.	*SMILAX.*
1. *Caule aculeato, fruticoso.*	1. Tige épineuse, ligneuse.
aspera L.	*rude.* F. m. or. ♄ (méd.)
oblongata *Swartz. Prodr.*	*à feuill. oblong.* Antill. s. ch. ♄
mauritanica *Desf. Atl.*	*de Mauritanie.* Alger. or. ♄
excelsa? L.	*élevé.* orient. or. ♄
horrida.	*hérissé.* Am. s. or. ♄
laurifolia L.	*à feuilles de Laurier.* Am. S. ♄
rotundifolia *Mich. Fl.*	*à feuilles rondes.* Am. S. ♄
glauca *Mich. Fl.*	*glauque.* Am. S. ♄
pubera *Mich. Fl.*	*velu.* Am. S. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tige herbacée.
herbacea L.	*herbacé.* Am. S. ♄
RAJANIA	*RAJANIA*
cordata L.	*à feuill. en cœur.* Ant. S. ch. ♄

III. Flores unisexuales, ovarium semi-inferum.

DIOSCOREA
villosa *L.*
alata *L.*

TAMNUS
communis *L.*

III. Fleurs unisexuelles, ovaire moitié infère.

IGNAME
velue. AM. S. ♃
ailée. INDE. S. CH. ♆ (alim.)

TAMNE
commun. F. ♆ (méd.)

ORDO III.

JUNCEÆ.

APHYLLANTHES
monspeliensis *L.*

LOMANDRA
longifolia *Bill. N. Holl.*

JUNCUS.

1. *Culmo nudo.*

acutus *L.*
maritimus *Encycl.*
conglomeratus *L.*
effusus *L.*
glaucus *Willd. sp.*
australis.
trifidus *L.*
squarrosus *L.*

2. *Culmo folioso.*

articulatus *L.*
sylvaticus *Willd. sp.*
bulbosus *L.*
tenageia *L. f.*
bufonius *L.*

LUZULA
nivea *Dec. Fl.* / juncus niveus *L.*
campestris *Dec. Fl.* / juncus campestris *L.*
pilosa. / vernalis *Dec. Fl.* / juncus pilosus *L.*
maxima *Dec. Fl.* / juncus maximus *Willd. sp.*
compacta.
pediformis *Dec. Fl.* / juncus pediform. *Vill. Delph.*

ORDRE III.

JONCÉES.

APHYLLANTHES
de Montpellier. F. m. or, ♃ (écon.)

LOMANDRA
à feuilles long. N. HOLL. or. ♆

JONC.

1. Chaume nu.

aigu. F. ♆
maritime. F. ♆
aggloméré. F. ♃
étalé. F. ♃
glauque. F. ♆
de la N. Hollande. or. ♆
trifide. ALPES. ♆
rude. F. ♆

2. Chaume garni de feuilles.

articulé. F. ♃
des bois. F. ♆
bulbeux. F. ♃
à fleurs sessiles. F. ♆
dichotôme. F. ♆

LUZULA
à fleurs blanches. F. ♆
des champs. F. ♃
velu. F. ♃
à larges feuilles. F. ♆
à fleurs en tête. F. ♃
en grappe. ALPES. ♃

ORDO IV.

COMMELINEÆ.

COMMELINA.

1. *Petala inæqualia.*

communis *L.*
africana *L.*
erecta *L.*
pallida *willd. h. ber.* }
rubens *red. lil.* }
benghalensis *L.*
caroliniana *willd. enum.*

2. *Petala æqualia aut sub-æqualia.*

virginica *L.*
dianthifolia *red. lil.*
tuberosa *L.*
cristata *L.* }
tradescantia cristata *willd. sp.* }
zanonia *L.* }
tradescantia zanonia *willd. sp.* }

TRADESCANTIA
virginica *L.*
erecta *jacq. ic.*
rosea *mich. fl.*
discolor *smith ic.*

ORDRE IV.

COMMÉLINÉES.

COMMÉLINE.

1. Pétales inégaux.

commune. AM. ⊙
d'Afrique. cap. s. ch. ♆
droite. virginie. ♆
à fleurs pâles. s. ch. ♆
du Bengale. s. ch. ♆
de Caroline. or. ♄

2. Pétales égaux ou presque égaux.

de Virginie. ♄
à feuilles d'œillet. s. ch. ♄
tubéreuse. MEXIQUE. s. ch. ♆
à crête. ceylan. ⊙
à fruit mou. ANTILLES. s. ch. ♄

ÉPHÉMÈRE
de Virginie. ♄ (orn.)
à tige droite. MEXIQUE. ⊙
rose. AM. s. ♆
de deux coul. AM. m. s. ch. ♄

ORDO V.

ALISMACEÆ.

BUTOMUS
umbellatus *L.*

ALISMA
plantago *L.*
ranunculoides *L.*
natans *L.*
damasonium *L.*

SAGITTARIA
sagittifolia *L.*

SCHEUCHZERIA
palustris *L.*

TRIGLOCHIN
palustre *L.*
maritimum *L.*

ORDRE V.

ALISMACÉES.

BUTOME
ombellifère. F. ♆ (orn.)

ALISMA
plantain-d'eau. F. ♆
renoncule. F. ♆
flottant. F. ♆
étoilé. F. ♆

FLÉCHIÈRE
aquatique. F. ♆

SCHEUCHZERIA
des marais. F. ♄

TRIGLOCHIN
des marais. F. ♄
maritime. F. ♆

ORDO VI.

COLCHICACEÆ.

NARTHECIUM
caliculatum *Lamk. Ill.*
Anthericum caliculatum *L.*
Tofflieldia palustris *Dec. Fl.*
Melonias borealis *Willd. Sp.*

HELONIAS
bullata *L.*

VERATRUM
album *L.*
nigrum *L.*

COLCHICUM
autumnale *L.*
variegatum *L.*
montanum *L.*

MERENDERA
Bulbocodium *Ram. Bul. Phil.*

ORDRE VI.

COLCHICACÉES.

NARTEC
caliculé. F. ♃

HELONIAS
à fleurs roses. Am. S. ♆

VERATRUM
blanc. F. (vénén.)
noir. sibérie. ♃

COLCHIQUE
d'automne. F. ♃
panaché. orient. ♃ (orn.)
de montagne. Alpes. ♆

MERENDERA
Bulbocodium. pyrénées. ♆

ORDO VII.

LILIACEÆ.

TULIPA
sylvestris *L.*
suaveolens *Roth. Cat.*
oculus-solis *Red. Lil.*
gesneriana *L.*

ERYTHRONIUM
dens-canis *L.*

METHONICA
superba.
gloriosa superba *L.*

UVULARIA
amplexifolia *L.*
perfoliata *L.*

FRITILLARIA
imperialis *L.*
persica *L.*
meleagris *L.*
latifolia *Red. Lil.*

ORDRE VII.

LILIACÉES.

TULIPE
sauvage. F. ♆
odorante. Asie. ♆ (orn.)
œil-de-soleil. F. m. ♆ (orn.)
des jardins. orient. ♆ (orn.)

ERYTHRONIUM
dent-de-chien. Alpes. ♆

METHONICA
superbe de Malabar. Inde. S. ch. (orn.)

UVULAIRE
des Alpes. F. ♃
perfoliée. Am. S. ♃

FRITILLAIRE
couronne-impériale. Asie. ♃ (orn.)
de Perse. ♃
panachée. F. ♃ (orn.)
à larges feuilles. ♃

LILIUM	*LIS*
candidum L.	*blanc.* ASIE. ♃ (orn.)
bulbiferum L.	*bulbifère.* SUISSE. ♃ (orn.)
croceum.	*orangé.* ♆ (orn.)
tigrinum *BOT. MAG.*	*tigré.* CHINE. OR. ♃ (orn.)
pomponium L.	*pomponien.* F. M. ♆ (orn.)
pyrenaicum *GOUAN. ILL.*	*des Pyrénées.* ♃ (orn.)
MARTAGON L.	*Martagon.* F. (orn.)
chalcedonicum L.	*Hémérocale.* ASIE. ♆ (orn.)
pumilum *RED. LIL.*	*nain.* ♃ (orn.)
philadelphicum L.	*de Philadelphie.* ♆ (orn.)
superbum L.	*superbe.* AM. S. ♃ (orn.)
canadense *RED. LIL.* / penduliflorum *RED. LIL.*	*de Canada.* ♆ (orn.)
YUCCA	*YUCCA*
gloriosa L.	*à feuilles entières.* AM. S. ♄
aloifolia L.	*à feuill. d'Aloès.* CAROLINE. OR. ♄
draconis L.	*à larges feuill.* AM. M. S. CH. ♄
filamentosa L.	*filamenteux.* CAROLINE. OR. ♄
BOSCII (*an* yucca?)	*de Bosc.* S. CH. ♄
SANSEVIERA	*SANSEVIÉRA*
zeylanica *willd. sp.*	*de Ceylan.* S. CH. ♆
guineensis *willd. sp.*	*de Guinée.* S. CH. ♃
carnea *willd. enum.*	*couleur de chair.* CHINE. OR. ♃
ALETRIS	*ALETRIS*
fragrans / DRACÆNA fragrans *BOT. MAG.*	*odorant.* CAP. S. CH. ♄
VELTHEIMIA	*VELTHEIMIA*
capensis. / viridiflora *willd. sp.* / ALETRIS capensis L.	*du Cap.* OR. ♆
glauca *Jacq. H. sch.*	*glauque.* CAP. S. CH. ♆
TRITOMA	*TRITOMA*
uvaria *red. lil.* / ALETRIS uvaria L. / veltheimia uvaria *willd. sp.*	*à grappe.* CAP. OR. ♆
sarmentosa. / media *red. lil.* / ALETRIS sarmentosa *Andr. rep.*	*sarmenteux.* CAP. OR. ♆
PITCAIRNIA	*PITCAIRNIA*
bromeliæfolia *l'her. sert.*	*à feuilles d'Ananas.* ANTILLES. S. CH. ♆
angustifolia *H. K.*	*à feuill. étroit.* ANTILL. S. CH. ♆
latifolia *H. K.*	*à larg. feuill.* INDE. S. CH. ♆
ALOE	*ALOÈS*
purpurea *encycl.* / DRACÆNA marginata *willd. sp.*	*à bords rouges,* île de BOURBON. S. CH. ♄

vulgaris *Dec. pl. gr.*	*commun.* barbarie. s. ch. ♄
abyssinica *Encycl.*	*d'Abyssinie.* s. ch. ♄
paniculata *Jacq. Frag.*	*paniculé.* cap. s. ch. ♄
rubescens *Dec. pl. gr.*	*rougeâtre.* inde. s. ch. ♄
soccotrina *Dec. pl. gr.*	*soccotrin.* cap. s. ch. ♄
fruticosa *Encycl.* / arborescens *Dec. pl. gr.*	*corne-de-belier.* cap. s. ch. ♄
ferox *H. K.*	*hérissé.* cap. s. ch. ♄
mitræformis *Encycl.*	*mitré.* cap. s. ch. ♄
— angustior.	*— à feuilles étroites.*
rhodacantha *Dec. pl. gr.*	*à épines rouges.* cap. s. ch. ♄
perfoliata. / serra *Dec. pl. gr.*	*perfolié.* cap. s. ch. ♄
brevifolia *Dec. pl. gr.*	*à feuilles courtes.* cap. s. ch. ♄
humilis *L.*	*nain.* cap. s. ch. ♆
echinata *Willd. Enum.*	*hérissé.*
umbellata *Dec. pl. gr.*	*ombellifère.* cap. s. ch. ♄
maculata. / picta *Dec. pl. gr.*	*moucheté.* cap. s. ch. ♄
tenuifolia *Encycl.*	*à feuill. minces.* cap. s. ch. ♄
variegata *L.*	*perroquet.* cap. s. ch. ♄
nigricans.	*vert-noir.* cap. s. ch. ♄
disticha *L.*	*bec-de-canne.* cap. s. ch. ♆
— triangularis.	*— triangulaire.* cap. s. ch. ♆
— latifolia.	*— à larg. feuill.* cap. s. ch. ♆
carinata *Dec. pl. gr.*	*tuberculeux.* cap. s. ch. ♄
obliqua *Dec. pl. gr.*	*oblique.* cap. s. ch. ♄
plicatilis *L.*	*éventail.* cap. s. ch. ♄
spiralis *L.*	*en spirale.* cap. s. ch. ♄
viscosa *L.*	*visqueux.* cap. s. ch. ♄
retusa *L.*	*écrasé.* cap. s. ch. ♄
rigida *Dec. pl. gr.*	*à feuilles roïdes.* cap. s. ch. ♆
pentagona *H. K.*	*pentagône.* cap. s. ch. ♄
margaritifera *L.*	*perlé.* cap. s. ch. ♄
radula *Jacq. H. sch.*	*radula.* cap. s. ch. ♄
cymbæfolia *Willd. Enum.*	*en nacelle.* cap. s. ch. ♄
arachnoidea *L.*	*patte d'araignée.* cap. s. ch. ♆
atrovirens *Dec. pl. gr.*	*vert-livide.* cap. s. ch. ♄
ANTHERICUM	*ANTHÉRIC*
frutescens *L.*	*arbrisseau.* cap. or. ♄
alooides *L.*	*à feuill. d'Aloès.* cap. or. ♆
annuum *L.*	*annuel.* cap. ☉
ECHEANDIA	*ECHEANDIA*
terniflora *Red. Lil.* / ANTHERICUM reflexum *Cav. Ic.*	*à fleurs ternées.* cuba. s. ch. ♆
PHALANGIUM (ANTHERICUM *L.*)	*PHALANGIUM*
revolutum *L.*	*recourbé.* cap. or. ♆

ramosum *L.*	*rameux.* F. ♆
Liliago *L.*	*à grappes.* F. ♆
Liliastrum *L.*	*Lis de St. Bruno.* Alpes. ♄ (orn.)
bicolor *Desf. Atl.*	*bicolor.* F. ♄
milleflorum *Red. Lil.* / Arthropodium paniculatum *Brown. prodr.*	*mille-fleurs.* N. Holl. or. ♄
pendulum *Red. Lil.*	*à fl. pendantes.* N. Holl. or. ♄
Asphodelus	*Asphodèle*
luteus *L.*	*jaune.* F. m. ♆
capillaris *Red. Lil.*	*capillaire.* or. ♆
tauricus *Mars. cauc.*	*de la Tauride.* ♄
ramosus *L.*	*rameux.* F. ♄
spicatus.	*à grappe.* F. m. ♆
fistulosus *L.*	*fistuleux.* F. m. ♄
Eucomis	*Eucomis*
undulata *H. K.*	*ondulé.* cap. or. ♄
regia *Red. Lil.*	*couronné.* cap. s. ch. ♆
punctata *l'Her. sert.*	*tacheté.* cap. s. ch. ♆
Massonia	*Massonia*
pustulata *Red. Lil.*	*pustuleux.* cap. s. ch. ♄
latifolia *Jacq. H. sch.*	*à feuill. larg.* cap. s. ch. ♆
violacea *Red. Lil.* / Polyanthes pygmea *Jacq. Ic.* / Agapanthus ensifol. *Willd. sp.* / Mauhlia ensifolia *Thunb. Pr.*	*à fleurs violettes.* cap. s. ch. ♄
Drimmia	*Drimmia*
elata *Jacq. Ic.*	*élevé.* cap. or. ♄
Hyacinthus	*Jacinte*
non-scriptus *L.*	*des bois.* F. ♄
patulus. / amethystinus *Encycl.*	*étalée.* ♆
amethystinus *L.* / hispanicus *Encycl.*	*améthyste.* Pyrénées. ♄
romanus *L.*	*de Rome.* F. ♆
serotinus *L.*	*rouillée.* Espagne. ♆
orientalis *L.*	*d'Orient.* ♆ (orn.)
viridis *L.* / Lachenalia viridis *H. K.* / zuccagnia viridis *Willd. En.*	*verte.* cap. or. ♆
Muscari	*Muscari*
moschatum *Willd. Enum.*	*odorant.* orient. ♆ (orn.)
comosum *Willd. Enum.*	*chevelu.* F. ♆
— monstrosum.	— *monstrueux.* (orn.)

racemosum *willd. enum.* — *à grappe.* F. ♆
botryoides *willd. enum.* — *botryoïde.* F. ♆

PHORMIUM
tenax *forster. gen.* — *Lin de la N. Zélande.* or. ♆ (écon.)

LACHENALIA
pendula *Jacq. ic.* — *à fleurs pendantes.* or. ♌
lanceæfolia *Jacq. ic.* — *lancéolé.* cap. or. ♆
pallida *willd. sp.* — *à fleurs pâles.* cap. or. ♆
tricolor *Jacq. ic.* — *tricolore.* cap. or. ♌
luteola *Jacq. ic.* — *jaune.* cap. or. ♆
angustifolia *Jacq. ic.* — *à feuilles étroites.* cap. or. ♌
orchioides *Jacq. ic.* — *moucheté.* cap. or. ♆

CYANELLA
capensis *L.* — *du Cap.* or. ♌

ALBUCA
alba *Encycl.* — *blanc.* cap. or. ♌
cornuta *Red. Lil.* — *jaune.* cap. or. ♌
major *L.* — *petit.* cap. or. ♌
minor *L.*
abyssinica *Jacq. ic.* — *d'Abyssinie.* s. ch. ♌
asphodelus abyssinicus *Enc.*

SCILLA
maritima *L.* — *maritime.* F. m. or. ♌ (méd.)
peruviana *L.* — *du Pérou.* Pyrénées. ♌ (orn.)
italica *L.* — *d'Italie.* ♆
amœna *L.* — *agréable.* orient. ♌
Liliohyacinthus *L.* — *Lis-jacinte.* F. ♆
pomeridiana *Dec. cat.* — *poméridienne.* F. ♌
hyacinthoides *L.* — *Jacinte.* Madère. or. ♆
bifolia *L.* — *à deux feuilles.* F. ♆
undulata *Desf. Atl.* — *ondée.* Tunis. or. ♆
autumnalis *L.* — *d'automne.* F. ♆

ERIOSPERMUM
lanceæfolium *Jacq. ic.* — *lancéolé.* cap. or. ♌

ORNITHOGALUM
luteum *L.* — *jaune.* F. ♆
tenuifolium *Red. Lil.* — *à feuilles menues.* or. ♆
pyrenaicum *L.* — *des Pyrénées.* F. ♆
pyramidale *willd. sp.* — *pyramidal.* F. m. ♆
narbonense *L.* — *de Narbonne.* F. ♌
trigynum *Red. Lil.* — *à trois styles.* ♌
lacteum *Jacq. ic.* — *blanc de lait.* cap. or. ♌
umbellatum *L.* — *ombellifère.* F. ♆
nutans *L.* — *à fleurs penchées.* F. ♆

longibracteatum *Jacq. hort.* — *à longues bractées.* cap. or. ♄
arabicum *L.* — *d'Arabie.* Alger. or. ♄ (orn.)
thyrsoides *H. K.* — *en thyrse.* cap. or. ♄ (orn.)

ALLIUM. — *AIL.*

1. *Folia teretia aut sub-teretia.* — 1. Feuilles cylindriques ou presque cylindriques.

cepa *L.* — *oignon.* ♂ (écon. méd.)
schœnoprasum *L.* — *civette.* sibérie. ♆ (écon.)
ascalonicum *L.* — *échalotte.* palest. ♄ (écon.)
glaucum. } foliosum *Dec. syn.* — *glauque.* F. m. ♄
globosum *Red. Lil.* — *globuleux.* caucase. ♆
moschatum *L.* — *musqué.* F. ♆
obtusiflorum *Red. Lil.* — *à fleurs obtuses.* corse. or. ♄
bisulcum *Red. Lil.* — *à deux sillons.* ♆
flavum *L.* — *jaune.* F. ♆
vineale *L.* — *des vignes.* F. ♆
sphærocephalum *L.* — *à tête ronde.* F. ♄
pallens *L.* — *à fleurs pâles.* F. ♆
paniculatum *L.* — *paniculé.* suisse. ♆
lusitanicum *Red. Lil.* — *de Portugal.* ♆
longispathum *Red. Lil.* — *à long spathe.* F. ♆
oleraceum *L.* — *verdâtre.* F. ♆

2. *Folia plana.* — 2. Feuilles plates.

carinatum *L.* — *en carène.* F. ♆
angulosum *L.* — *anguleux.* F. ♄
baïacalense *Willd. Enum.* — *du lac Baïcal.* ♆
roseum *L.* — *rose* F. ♆
— bulbiferum. — *— bulbifère.*
striatum *Jacq. ic.* — *strié.* cap. or. ♆
denudatum *Red. Lil.* — *dénudé.* ♆
cernuum *Roth. cat.* — *incliné.* ♆
tartaricum *L. f.* — *de Tartarie.* ♆
carolinianum *Red. Lil.* — *de Caroline.* ♄
album *Red. Lil.* — *blanc.* F. m. ♆
ciliare *Red. Lil.* — *cilié.* ♄
brachystemon *Red. Lil.* — *à courtes étamines.* ♆
subhirsutum *L.* — *velu.* orient. ♆
nutans *L.* — *penché.* sibérie. ♆
sativum *L.* — *cultivé.* sicile. ♆ (écon. méd.)
scorodoprasum *L.* — *rocambolle.* F. ♆ (écon.)
arenarium *L.* — *des sables.* F. ♆
obliquum *L.* — *oblique.* sibérie. ♆
Ampeloprasum *L.* — *Ampéloprasum.* orient. ♄
porrum *L.* — *poireau.* suisse. ♄ (écon.)
monspesullanum *Gouan ill.* — *de Montpellier.* ♄
victorialis *L.* — *à feuilles de plantain.* F. ♆

ursinum *L.*
scorzoneræfolium *Red. Lil.*
moly *L*
fragrans *Vent. H. cels.*

POLIANTHES
tuberosa *L.*

HEMEROCALLIS
fulva *L.*
flava *L.*
cœrulea *Red. Lil.*
japonica *Thunb. Jap.*

AGAPANTHUS
crinum africanum *L.*
umbellatus *l'Her. sert.*
— minor.

ORDO VIII.

NARCISSEÆ.

DORIANTHES
excelsa *correa s. Lin.*
correa *Brown. prodr.*

AGAVE
americana *L.*
— variegata.
lurida *Jacq. coll. ?*
mexicana.
— angustifolia.
vivipara *L.*
fœtida *L.*
manguai.
bulbifera *Bonpland.*
yuccæfolia *Red. Lil.*
spicata *Dec. cat.*

ALSTROEMERIA
pelegrina *L.*
Ligtu *L.*

HÆMANTHUS
coccineus *L.*
puniceus *L.*
pubescens *L. f.*
albiflos *Jacq. H. sch.*

pétiolé. F. ♆
à feuill. de scorsonère. ♄
Moly. F. ♆
odorant. cap. or. ♆

TUBÉREUSE
des jardins. inde. or. ♄ (orn.)

HÉMÉROCALLE
rouge. chine. ♄ (orn.)
jaune. suisse. ♆ (orn.)
bleue. chine. or. ♄ (orn.)
du Japon. ♄ (orn.)

AGAPANTHUS
ombellifère. cap. or. ♆ (orn.)
— *petit.*

ORDRE VIII.

NARCISSÉES.

DORIANTHES
élevé. N. Holl. s. ch. ♄

AGAVÉ
d'Amérique. Am. m. or. ♄ (orn.)
— *panaché.*
du Mexique. s. ch. ♄
— *à feuilles étroites.*
vivipare. Am. m. s. ch. ♄
Aloès-Pitt. Am. m. s. ch. ♄
Manguai. Mexique. s. ch. ♄
à feuilles d'Yucca. s. ch. ♆
à épis. Am. m. s. ch. ♆

PÉLÉGRINE
tachetée. Pérou. or. ♆ (orn.)
veinée. Pérou. or. ♆ (orn.)

HÉMANTHE
écarlate. cap. or. ♄ (orn.)
ponceau. cap. or. ♄ (orn.)
pubescent. cap. or. ♄ (orn.)
à fleurs blanches. cap. or. ♆ (orn.)

quadrivalvis *Jacq. H. sch.*	*à quatre valves.* cap. or. ♄ (orn.)
lanceæfolius. *Jacq. H. sch.*	*à f. en lance.* cap. or. ♄ (orn.)
multiflorus *Red. Lil.*	*à fleurs nombreuses.* guinée. s. ch. ♆ (orn.)
Crinum	*Crinum*
asiaticum *Red. Lil.*	*d'Asie.* malabar. s. ch. ♆ (orn.)
americanum *Red. Lil.*	*d'Amérique.* Am. m. s. ch. ♆ (orn.)
erubescens *Red. Lil.*	*à bords rouges.* Am. m. s. ch. ♆
commelini. *Red. Lil.*	*de Commelin.* Am. m. s. ch. ♄ (orn.)
giganteum *Red. Lil.*	*gigantesque.* siéra-Léona. s. ch. ♆ (orn.)
otaïtense *Red. Lil.*	*de Taïti.* s. ch. ♆ (orn.)
multiflorum.	*à fl. nombreus.* s. ch. ♆ (orn.)
Cirthanthus	*Cirthanthus*
obliquus *Red. Lil.* / Amaryllis umbellata *l'Her. sert.*	*oblique.* cap. or. ♆ (orn.)
angustifolius *H. K.* / crinum angustifolium *L. f.*	*à f. étroites.* cap. or. ♆ (orn.)
Anigozanthos	*Anigozanthos*
flavida *Red. Lil.*	*à fleurs jaunes.* N. Holl. or. ♆
Amaryllis	*Amaryllis*
lutea *L.*	*jaune.* F. m. ♆ (orn.)
Atamasco *L.*	*Atamasco.* Am. s. ♄ (orn.)
formosissima *L.*	*Lis de S.-Jacques.* Mexique. or. ♆ (orn.)
broussonetii *Red. Lil.* / ornata *Bot. Mag.*	*de Broussonet.* s. ch. ♆ (orn.)
longifolia *Red. Lil.*	*à feuilles longues.* cap. or. ♄ (orn.)
belladona *l'Her. sert.*	*Belladone.* cap. ♆ (orn.)
reginæ *l'Her. sert.*	*de la reine* cap. or. ♄ (orn.)
revoluta *l'Her. sert.* / variabilis *Jacq. H. sch.*	*réfléchie.* cap. or. ♆ (orn.)
equestris *Red. Lil.* / punicea. *Encycl.*	*rose.* Am. m. s. ch. ♆ (orn).
vittata *l'Her. sert.*	*veinée.* cap. or. ♄ (orn.)
Josephinæ *Red. Lil.*	*de Joséphine.* Afr. mér. s. ch. ♆ (orn.)
sarniensis *L.*	*Grénésienne.* Grénesey. or. ♆ (orn.)
curvifolia *Jacq. H. sch.*	*à feuilles courbes.* cap. or. ♆ (orn.)

gigantea *H. K.*	*gigantesque.* siéra-Léona. s. ch. ♆ (orn.)
Jagus *Thomps.*	
undulata *L. s. veg.*	*ondulée.* cap. or. ♆ (orn.)
aurea *l'Her. sert.*	*jaune.* chine. s. ch. ♄ (orn.)
spectabilis.	*élégante.* s. ch. ♆
PANCRATIUM	*PANCRATIUM*
speciosum *Red. Lil.*	*élégant.* Antilles. s. ch. ♆ (orn.)
littorale *Red. Lil.*	*des rivages.* Am. m. s. ch. ♄ (orn.)
fragrans *Red. Lil.*	*odorant.* Am. m. s. ch. ♆ (orn.)
declinatum *Red. Lil.*	*abaissé.* Guiane. s. ch. ♆ (orn.)
amboinense *L.*	*d'Amboine.* s. ch. ♆ (orn.)
illyricum *L.*	*de Dalmatie.* ♄ (orn.)
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆ (orn.)
NARCISSUS	*NARCISSE*
poeticus *L.*	*des poètes.* F. ♆ (orn.)
biflorus *Bot. Magaz.*	*à deux fleurs.* Angleterre. ♆
pseudo-narcissus *L.*	*porion.* F. ♄ (orn.)
— bicolor *Gouan Ill.*	*— bicolor.* F. ♄ (orn.)
odorus *L.*	*odorant.* F. m. ♆ (orn.)
pumilus *Red. Lil.*	*nain.* ♄
calathinus *Red. Lil.*	*à grande coupe.* Portug. or. ♆
minor *L.*	*petit.* Espagne. ♆
Tazetta *L.*	*à bouquets.* F. m. ♄ (orn.)
Jonquilla *L.*	*Jonquille.* F. m. ♄ (orn.)
pseudo-Jonquilla.	*Fausse Jonquille.* ♄
Bulbocodium *L.*	*trompette.* F. m. ♄ (orn.)
LEUCOIUM	*LEUCOIUM*
vernum *L.*	*printanier.* Alpes ♆
æstivum *L.*	*d'été.* F. ♆
trichophyllum *Red. Lil.*	*à feuilles menues.* Corse. or. ♆
GALANTHUS	*GALANTHUS*
nivalis *L.*	*perce-neige.* F. ♆ (orn.)
HYPOXIS	*HYPOXIS*
erecta *L.*	*à tige droite.* Am. s. or. ♄
sobolifera *Willd. sp.*	*à rejeton.* cap. or. ♆
stellata *Red. Lil.*	*étoilé.* cap. or. ♄
tridentata *Red. Lil.*	*à trois. dents.* cap. or. ♆
BROMELIA	*ANANAS*
Ananas *L.*	*cultivé.* Antilles. s. ch. ♆ (alim.)
pinguin *L.*	*pinguin.* Antilles. s. ch. ♆
TILLANDSIA	*TILLANDSIA*
serrata *L.?*	*à feuill. en scie.* Antill. s. ch. ♆

ORDO IX.

IRIDEÆ.

SISYRINCHIUM
- Bermudiana *willd. sp.*
- gramineum *Bot. magaz.*
- anceps *willd. sp.*
- convolutum *Red. Lil.*
- tenuifolium *Red. Lil.*
- striatum *Smith. Ic. pictæ.*

TIGRIDIA
- pavonia *Red. Lil.*

FERRARIA
- undulata *L.*

IRIS.

1. *Barbatæ.*

- susiana *L.*
- florentina *L.*
- germanica *L.*
- — cœrulea.
- — violacea.
- pallida *Lamk. Ill.*
- flavescens *Red. Lil.*
- sambucina *Red. Lil.*
- plicata *Lamk. Ill.*
- swertii *Lamk. Ill.*
- squalens *L.*
- variegata *L.*
- aphylla? *L.*
- pumila *L.*
- — cærulea.
- lutescens *Lamk. Ill.*
- cristata *Red. Lil.*
- arenaria *Kitt. et Wald. Hung.*

2. *Imberbes.*

- Pseudo-Acorus *L.*
- fœtidissima *L.*
- Monnieri *Red. Lil.*
- ochroleuca *Willd. sp.*
- spuria *L.*
- fimbriata *Vent. H. cels.*
- sibirica *L.*
- pratensis *Lamk. Ill.*

ORDRE IX.

IRIDÉES.

BERMUDIENNE
- *à petites fleurs.* Am. s. ♆
- *à feuilles de Gramen.* virginie. ♄
- *roulée.* mexique. or. ♄
- *à feuilles menues.* mexique. or. ♆
- *à réseau.* mexique. or. ♄

TIGRIDIA
- *panaché.* mexique. or. ♆ (orn).

FERRARIA
- *ondulé.* cap. or. ♆

IRIS.

1. Fleurs barbues.

- *de Suze.* orient. or. ♆ (orn.)
- *de Florence.* italie. ♆ (méd.)
- *Flambe.* F. ♄ (orn.)
- — *bleue.*
- — *violette.*
- *pâle.* orient. ♄ (orn.)
- *jaunâtre.* ♆ (orn.)
- *à odeur de sureau.* F. ♄
- *plissé.* orient. ♆
- *de Swert.* ♆
- *sale.* F. m. ♄
- *panaché.* Hongrie. ♆
- *sans feuilles.* ♄
- *nain.* F. ♆ (orn.)
- — *bleu.*
- *jaune-pâle.* F. ♄
- *à crête.* Am. s. ♆
- *des sables.* Hongrie. ♄

2. Fleurs sans barbe.

- *des marais.* F. ♄ (méd.)
- *fétide.* F. ♄
- *de le Monnier.* orient. ♄
- *jaune.* orient. ♄
- *bâtard.* F. ♆
- *frangé.* chine. or. ♆
- *de Sibérie.* ♆

versicolor L.	*bigarré.* Am. s. ♆
stenogyna *Red. Lil.*	*à stigmates étroits.* ♆
Gawleri *Red. Lil.*	
graminea L.	*à f. de Gramen.* Autriche. ♆
scorpioides *Desf. Atl.*	*Queue de scorpion.* Barb. ♆
xiphium L.	*Xiphium.* F. m. ♄ (orn.)
xiphioides *Red. Lil.*	*xiphioïde.* Esp. or. ♆ (orn.)
tuberosa L.	*Hermodate.* orient. or. ♆
persica L.	*de Perse.* or. ♆
sisyrinchium L.	*à feuilles de safran.* or. ♆
curtopetala *Red. Lil.*	*à pétales bossus.* or. ♆
Vieusseuxia	*Vieusseuxia*
glaucopis *Dec. Ann. du Mus.*	*à taches bleues.* cap. or. ♆
iris tricuspis *Thunb. prodr.*	
Moræa	*Moréa*
iridioides L.	*Faux Iris.* cap. or. ♄
Northiana *Andr. Rep.*	*à gaînes.* cap. or. ♄
vaginata *Red. Lil.*	
elegans *Jacq. H. sch.*	*élégant.* cap. or. ♆
sisyrinchium elegans *Red. Lil.*	
sordescens *Jacq. Ic.*	*étalé.* cap. or. ♆
chinensis *Willd. sp.*	*de Chine.* ♆ (orn.)
ixia chinensis L.	
Belamcanda chinensis *Red. Lil.*	
Ixia	*Ixia*
Bulbocodium L.	*Bulbocodium.* F. ♆
— parviflorum *Red. Lil.*	*— à petites fleurs.*
crocata L.	*safrané.* cap. or. ♄ (orn.)
hyalina *Red. Lil.*	
miniata *Jacq. H. sch.*	*couleur de minium.* cap. or. ♄ (orn.)
— maculata.	*— maculé.*
polystachia L.	*à plusieurs épis.* cap. or. ♆
scillaris *Bot. Magaz.*	*à fleurs de scille.* cap. or. ♆
tricolor *Bot. Magaz.*	*tricolor.* cap. or. ♄
anemonæflora *Jacq. Ic.*	*à fl. d'Anémone.* cap. or. ♄
fusco-citrina *Red. Lil.*	*brun-citron.* cap. or. ♄
leucantha *Jacq. Ic.*	*à fleurs blanches.* cap. or. ♄
bulbifera L.	*bulbifère.* cap. or. ♆
longiflora *Lamk. Ill.*	*à longues fleurs.* cap. or. ♆
Gladiolus longiflorus *Jacq. Ic.*	
erecta *Vahl. sp.*	*à tige droite.* cap. or. ♄
maculata *Jacq. H. sch.*	*maculé.* cap. or. ♄
viridis *Jacq. H. sch.*	*à fleurs vertes.* cap. or. ♄
cruciata *Jacq. Ic.*	*crucifère.* cap. or. ♄
Liliago. *Red. Lil.*	*à fleurs de Lis.* cap. or. ♄

GALAXIA	*GALAXIA*
ixiæflora *Red. Lil.* ixia columnaris *Andr. Rep.*	*à fleurs d'ixia.* cap. or. ♄
DIASIA	*DIASIA*
iridifolia *Red. Lil.*	*à feuilles d'iris.* cap. or. ♆
graminifolia *Red. Lil.*	*à feuill. de gramen.* cap. or. ♆
GLADIOLUS	*GLAYEUL*
communis *L.*	*commun.* F. ♄ (orn.)
— grandiflorus.	*— à grande fleur.* (orn.)
plicatus *L.*	*plissé.* cap. or. ♆
mucronatus *Jacq. Ic.*	*mucroné.* cap. or. ♆
xanthopylus *Red. Lil.*	*à taches jaunes.* cap. or. ♄
undulatus *Jacq. Ic.*	*ondulé.* cap. or. ♆
strictus *Red. Lil.*	*serré.* cap. or. ♄
hirsutus *Jacq. Ic.*	*velu.* cap. or. ♄
cardinalis *Red. Lil.*	*cardinal.* cap. or. ♆ (orn.)
tristis *L.*	*triste.* cap. or. ♆
angustus *L.*	*à feuilles étroites.* cap. or. ♆
carneus *Jacq. Ic.*	*couleur de chair.* cap. or. ♄
ringens *Jacq. Ic.*	*à deux lèvres.* cap. or. ♆
cuspidatus *Jacq. Ic.*	*pointu.* cap. or. ♆
lineatus *Red. Lil.*	*veiné.* cap. or. ♆
MERIANUS *Jacq. Ic.* ANTHOLIZA MERIANA *L.*	*de Mérian.* cap. or. ♄
tubatus *Jacq. Ic.*	*trompette.* cap. or. ♄
tubiflorus *Jacq. Ic.* inclinatus *Red. Lil.*	*tubulé.* cap. or. ♆
junceus *Red. Lil.* LAPEYROUSIA juncea *Pourret. Act. Tolos.*	*jonciforme.* cap. or. ♆
securiger *Bot. Magaz.* MONTBRETIA securigera *Red. Lil.*	*en doloire.* cap. or. ♆
ANTHOLYZA	*ANTHOLYZE*
æthiopica *L.*	*d'Ethiopie.* cap. or. ♆ (orn.)
cunonia *L.*	*cunonia.* cap. or. ♄ (orn.)
CROCUS	*SAFRAN*
vernus *Red. Lil.*	*printanier.* F. ♄ (orn.)
multifidus *Ramond. S. Phil.*	*découpé.* Pyrénées. ♄
biflorus *Red. Lil.*	*à deux fleurs.* ♄ (orn.)
susianus *Red. Lil.*	*de Suze.* orient. ♆ (orn.)
luteus *Red. Lil.*	*jaune.* ♆ (orn.)
sativus *Willd. Sp.*	*cultivé.* orient. ♆ (éc. méd.)
WACHENDORFIA	*WACHENDORFIA*
thyrsiflora *L.*	*à fleurs en grappes.* cap. or. ♆
PONTEDERIA	*PONTEDERIA*
cordata *L.*	*à f. en cœur.* AM. S. ♄ (orn.)

CLASSIS IV.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

MUSÆ.

MUSA
sapientum *L.*
paradisiaca *L.*
— violacea.
coccinea *Andr. Rep.*

HELICONIA
humilis *Jacq. H. sch.*

RAVENALA
madagascariensis *Encycl.*

STRELITZIA
reginæ *H. K.*

ORDO II.

CANNÆ.

CANNA
indica *L.*
glauca *L.*
gigantea *Red. Lil.*
flaccida *Red. Lil.*

GLOBBA
nutans *Red. Lil.*
renealmia nutans *Willd. Enum.*
erecta *Red. Lil.*

AMOMUM
zingiber *L.*
zerumbet *L.*

CLASSE IV.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

BANANIERS.

BANANIER
à petit fruit. inde. s. ch. ♄ (alim.)
à grand fruit. inde. s. ch. ♄ (alim.)
— *violet.*
écarlate. chine. s. ch. ☿

HÉLICONIA
de Jacquin. caracas. s. ch. ☿

RAVÉNAL
de Madagascar. s. ch. ♄

STRÉLITZIA
de la reine. cap. s. ch. ♄

ORDRE II.

BALISIERS.

BALISIER
des Indes. s. ch. ☿
glauque. caroline. or. ☿
gigantesque. s. ch. ♄
flasque. caroline. or. ☿

GLOBBA
à fleurs penchées. inde. s. ch. ♄
à fleurs droites. inde? s. ch. ☿

AMOME
gingembre. inde. s. ch. ♄ (écon. méd.)
zérumbet. inde. s. ch. ♄ (écon. méd.)

cardamomum L.

granum-paradisi L.

HEDYCHIUM
coronarium BOT. MAGAZ.

COSTUS
arabicus L.

MARANTA
arundinacea L.

PERONIA
stricta RED. LIL.

CURCUMA
longa L.

KÆMPFERIA
galanga L.
longa JACQ. H. SCH.
angustifolia WILLD. ENUM.

ORDO III.

ORCHIDEÆ.

ORCHIS.

1. *Bulbis indivisis.*

bifolia L.
pyramidalis L.
coriophora L.
morio L.
mascula L.
laxiflora *encycl.*
ustulata L.
militaris L.
variegata *encycl.*
simia *encycl.*
hircina *swartz. orch.* }
satyrium hircinum L. }

2. *Bulbis palmatis.*

latifolia L.
maculata L.
conopsea L.
abortiva L.

cardamome. INDE. S. CH. ♃ (ÉCON. MÉD.)
graine-de-paradis. AFR. S. CH. ♃ (MÉD.)

HÉDYCHIUM
à bouquets. INDE. S. CH. ♃

COSTUS
d'Arabie. INDE. S. CH. ♆ (MÉD.)

MARANTA
à f. de balisier. ANT. S. CH. ♆

PÉRONIA
à tige droite. S. CH. ♃

CURCUMA
safran des Indes. S. CH. (ÉCON. MÉD.)

KÆMPFERIA
galanga. INDE. S. CH. ♆ (MÉD.)
allongé. INDE. S. CH. ♃
à feuilles étroites. S. CH. ♆

ORDRE III.

ORCHIDÉES.

ORCHIS.

1. Bulbes entières.

à deux feuilles. F. ♃
pyramidal. F. ♃
fétide. F. ♆
morio. F. ♃
mâle. F. ♆
à fleurs lâches. F. ♆
charbonné. F. ♆
militaire. F. ♆
panaché. F. ♃
singe. F. ♆
puant. F. ♆

2. Bulbes palmées.

à larges feuilles. F. ♃
maculé. F. ♃
à long éperon. F. ♃
avorté. F. ♃

viridis *swartz orch.* satyrium viride L.	*vert.* F. ♆
OPHRYS	*OPHRYS*
anthropophora L.	*homme.* F. ♆
insectifera L.	*insecte.* F. ♄
— musciflora.	— *mouche.*
— arachnites.	— *araignée.*
— rubiginosa.	— *rouillé.*
NEOTTIA	*NÉOTTIA*
elata *willd. sp.*	*élancé.* Antilles. s. ch. ♆
spiralis *swartz. orch.* ophrys spiralis L.	*en spirale.* F. ♆
æstivalis. ophris æstivalis *encycl.*	*d'été.* F. ♄
MALAXIS	*MALAXIS*
lilifolia *swartz orch.* ophrys lilifolia L.	*à feuilles de lis.* canada. ♆
LOESELII *swartz. orch.* ophrys LOESELII L.	*de Loesel.* F. ♄
EPIPACTIS	*EPIPACTIS*
latifolia *swartz. orch.* serapias latifolia L.	*à larges feuilles.* F. ♄
palustris *swartz. orch.* serapias longifolia L. *s. veg.*	*des marais.* F. ♆
pallens *swartz. orch.* serapias grandiflora L.	*à grandes fleurs.* F. ♄
rubra *swartz. orch.* serapias rubra L.	*rouge.* F. ♆
NIDUS-AVIS *willd. sp.* ophrys NIDUS-AVIS L.	*Nid-d'oiseau.* F. ♆
ovata *willd. sp.* ophrys ovata L.	*double-feuille.* F. ♆
LIMODORUM	*LIMODORUM*
TANKERVILLIÆ *swartz. orch.*	*de Tankerville.* chine. s. ch. ♆ (orn.)
CYMBIDIUM	*CYMBIDIUM*
purpureum. LIMODORUM purpureum. *encycl.*	*pourpre.* Antilles. s. ch. ♆
aloifolium *swartz. orch.* EPIDENDRUM aloifolium L.	*à feuilles d'Aloès.* inde. s. ch. ♄
sinense *willd. sp.* EPIDENDRUM sinense *Andr. rep.*	*de Chine.* s. ch. ♆
CYPRIPEDIUM	*CYPRIPÉDIUM*
calceolus L.	*des Alpes.* ♄

EPIDENDRUM
cochleatum L.
elongatum *Jacq. ic.*

VANILLA
aromatica *swartz. orch.* }
epidendrum vanilla L. }

EPIDENDRUM
limaçon. Antilles. s. ch. ♆
allongé. Antilles. s. ch. ♆

VANILLE
aromatique. Am. m. s. ch. ♃ (écon.)

ORDO IV.

HYDROCHARIDEÆ.

VALLISNERIA
spiralis L.

STRATIOTES
alooides L.

HYDROCHARIS
morsus ranæ L.

NYMPHÆA
alba L.
lutea L.

ORDRE IV.

HYDROCHARIDÉES.

VALLISNERIA
en spirale. F. ♃

STRATIOTES
à feuilles d'Aloès. F. ♃

MORÉNE
aquatique. F. ♃

NYMPHÉA
blanc F. ♃
jaune. F. ♃

CLASSIS V.

MONOCOTYLEDONES

APETALÆ.

(stamina epigyna.)

CLASSE V.

MONOCOTYLÉDONS

APÉTALES.

(étamines sur le pistil.)

ORDO I.

ARISTOLOCHIÆ.

ARISTOLOCHIA
pubera *Brown. prodr.*
altissima *Desf. Atl.*
sempervirens L.
ristolochia L.
oblongata *Jaeq. H. sch.*
caudata L.
trilobata L.
sipho *l'Her. stirp.*
rotunda L.
clematitis L.
serpentaria L.

ORDRE I.

ARISTOLOCHES.

ARISTOLOCHE
pubescente. N. holl. or. ♄
élevée. Alger. or. ♄
toujours verte. orient. or. ♄
crénelée. F. m. or. ♃ (méd.)
à f. oblong. caracas. s. ch. ♄
filifère. Antilles. s. ch. ♄
trilobée. Antilles. s. ch. ♄
en siphon. Am. s. ♄
ronde. F. m. ♃ (méd.)
clématite. F. ♃ (méd.)
serpentaire. Am. s. ♃ (méd.)

ASARUM
europæum L.
canadense L.
virginicum L.

ASARUM
d'Europe. F. ♃ (méd.)
de Canada. ♃
de Virginie. or. ♃

CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES

APETALÆ.

(stamina perigyna.)

ORDO I.

ELÆAGNEÆ.

I. Stamina 5, *aut pauciora.*

THESIUM
linophyllum L.

OSYRIS
alba L.

HIPPOPHAE
rhamnoides L.
canadensis L.

ELÆAGNUS
angustifolia L.

NYSSA
aquatica L.
denticulata *H. K.*
angulisans *Mich. Fl.*
villosa *Mich. Fl.*
candicans *Mich. Fl.*

II. Stamina sæpiùs 10.

BUCIDA
buceras L.

TERMINALIA
angustifolia *Jacq. Hort.*
benzoin L. *f.*

CLASSE VI.

DICOTYLÉDONS

APÉTALES.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

CHALEFS.

I. Cinq étamines, ou moins.

THÉSIUM
à feuilles de lin. F. ♆

OSYRIS
blanc. F. ♄

HIPPOPHAE
rhamnoïde. F. ♄
de Canada. ♄

CHALEF
à feuill. étroit. orient. ♄ (orn.)

TUPÉLO
aquatique. Am. S. ♄
velu. Am. S. ♄
blanchâtre. Am. S. ♄

II. Ordinairement 10 étamines.

BUCIDA
cornu. Antilles. S. Ch. ♄

BADAMIER
à feuilles étroit. Inde. S. Ch. ♄

ORDO II.

THYMELEÆ.

DIRCA
palustris *L.*

DAPHNE.

1. *Floribus lateralibus.*

mezereum *L.*
— album.
thymelæa *L.*
tarton-raira *L.*
alpina *L.*
pontica *L.*
laureola *L.*

2. *Floribus terminalibus.*

odora *Thunb. Jap.* }
sinensis *Encycl.* }
collina *Smith. spicil.*
cneorum *L.*
gnidium *L.*

PASSERINA
hirsuta *L.*
dioica *Ramond. soc. phil.* }
daphne dioica *Gouan. ill.* }
spicata *L. f.*
filiformis *L.*
grandiflora. *L. f.*

STELLERA
passerina *L.*

STRUTHIOLA
virgata *L. Mant.*
erecta *L. Mant.*
imbricata. *Andr. Rep.*

LACHNEA
eriocephala *Willd. sp.*

DAIS
cotinifolia *L.* }
laurifolia *Jacq. ic.* }

GNIDIA
simplex *L. Mant.*
pinifolia *L. f.*

ORDRE II.

THYMÉLÉES.

DIRCA
bois-cuir. Am. s. ♄

DAPHNÉ.

1. Fleurs latérales.

bois-gentil. F. ♄ (orn.)
— *à fleurs blanches.*
thymélée. F. ♄ (orn.)
tarton-raire. F. m. or. ♄
des Alpes. ♄
de Pont. Asie. ♄
Lauréole. F. ♄

2. Fleurs terminales.

odorant. Japon. or. ♄ (orn.)
d'Italie. or. ♄
cneorum. F. ♄ (orn.)
Garou. F. m. ♄ (méd.)

PASSERINE
cotonneuse. F. m. or. ♄
dioïque. Pyrénées. ♄
à épis. Cap. or. ♄
filiforme. Cap. or. ♄
à grandes fleurs. Cap. or. ♄

STELLERA
passerine. F. ☉

STRUTHIOLA
effilé. Cap. or. ♄
à tige droite. Cap. or. ♄
imbriqué. Cap. or. ♄

LACHNEA
à tête laineuse. Cap. or ♄

DAIS
à feuilles de Fustet. Cap. or. ♄

GNIDIA
à tiges simples. Cap. or. ♄
à feuilles de Pin. Cap. or. ♄

ORDO III.

PROTEACEÆ.

PROTEA	*PROTEA*
argentea *L.*	*Arbre d'arg.* cap. or. ♄ (orn.)
pallens *L. Mant.*	*pâle.* cap. or. ♄
conifera *L. Mant.*	*conifère.* cap. or. ♄
toria *Thunb. Diss.*	*tordu.* cap. or. ♄
obliqua *L. f.*	*oblique.* cap. or. ♄
levisanus *L. Mant.*	*levisanus.* cap. or. ♄
hirta *L. Mant.*	*hérissé.* cap. or. ♄
prolifera *Lamk.* (non *Thunb.*)	*prolifère.* cap. or. ♄
saligna *Thunb. Diss.*	*à feuilles de saule.* cap. or. ♄
passerina.	*passerina.* cap. or. ♄
conocarpa *Willd. sp.* / leucospermum conocarpum *Brown. Prot.*	*à fruits coniques.* cap. or. ♄
ciliata. / leucadendrum grandiflorum *Bot. Magaz.*	*cilié.* cap. or. ♄
BANKSIA	*BANKSIA*
serrata *L. f.*	*à feuill. en scie.* N. holl. or. ♄
prærmorsa *Andr. Rep.* / marcescens *Brown. Prodr.*	*tronqué.* N. holl. or. ♄
spinulosa *Smith. N. Holl.*	*épineux.* N. holl. or. ♄
ericifolia *Brown. Prodr.*	*à f. de bruyère.* N. holl. or. ♄
longifolia.	*à long. feuilles.* N. holl. or. ♄
HAKEA	*HAKEA*
gibbosa *Cav. Ic.*	*gibbeux.* N. holl. or. ♄
dactyloides *Cav. Ic.*	*dactyloïde.* N. holl. or. ♄
saligna *Brown. Prodr.* / embothrium salicifolium *Vent. H. Cels.*	*à f. de saule.* N. holl. or. ♄
ceratophylla *Brown. Prodr.*	*à feuill. cornues.* N. holl. or. ♄
suaveolens *Brown. Prodr.*	*odorant.* N. holl. or. ♄
epiglottis *la Bill. N. Holl.*	*épiglotte.* N. holl. or. ♄
pugioniformis *Cav. Ic.?*	*à long. pointes.* N. holl. or. ♄
acicularis *Vent. Malm.*	*à feuilles grêles.* N. holl. or. ♄
EMBOTHRIUM	*EMBOTHRIUM*
sericeum *Smith. N. Holl.* / grevillea sericea *Brown. Prodr.*	*satiné.* N. holl. or. ♄
speciosissimum *Smith. N. Holl.* / telopea speciosiss. *Brown. Prodr.*	*écarlate.* N. holl. or. ♄ (orn).
silaifolium *Smith. N. Holl.*	*à feuill. de silaüs.* N. holl. or. ♄

ORDRE III.

PROTÉACÉES.

PERSOONIA
linearis *brown. prodr.*

ORDO IV.

LAURINEÆ.

LAURUS.

1. *Folia perennantia.*

cinnamomum *L.*

camphora *L.*

cassia *L.*
persea *L.*
nobilis *L.*

indica *L.*
borbonia *L.?*
caroliniensis *Mich. Fl.*
fœtens *H. K.*

2. *Folia decidua.*

geniculata *Mich. Fl.*
benzoin *L.*
sassafras *L.*

HERNANDIA
sonora *L.*

ORDO V.

POLYGONEÆ.

COCCOLOBA
excoriata *L.*
uvifera *L.*
rheifolia. }
latifolia *Encycl.* }
rugosa.
pubescens *L.*
pyrifolia. }
excoriata *Encycl. var. B.* }
fagifolia *Jacq. H. sch.* }
nitida. }
nivea *Swartz. prodr.*
laurifolia.

PERSOONIA
à f. linéaires. N. Holl. or. ♄

ORDRE IV.

LAURINÉES.

LAURIER.

1. Feuilles persistantes.

cannellier. ceylan. s. ch. ♄ (écon. méd.)
camphrier. japon. or. ♄ (écon. méd.)
cassia. inde. s. ch. ♄
Avocat. Antill. s. ch. ♄ (alim.)
d'Apollon. orient. or. ♄ (écon. méd.)
des Indes. canaries. or. ♄
borbonia. or. ♄
de Caroline. or. ♄
fétide. canaries. or. ♄

2. Feuilles tombantes.

géniculé. caroline. or. ♄
faux benjoin. Am. s. ♄
sassafras. caroline. ♄ (méd.)

HERNANDIA
sonore. inde. s. ch. ♄

ORDRE V.

POLYGONÉES.

RAISINIER
écorcé. Antilles. s. ch. ♄
à grappes. Antilles. s. ch. ♄
à feuilles de Rhapontic. Antill. s. ch. ♄
ridé. Antilles. s. ch. ♄
pubescent. Antilles. s. ch. ♄
à feuilles de poirier. Antilles. s. ch. ♄
à feuilles de hêtre. Antilles. s. ch. ♄
à fl. blanch. Antilles. s. ch. ♄
à feuilles de Laurier. Antilles. s. ch. ♄

BRUNNICHIA
cirrhosa *Mich. Fl.*

ATRAPHRAXIS
undulata L.
spinosa L.

POLYGONUM.

1. *Foliis indivisis, floribus octandris, trigynis.*

aviculare L.

Bellardi *All. Ped.*
maritimum L.
frutescens L.
divaricatum L.
alpinum *All. Ped.*
angustifolium. }
diffusum *Encycl.* }

2. *Persicariæ, stylo bifido, stamina minùs* 8.

orientale L.
persicaria L.
— maculata.
lapathifolium L.
minus *Smith. Fl.* }
pusillum *Dec. Fl.* }
Hydropiper L.
amphibium L.
virginianum L.

3. *Bistortæ, spica unica.*

viviparum L.
bistorta L.
— latifolia.

4. *Folia subcordata.*

tataricum L.
Fagopyrum L.
emarginatum *Willd. sp.*
convolvulus L.
dumetorum L.
scandens L.
acetosæfolium *Vent. H. cels.*

RUMEX.

1. *Hermaphroditi, valvulis glandulâ destitutis.*

lunaria L.
vesicarius L.

BRUNNICHIA
à vrilles. Am. s. ♄

ATRAPHRAXIS
ondulé. cap. or. ♄
épineux. orient. ♄

POLYGONE.

1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.

renouée, centinode. F. ♆ (méd.)
de Bellardi. piémont. ♆
maritime. F. ♃
arbrisseau. sibérie. ♄
étalé. sibérie. ♆
des Alpes. ♃
à feuilles étroites. sibérie. ♆

2. Persicaires, style bifide, moins de 8 étamines.

d'Orient. ☉ (orn.).
persicaire. F. ☉
— *maculée.*
à feuilles de Lapatum. F. ☉
nain. F. ☉
poivre-d'eau. F. ☉
amphibie. F. ♃
de Virginie. ♆

3. Bistortes, un seul épi.

vivipare. Alpes. ♃
Bistorte. F. ♃ (méd.)
— *à larges feuilles.*

4. Feuilles en cœur ou hastées.

de Tartarie. ☉ (écon.)
sarrazin. Asie. ☉ (écon.)
échancré. chine. ☉ (écon.).
Liseron. F. ♃
des buissons. F. ♆
grimpant. Am. s. ♃
à f. d'oseille. Brésil. s. ch. ♃

RUMEX.

1. Hermaphrodites, calice sans glandes.

arbrisseau. canaries. or. ♄
vésiculeux. barbarie. ☉

roseus L. — *rose.* égypte. ☉
tingitanus L. — *de Tanger.* or. ♆
scutatus L. — *en bouclier.* F. ♆ (écon.)
— glaucus. — *glauque.*
digynus L. — *à deux styles.* Alpes. ♄
bucephalophorus L. — *tête-de-Bœuf.* F. ☉

2. *Flores diclines.* — 2. Fleurs polygames.

abyssinicus *Jacq. hort.* }
arifolius *L. f.* } — *d'Abyssinie.* s. ch. ♆
alpinus L. — *des Alpes.* ♆ (méd.)
tuberosus *Encycl. an L.?* — *tubéreux.* or. ♆
montanus. }
arifolius *All. ped.* } — *de montagne.* Alpes. ♄
cordatus. — *en cœur.* cap. or. ♄
Acetosa L. — *oseille des prés.* F. ♆
Acetosella L. — *auriculé.* F. ♄
spinosus L. — *épineux.* orient. ☉

3. *Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.* — 3. Fleurs hermaphrodites, valves glandu-leuses.

maritimus L. — *maritime.* F. ☉
crispatulus *Mich. Fl.* }
persicarioides *Encycl.* } — *crispé.* Am. S. ☉
ægyptiacus L. — *d'Egypte.* ☉
dentatus L. *Mant.* — *denté.* Égypte. ☉
pulcher L. — *violon.* F. ♂
Nemolapathum *L. f.* — *des bois.* F. ♄
sanguineus L. — *sanguin.* Am. S. ♄
purpureus *Encycl.* — *purpurin.* ♄
obtusifolius L. — *à feuilles obtuses.* F. ♄
crispus L. — *crépu.* F. ♆
Hydrolapathum *Willd. sp.* }
aquaticus *Smith. Fl.* } — *des marais.* F. ♆
Patientia L. — *patience.* F. ♆ (méd.)
undulatus. — *ondé.* sibérie. ♆

RHEUM — *RHUBARBE*
Rhaponticum L. — *Rhapontic.* Asie. ♆ (méd.)
compactum L. — *compacte.* chine. ♆ (méd.)
undulatum L. — *ondée.* chine. ♆ (méd.)
Ribes L. — *Ribes.* Asie min. ♄ (écon. méd.)
hybridum *H. K.* — *hybride.* asie boréale. ♆
palmatum L. — *palmée.* chine. ♄ (méd.)

TRIPLARIS — *TRIPLARIS*
americana *Vahl. symb.* — *d'Amérique.* S. ch. ♄

CALLIGONUM — *CALLIGONUM*
comosum *Desf. Atl.* — *hérissé.* Afr. sept. or. ♄

Pallasia caspica *L. f.* pallasia pterococcus *Pall. ross.* calligonum pallasia *Willd. sp.*	*Pallasia* *de la mer Caspienne.* or. ♆
Eryogonum tomentosum *Mich. fl.*	*Eryogonum* *cotonneux.* caroline. or. ♆

ORDO VI.

ATRIPLICEÆ.

I. Fructus baccatus.

Phytolacca octandra *L.* decandra *L.* dodecandra *l'Her. stirp.* icosandra *L.* dioica *L.*	*Phytolacca* *à 8 étamines.* mexiq. s. ch. ♄ *à 10 étamines.* am. s. ♄ *à 12 étamines.* Abyss. s. ch. ♄ *à 20 étamines.* inde. s. ch. ♄ *dioïque.* am. m. s. ch. ♄
Rivina humilis *L.* lævis *L. mant.* purpurascens *Willd. enum.* brasiliensis *Willd. sp.?* tetrandra.	*Rivina* *velu.* Antilles. s. ch. ♄ *lisse.* Antilles. s. ch. ♄ *pourpre.* s. ch. ♄ *du Brésil.* s. ch. ♄ *à 4 étamines.* s. ch. ♄
Bosea yerva-mora *L.*	*Bosea* *yerva-mora.* canaries. or. ♄

II. Fructus capsularis.

Petiveria alliacea *L.*	*Pétivéria* *alliacé.* Antilles. s. ch. ♄
Polycnemum arvense *L.*	*Polycnemum* *des champs.* f. ☉
Camphorosma monspeliaca *L.*	*Camphrée* *de Montpellier.* or. ♄
Pteranthus echinatus *Desf. Atl.* camphorosma pteranthus *L. mant.* louichea cervina *l'Her. stirp.*	*Ptéranthus* *hérissé.* barbarie. ☉
Galenia africana *L.*	*Galénia* *d'Afrique.* cap. or. ♄

ORDRE VI.

ARROCHES.

I. Une baie.

Phytolacca *à 8 étamines.* mexiq. s. ch. ♄ *à 10 étamines.* am. s. ♄ *à 12 étamines.* Abyss. s. ch. ♄ *à 20 étamines.* inde. s. ch. ♄ *dioïque.* am. m. s. ch. ♄	
Rivina *velu.* Antilles. s. ch. ♄ *lisse.* Antilles. s. ch. ♄ *pourpre.* s. ch. ♄ *du Brésil.* s. ch. ♄ *à 4 étamines.* s. ch. ♄	
Bosea *yerva-mora.* canaries. or. ♄	

II. Une capsule.

Pétivéria *alliacé.* Antilles. s. ch. ♄	
Polycnemum *des champs.* f. ☉	
Camphrée *de Montpellier.* or. ♄	
Ptéranthus *hérissé.* barbarie. ☉	
Galénia *d'Afrique.* cap. or. ♄	

III. Semen tectum calice, stamina 5.

III. Graines recouvertes par le calice, 5 étamines.

BASELLA

rubra L.
alba L.
vesicaria *Encycl.*

BASELLE

rouge. inde. ♂ (écon.)
blanche. chine. ♂ (écon.)
vésiculeuse. pérou. s. ch. ♄

SALSOLA.

1. *Fruticosæ.*

brevifolia *Desf. Atl.*
fruticosa L.
chenopodium fruticosum *Willd. Enum.*
prostrata L.
sericea *Willd. Enum.*
chenolea diffusa *Willd. sp.*
oppositifolia *Desf. Atl.*

SOUDE.

1. Tiges ligneuses.

à f. courtes. barbarie. or. ♄
arbrisseau. F. ♄
couchée. sibérie. ♄
satinée. cap. or. ♄
à feuill. opposées. barb. or. ♄

2. *Herbaceæ.*

baccata.
sueda baccata *Delile. Fl.*
hortensis.
sueda hortensis *Delile. Fl.*
hirsuta L.
muricata L. *Mant.*
laniflora *Pallas. Itin.*
arenaria *Wald.* et *Kitt. Hung.*
altissima L.
chenopodium altissimum *Willd. Enum.*
soda L.
radiata *Desf. Ann.*
platiphylla *Mich. Fl.*
kochia dentata *Willd. Hort.*
salsa L. *Mant.*
kali L.
tragus L.

2. Tiges herbacées.

baccifère. or. ♆
des jardins. ☉
velue. F. m. ☉
hérissée. égypte. or. ♈
laineuse. sibérie. ♈
des sables. F. ☉
élevée. italie. ☉
commune. F. ☉
rayonnée. Am. s. ☉
salée. sibérie. ☉ (arts.)
kali. F. ☉ (arts.)
épineuse. F. ☉ (arts.)

SPINACIA

oleracea L.
— lævis.

ÉPINARD

cultivé. ☉ (alim. méd.)
— *lisse.*

BETA

vulgaris L.
— rubra.
cycla L.
trigyna *Wald.* et *Kitt. Hung.*
maritima L.

BETTE

commune. Eur. Aust. ♂ (alim.)
— *rouge.*
racine de disette. portugal. ♂
à 3 styles. hongrie. ♆
maritime. F. ☉

CHENOPODIUM. — *ANSERINE.*

1. *Foliis angulatis.* — 1. Feuilles anguleuses.

bonus-henricus *L.*	*Bon-Henri.* F. ♃ (méd.)
urbicum *L.*	*triangulaire.* F. ⊙
atriplicis *H. K.*	*à feuilles d'Arroche.* chine. ⊙
Quinoa *willd. sp.?*	*Quinoa.* pérou. ⊙ (alim.)
rhombifolium *willd. enum.*	*rhomboïdale.* Am. s. ⊙
crassifolium.	*à feuilles épaisses.* ⊙
opulifolium *Nocca.*	*à feuilles d'obier.* ⊙
murale *L.*	*des murailles.* F. ⊙
hybridum *L.*	*hybride.* F. ⊙
ficifolium *smith. fl.?*	*à feuilles de figuier.* F. ⊙
album *L.*	*blanche.* F. ⊙
rubrum *L.*	*rouge.* F. ⊙
ambrosioides *L.*	*odorante.* mexique. ⊙
anthelminticum *L.*	*anthelmintique.* Am. s. or. ♄
botrys *L.*	*Botrys.* F. ⊙ (méd.)
multifidum *L.*	*laciniée.* Buénos-Ayres. or. ♄
fœtidum *willd. enum.*	*puante.* ⊙
glaucum *L.*	*glauque.* F. ⊙

2. *Foliis integris.* — 2. Feuilles entières.

vulvaria *L.*	*fétide.* F. ⊙
lanceolatum *willd. enum.*	*lancéolée.* Am. s. ⊙
caudatum *jacq. ic.*	*à longues grappes.* Guinée. ⊙
polyspermum *L.*	*polysperme.* F. ⊙
scoparia *L.*	*Belvédère.* chine. ⊙
villosum *Encycl.*	*velue.* sibérie. ⊙
aristatum *L.*	*barbue.* sibérie. ⊙
maritimum *L.*	*maritime.* F. ⊙

ATRIPLEX — *ARROCHE*

halimus *L.*	*Halime.* F. ♄
portulacoides *L.*	*à feuilles de pourpier.* F. ♄
albicans *willd. sp.*	*blanchâtre.* cap. or. ♄
rosea *L.*	*rose.* F. ⊙
sibirica *L.*	*de Sibérie.* ⊙
microsperma *willd. sp.*	*à petit fruit.* Hongrie. ⊙
lacera.	*lacérée.* ⊙
hortensis *L.*	*des jardins.* Asie. ⊙ (écon.)
— rubra.	— *rouge.*
— ruberrima.	— *très-rouge.*
nitens *willd. sp.*	*luisante.* Hongrie. ⊙
laciniata *L.*	*laciniée.* F. ⊙
multifida.	*découpée.* ⊙
hastata *L.*	*hastée.* F. ⊙
patula *L.*	*touffue.* F. ⊙
angustifolia *willd. sp.*	*à feuilles étroites.* F. ⊙
littoralis *L.*	*des rivages.* F. ⊙

III. Semen tectum calice, stamina pauciora quàm 5.

AXYRIS
amaranthoides L.

BLITUM
capitatum L.
virgatum L.
chenopodioides L. *Mant.*

SALICORNIA
herbacea L.
fruticosa L.

CORISPERMUM
spicatum.
hyssopofolium L.

III. Graines recouvertes par le calice, moins de 5 étamines.

AXYRIS
fausse Amarante. sibérie. ⊙

BLETTE
à fleurs en tête. F. ⊙
effilée. F. ⊙
fausse Anserine. tartarie. ⊙

SALICORNE
herbacée. F. ⊙
arbrisseau. F. m. or. ♄

CORISPERME
à épis. sibérie. ⊙
à feuilles d'hysope. tart. ⊙

CLASSIS VII.

DYCOTYLEDONES APETALÆ.

(stamina hypogyna.)

ORDO I.

AMARANTHI.

AMARANTHUS.

1. *Flores triandri.*

albus L.
græcisans L.
angustifolius *Encycl.*
prostratus *Willd. sp.*
tricolor L.
lividus L.
melancholicus L.
blitum L.
sylvestris.
polygonoides L.

2. *Pentandri.*

chlorostachys *Willd. sp.*
flavus *Willd. sp.*

CLASSE VII.

DYCOTYLÉDONS APÉTALES.

(étamines attachées sous le pistil.)

ORDRE I.

AMARANTES.

AMARANTE

1. 3 étamines.

blanche. Am. s. ⊙
à feuilles étroites. Am. s. ⊙
couchée. Italie. ⊙
tricolore. Inde. ⊙ (orn.)
livide. Am. s. ⊙
mélancholique. Inde. ⊙
Blette. F. ⊙
sauvage. F. ⊙
membraneuse. Antilles. ⊙

2. 5 étamines.

pâle. ⊙
jaune. ⊙

lætus *willd. sp.*	*d'un vert gai.* ⊙
paniculatus *L.*	*paniculée.* ⊙
hybridus *L.* / retroflexus *encycl.*	*hybride.* F. ⊙.
caudatus *L.*	*à longs épis.* PÉROU. ⊙ (orn.)
sanguineus *L.*	*couleur de sang.* ANTILLES. ⊙
spinosus *L.*	*épineuse.* INDE. ⊙
CELOSIA	CELOSIA
argentea *L.*	*argenté.* INDE. ⊙
margaritacea *L.*	*perlé.* INDE. ⊙
trigyna *L. mant.*	*à 3 styles.* SÉNÉGAL. ⊙
cristata *L.*	*à crêtes.* ASIE. ⊙ (orn.)
coccinea *L.*	*écarlate.* INDE. ⊙ (orn.)
castrensis *L.*	*aigretté.* INDE. ⊙
paniculata *L.*	*paniculé.* ANTILLES. ⊙
IRESINE	IRÉSINE
celosioides *L.*	*faux célosia.* ANTILLES. S, CH. ♄
herbacea.	*herbacée.* S. CH. ♆
ACHYRANTHES	CADÉLARI
argentea *encycl.*	*argenté.* SICILE ⊙
fruticosa *encycl.*	*arbrisseau.* INDE. S. CH. ♄
crispa *encycl. suppl.*	*crépu.* S. CH. ♄
virgata *encycl. suppl.*	*à longs épis.* S. CH. ♄
lappacea *L.* / atropurpurea *encycl.* / porrigens *jacq. h. sch.*	*hérissé.* INDE- S. CH. ♄
	étalé. PÉROU. S. CH. ♄
GOMPHRENA	GOMPHRÉNA
globosa *L.*	*globuleux.* INDE. ⊙ (orn.)
interrupta *L.*	*interrompu.* ANTILLES. S. CH. ♆
decumbens *jacq. h. sch.*	*couché.* MEXIQUE. ⊙
brasiliana *L.*	*du Brésil.* S. CH. ♄
ILLECEBRUM	ILLECEBRUM
lanatum. *s. veget.*	*laineux.* INDE. S. CH. ♆
javanicum *s. veget.* / achyranthes alopecuroides *encycl.*	*de Java.* S. CH. ♄
PARONYCHIA	PARONIC
verticillata. / illecebrum verticillatum *L.*	*verticillé.* F. ⊙
echinata *desf. atl.*	*hérissé.* BARBARIE. OR. ♆
vulgaris. / illecebrum paronychia *L.*	*commun.* F. M. OR. ♄
capitata. / illecebrum capitatum *L.*	*à fleurs en tête.* F. ♄

ficoidea L.
illecebrum ficoideum L.

ficoïde. Antilles. s. ch. ♆

tenella.

délicat. s. ch. ♄

sessilis.
illecebrum sessile L.

sessile. inde. s ch. ♄

achyrantha.
illecebrum achyrantha L.

achyrantha. orient. ☉

frutescens.
illecebrum frutescens *l'her. stirp.*

arbrisseau. pérou. s. ch. ♄

HERNIARIA

HERNIOLE

suffruticosa.
illecebrum suffruticosum L.

sous-arbrisseau. esp. or. ♄

fruticosa L.

ligneuse. f. m. or. ♄

glabra L.

glabre. f. ☉

hirsuta L.

velue. f. ☉

incana *Encycl.*

blanche. Alpes. ♆

ORDO II.

PLANTAGINEÆ.

ORDRE II.

PLANTAGINÉES.

PLANTAGO.

PLANTAIN.

1. *Caule folioso.*

1. Tige feuillue.

psyllium.
arenaria *Willd. enum.*

psyllium. f. ☉

cynops L.

cynops. f. ♆

squarrosa *Willd. sp.*

rude. Égypte. ☉

stricta *Schousb. maroc.*

serré. maroc. ☉

2. *Caule aphyllo.*

2. Tige sans feuilles.

maxima *Jacq. ic.*
cucullata *Lamk. ill.*

capuchon. sibérie. ♄

asiatica *Lamk. ill.*

d'Asie. ♄

cordata *Lamk. ill.*

en cœur. am. s. ♄

major L.

commun. f. ♆

media L.

moyen. f. ♆

crassa *Willd. sp.*
crispa *Jacq. collect.*

charnu. ♆

saxatilis *Marsch. cauc.*

des rochers. caucase. ♆

sibirica.

de Sibérie. ♄

lanceolata L.

lancéolé. f. ♆

lagopus L.

lagopus. f. ☉

amplexicaulis *Cav. ic.*

amplexicaule. esp. or. ♆

serraria L.

en scie. barbarie. or. ♄

vaginata *Vent. H. cels.*

à gaîne. canaries. or. ♄

virginica L.

de Virginie. am. s. ☉

albicans L.
interrupta *Encycl.*
alpina L.
sphærocephala *Encycl.*
alpina *Jacq. hort.*
microcephala *Encycl.*
villosa *Roth. cat.*
holostea *Lamk. ill.*
Bellardi *Vahl. symb.*
graminea *Lamk. ill.*
hirsuta *Thunb. prodr.*
tenuiflora *Wald.* et *Kitt. Hung.*
maritima L.
subulata L.
coronopus L.

LITTORELLA
lacustris L.

blanchâtre. F. m. ♄
interrompu. Am. s. ♆
des Alpes. F. ♃
à tête ronde. Alpes. ♆
à petite tête. orient. ☉
holostea. Alpes. ♄
à feuilles de Gramen. ♄
pubescent. cap. ☉
à petites fleurs. Hongrie. ☉
maritime. F. ♆
en aléne. F. m. or. ♆
corne-de-cerf. F. ☉

LITTORELLE
des marais. F. ♆

ORDO III.

NYCTAGINEÆ.

MIRABILIS
Jalapa L.
— lutea.
dichotoma L.
longiflora L.

CALYXHYMENIA
viscosa *Fl. per.*
Mirabilis viscosa *Cav. ic.*
glabrifolia *Ortega. Dec.*
aggregata *Ortega. Dec.*
Mirabilis aggregata *Cav. ic.*

BOERHAAVIA
erecta L.
diffusa L.
hirsuta L. *Mant.*
scandens L.
tuberosa *Lamk. ill.*
arborea *Vahl. sp.*

PISONIA
aculeata L.
fragrans.
nitida.
latifolia (*an* generis?)

ORDRE III.

NYCTAGINÉES.

MIRABILIS
Belle-de-nuit. Mexiq. ☉ (orn.)
— jaune.
dichotome. Mexique. ☉
à longues fleurs. Mexiq. or. ♄ (orn.)

CALYXHYMÉNIA
visqueux. Pérou. s. ch. ♄
à f. glabres. N. Esp. s. ch. ♆
aggloméré. N. Esp. s. ch. ♄

BOERHAAVIA
à tige droite. Antilles. s. ch. ♆
étalé. Antilles. s. ch. ♄
velu. Antilles. s. ch. ♄
grimpant. Am. m. s. ch. ♄
tubéreux. Pérou. s. ch. ♄
arbre. N. Esp. s. ch. ♄

PISONIA
épineux. Antilles. s. ch. ♄
odorant. Antilles. s. ch. ♄
luisant. Antilles. s. ch. ♄
à larges feuilles. Ant. s. ch. ♄

ORDO IV.

PLUMBAGINEÆ.

PLUMBAGO
europæa L.
scandens L.
rosea L.

STATICE.

1. *Caule ramoso.*

monopetala L.
— angustifolia.
suffruticosa L.
limonium L.
latifolia *smith. s. linn.*
spathulata *willd. hort.*
beliidifolia *encycl.*
mucronata L. *f.*
graminifolia *willd. sp.*
tatarica L.
oleæfolia *scop. insubr.*
tripteris *delile. fl.*
sinuata L.
spicata *willd. sp.*

2. *Caule simplici, nudo, floribus capitatis.*

armeria L.
maritima *willd. enum.*
fasciculata *vent. h. cels.*
pubescens.

ORDRE IV.

DENTELAIRES.

DENTELAIRE
d'Europe. F. ♆ (méd.)
grimpante. ANTILLES. s. ch. ♄
rose. INDE. s. ch. ♄

STATICÉ.

1. Tige rameuse.

monopétale. F. m. or. ♄
— *à feuilles étroites.*
sous-arbrisseau. SIBÉRIE. ♄
limonium. F. ♃
à larges feuilles. SIBÉRIE. ♃
en spatule F. or. ♃
à f. de paquerette. F. m. or. ♃
crépue. MAROC. or. ♃
à feuilles de gramen. SIBÉR. ♆
de Tartarie. ♆ (orn.)
à f. d'olivier. ITALIE. or. ♃
à trois ailes. ÉGYPTE. or. ♆
sinuée. ORIENT. or. ♆
à épis. PERSE. or. ♆

2. Tige simple, nue, fleurs en tête.

gazon-d'olympe. F. ♆
maritime. F. ♃ (orn.).
fasciculée. SARDAIGNE. or. ♄
pubescente. or. ♄

CLASSIS VIII.

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(corolla hypogyna.)

ORDO I.

LYSIMACHIÆ.

CENTUNCULUS
minimus L.

CLASSE VIII.

DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(corolle attachée sous le pistil.)

ORDRE I.

LYSIMACHIES.

CENTENILLE
naine. F. ☉

ANAGALLIS	*MOURON*
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
— cœrulea.	— *bleu.*
monelli L.	*de Monelli.* ESP. ☉
latifolia L.	*à larges feuilles.* ESP. ☉
collina *schousb. maroc.* / fruticosa *vent. ch. de pl.*	*arbrisseau.* BARBARIE. OR. ♄
tenella *s. veg.* / LYSIMACHIA tenella L.	*rampant.* F. ♆
LYSIMACHIA	*LYSIMACHIE*
vulgaris L.	*commune.* F. ♆ (méd.)
ephemerum L.	*éphémère.* ESP. ♆
orientalis *encycl.* / atropurpurea *murray. goett.*	*d'Orient.* OR. ♄
thyrsiflora L.	*en thyrse.* F. ♆
verticillata *marsch. cauc.*	*verticillée.* CAUCASE. ♆
punctata L.	*ponctuée.* F. ♆
ciliata L.	*ciliée.* AM. S. ♆
nemorum L.	*des bois.* F. ♃
nummularia L.	*nummulaire.* F. ♃
linum-stellatum L.	*lin-étoilé.* F. ☉
HOTTONIA	*HOTTONIA*
palustris L.	*des marais.* F. ♆
CORIS	*CORIS*
monspeliensis L.	*de Montpellier.* F. M. OR. ♃
LIMOSELLA	*LIMOSELLE*
aquatica L.	*aquatique.* F. ☉
TRIENTALIS	*TRIENTALIS*
europæa L.	*d'Europe.* F. ALPES. ♆
ARETIA	*ARETIA*
vitaliana *s. veg.*	*des Alpes.* F. ♆
ANDROSACE	*ANDROSACÉ*
maxima L.	*à grand calice.* F. ☉
septentrionalis L.	*du Nord.* RUSSIE. ☉
elongata *s. veg.*	*à longs pédoncules.* F. ☉
lactea L.	*blanc.* ALPES. ♆
carnea L.	*couleur de chair.* ALPES. ♆
villosa L.	*velu.* ALPES. ♆
PRIMULA	*PRIMEVÈRE*
veris L.	*commune.* F. ♆ (orn.)
elatior *willd. sp.*	*élevée.* F. ♆
— acaulis.	— *sans tige.*
perreiniana *flugge. ann.*	*de Perrein* ♃ (orn.)
auricula L.	*oreille-d'ours.* ALP. ♃ (orn.)

marginata *willd. sp.*
farinosa *L.*
viscosa *All. ped.*
integrifolia *L.*
villosa *Jacq. Aust. suppl.*
auriculata *Encycl.*
cortusoides *willd. sp.*

CORTUSA
matthioli *L.*

SOLDANELLA
alpina *L.*

DODECATHEON
meadia *L.*

CYCLAMEN
europæum *L.*
hederæfolium *H. K.*

Genera Lysimachiis affinia.

GLOBULARIA
alypum *L.*
longifolia *H. K.* } salicina *Encycl.* }
vulgaris *L.*
nudicaulis *L.*
cordifolia *L.*

SAMOLUS
valerandi *L.*

UTRICULARIA
vulgaris *L.*
minor *smith. Fl.*

PINGUICULA
vulgaris *L.*

MENYANTHES
trifoliata *L.*

ORDO II.

PEDICULARES.

I. Stamina 2 aut plura non didynama.

POLYGALA.

1. *Cristatæ.*

vulgaris *L.*

bordée. suisse. ♆
farineuse. Alpes. ♄
visqueuse. Alpes. ♄
à feuilles entières. Alpes. ♆
velue. Alpes. ♆
auriculée. orient. or. ♄
à feuilles de cortusa. sibér. ♄

CORTUSA
de Matthiole. Alpes. ♆

SOLDANELLE
des Alpes. ♄

DODÉCATHÉON
méadia. Am. s. ♄ (orn.)

CYCLAMEN
d'Europe. F. m. ♆ (orn.)
à f. de lierre. Italie. ♄ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Lysimachies.

GLOBULAIRE
alypum. F. m. or. ♄
à long. feuilles. Madère. or. ♄.
commune. F. ♆
à tige nue. Alpes. ♆
à feuilles en cœur. Alpes. ♄

SAMOLUS
mouron-d'eau. F. ☉

UTRICULAIRE
commune. F. ♆
grêle. F. ♄

GRASSETTE
commune. F. ♆

MÉNYANTHE
trèfle-d'eau. F. ♆ (méd.)

ORDRE II.

PÉDICULAIRES.

I. 2 ou plusieurs étamines non didynames.

POLYGALA.

1. Fleurs barbues.

commun. F. ♆

amara L. — *amer.* F. ♄
monspeliaca L. — *de Montpellier.* ☉
austriaca *crantz. Austr.* — *d'Autriche.* F. ☉
myrtifolia L. — *à feuilles de myrte.* cap. or. ♄
oppositifolia L. *mant.* — *à feuilles opposées.* cap. or. ♄
cordifolia *willd. sp.* — *à feuilles en cœur.* cap. or. ♄

2. *Imberbes.* — 2. Fleurs sans barbes.

chamæbuxus L. — *à feuilles de buis.* F. ♄
heisteria L. — *d'heister.* cap. or. ♄

ERONICA. — *VÉRONIQUE.*

1. *Spicatæ.* — 1. Fleurs en épi.

gentianoides *vahl. sp.* — *à f. de gentiane.* orient. ♆
virginiana L. — *de Virginie.* ♄
spuria L. — *à feuilles ternées.* sibérie. ♄
maritima L. — *maritime.* EUR. ♃
longifolia L. — *à longues feuilles.* suisse. ♆
elatior. — *élevée.* ♃
incana L. — *blanche.* RUSSIE. ♄
spicata L. — *à épis.* F. ♃
hybrida L. — *hybride.* SUÈDE. ♄
pinnata *willd. sp.* — *pennée.* SIBÉRIE. ♄
incisa *willd. sp.* — *incisée.* SIBÉRIE. ♄

2. *Corymboso-racemosæ.* — 2. Grappes de fleurs en corymbe.

officinalis L. — *officinale.* F. ♃ (méd.)
bellidioides L. — *à f. de paquerette.* ALPES. ♆
fruticulosa L. — *fruticuleuse.* ALPES. ♄
alpina L. — *des Alpes.* F. ♃
decussata *willd. sp.* — *croisette.* MAGELLAN. ♄
serpyllifolia L. — *à feuilles de serpolet.* F. ♃
beccabunga L. — *beccabunga.* F. ♄ (méd.)
anagallis L. — *anagallis.* F. ☉ (méd.)
scutellata L. — *à feuilles linéaires.* F. ♄
teucrium L. — *à feuill. de germandrée.* F. ♄
prostrata L. — *couchée.* F. ♄
chamædrys L. — *chamædrys.* F. ♄
latifolia L. — *à larges feuilles.* F. ♃
melissæfolia *Encycl.* — *à feuilles de mélisse.* ♃
urticæfolia *Jacq. Austr.* — *à feuilles d'ortie.* F. ♄
montana L. *f.* — *des montagnes.* F. ♃
multifida L. — *découpée.* SIBÉRIE. ♄
austriaca L. — *d'Autriche.* ♆
nitida. — *luisante.* ♃
orientalis *vahl. sp.* — *d'Orient.* ♆

3. *Pedunculis unifloris.*

persica. — *de Perse.* ⊙
agrestis L. — *agreste.* F. ⊙
arvensis L. — *des champs.* F. ⊙
hederæfolia L. — *à feuilles de Lierre.* F. ⊙
triphyllos L. — *à trois feuilles.* F. ⊙
verna L. — *printanière.* F. ⊙
romana L. } peregrina *vahl. sp.* } — *romaine.* F. ⊙
præcox *vahl. sp.* — *précoce.* F. ⊙
acinifolia *vahl. sp.* — *à feuilles d'Acinos.* F. ⊙
digitata *vahl. sp.* } chamæpithyoides *lamk. ill.* } — *digitée.* F. m. ⊙

SIBTHORPIA
europæa L. — *d'Europe.* F. ♄
africana L. — *d'Afrique.* cap. or. ♆

DISANDRA
prostrata L. *f.* — *couchée:* madère. or. ♆

II. Stamina 4 didynama.

II. 4. étamines didynames.

ERINUS
alpinus L. — *des Alpes.* ♆

MANULEA
oppositifolia *vent. malm.* — *à feuilles opposées.* cap. or. ♄
alternifolia. — *à feuill. altern.* N. holl. or. ♆

EUPHRASIA
officinalis L. — *officinale.* F. ⊙ (méd.)
odontites L. — *odontitès.* F. ⊙

PEDICULARIS
palustris L. — *des marais.* F. ♄
sylvatica L. — *des bois.* F. ♆

RHINANTHUS
crista-galli L. — *crête-de-coq.* F. ⊙
hirsuta. — *velu.* F. ⊙

MELAMPYRUM
arvense L. — *des champs.* F. ⊙
cristatum L. — *à crête.* F. ⊙
pratense L. — *des prés.* F. ⊙
sylvaticum L. — *des bois.* F. ⊙

OROBANCHE
major *smith. fl.* — *élevée.* F. ♆
caryophyllacea *smith. soc. lin.* — *odorante.* F. ♆
minor *smith. fl.* — *petite.* F. ♆
ramosa L. — *rameuse.* F. ♆

Lathræa
clandestina ♄.

Clandestine
commune. f. ♄

ORDO III.

ACANTHEÆ.

I. Stamina 4 didynama.

Barleria
prionitis ♄.
gentianoides.
Eranthemum flavum *willd. enum. suppl.*

Achanthus
mollis ♄.
spinosus ♄.
spinosissimus *pers. syn.*

Ruellia
blechum ♄.
strepens ♄.
varians *vent. h. cels.*
Eranthemum pulchellum *Andr. Rep.*
ovata *cav. ic.*
lactea *cav. ic.*
patula *Jacq. ic.*
tuberosa ♄.

II. Stamina 2.

Justicia.

1. *Fruticosæ.*

Adhatoda ♄.
hyssopifolia ♄.
orchioides ♄. *f.*
spinosa *Jacq. Amer.*
paniculata *Vahl. sp.*
nasuta ♄.
bracteolata *Jacq. ic.*
coccinea *Smith. Pict.*
pulcherrima *Jacq. ic.*
formosa *Willd. Enum.*
lucida *H. K.*
cristata *Jacq. H. sch.*
infundibuliformis ♄.
Ecbolium ♄.

ORDRE III.

ACANTHÉES.

1. 4 étamines didynames.

Barleria
prionitis. Inde. s. ch. ♄
à fleurs de gentiane. s. ch. ♄

Acanthe
branche-ursine. Ital. ♄ (méd.)
épineuse. Italie. ♄
hérissée. ♆

Ruellia
blechum. Antilles. s. ch. ♄
élastique. Virginie. or. ♄
bleu. Inde. s. ch. ♄
ovale. Mexique. s. ch. ♄
blanc. Mexique. s. ch. ♆
étalé. Inde. s. ch. ♄
tubéreux. Antilles. s. ch. ♄

II. 2 étamines.

Carmantine.

1. Tiges ligneuses.

Adhatoda. ceylan. or. ♄ (orn.)
à f. d'hysope. canar. or. ♄
à fleurs d'orchis. cap. or. ♄
épineuse. Antilles. s. ch. ♄
paniculée. Inde. s. ch. ♄
tubulée. Inde. s. ch. ♄
bractéolée. caracas. s. ch. ♄
écarlate. Caïenne. s. ch. ♄
mouchetée. Am. m. s. ch. ♄
élégante. s. ch. ♄
luisante. s. ch. ♄
à crêtes. s. ch. ♄
infundibuliform. Inde. s. ch. ♄
Ecbolium. Inde. s. ch. ♄

Gendarussa *L. f.*	*Gendarussa.* Inde. s. ch. ♄
quadrifida *Vahl. sp.*	*quadrifide.* N. Esp. s. ch. ♄
coccinea *Cav. ic.*	
resupitana *Vahl. sp.*	*à fl. renversées.* N. Esp. s. ch. ♄
sexangularis *Cav. ic.*	
Dicliptera resupinata *Juss. Ann.*	
bicaliculata *Vahl. sp.*	*caliculée.* Inde. s. ch. ♄
ligulata *Cav. ic.*	
Dianthera malabarica *L. f.*	

2. *Herbaceæ.*

2. Tiges herbacées.

furcata *Jacq. H. sch.*	*fourchue.* Pérou. ♆
peruviana *Cav. ic.*	
ciliaris *L. f.*	*ciliée.* ceylan. ⊙
lithospermifolia *Jacq. H. sch.*	*à feuilles de Gremil.* Pérou. ⊙
ladanoides *Lamk. Ill.*	

ORDO IV.

JASMINEÆ.

I. Fructus capsularis.

ORDRE IV.

JASMINÉES.

I. Une capsule.

Syringa	*Lilas*
vulgaris *L.*	*commun.* Asie. ♄ (orn.)
persica *L.*	*de Perse.* ♄ (orn.)
— laciniata.	— *lacinié.*
Fraxinus	*Frêne*
excelsior.	*élevé.* F. ♄
— argentea.	— *argenté.*
— verrucosa.	— *graveleux.*
— jaspidea.	— *jaspé.*
— horizontalis.	— *horizontal.*
— pendula.	— *pleureur.*
rotundifolia *Encycl.*	*à feuilles rondes.* Italie. ♄
lentiscifolia.	*à f. de Lentisque.* orient. ♄
parvifolia *Encycl.*	
monophylla *Vahl. sp.*	*à une feuille.* Am. s. ♄
ornus *L.*	*à fleurs.* Italie. ♄
pubescens *Encycl.*	*pubescent.* Am. s. ♄
americana *L.*	*d'Amérique.* ♄
juglandifolia *Encycl.*	*à feuilles de Noyer.* Am. s. ♄
sambucifolia *Encycl.*	*à feuilles de sureau.* Am. s. ♄
quadrangulata *Mich. Fl.*	*quadrangulaire.* Am. s. ♄
platicarpa *Mich. Fl.*	*à fruit large.* Am. s. ♄
nana *Duham. Arb. Ed. n.*	*nain.* Am. s. ♄
atrovirens *Duham. Arb. Ed. n.*	*vert-sombre.* Am. s. ♄

FONTANESIA	*FONTANESIA*
phillyreoides *Bill. decad.*	*à feuilles de Filaria.* Asie. ♄ (orn.)
II. Fructus baccatus.	II. Une baie.
CHIONANTHUS	*CHIONANTE*
virginica *L.*	*de Virginie.* ♄ (orn.)
OLEA	*OLIVIER*
europæa *L.*	*cultivé.* F. m. ♄ (écon.)
— buxifolia.	*— à feuilles de buis.*
undulata *Jacq. H. sch.*	*ondulé.* cap. or. ♄
divaricata.	*étalé.* or. ♄
capensis *L.*	*du Cap.* or. ♄
americana *L. Mant.*	*d'Amérique.* or. ♄
excelsa *Vahl. symb.*	*élevé.* canaries. or. ♄
fragrans *Thunb. Jap.*	*odorant.* Japon. or. ♄ (écon.)
emarginata *Lamk. Ill.*	*échancré.* Madagascar. s. ch. ♄
NOTELÆA	*NOTÉLÉA*
longifolia *Vent. ch. de pl.*	*à long. feuilles.* N. Holl. or. ♄
rigida.	*à feuill. roides.* N. Holl. or. ♄
PHILLYREA	*FILARIA*
angustifolia *L.*	*à feuilles étroites.* F. m. ♄
media *L.*	*moyen.* F. m. ♄ (orn.)
latifolia *L.*	*à larges feuilles.* F. m. ♄ (orn.)
— lævis.	*— lisse.*
MOGORIUM	*MOGORI*
sambac.	*Jasmin d'Arabie.* s. ch. ♄ (orn.)
nyctanthes sambac *L.*	
Jasminum sambac *Vahl. sp.*	
JASMINUM	*JASMIN*
glaucum *L. f.*	*glauque.* cap. or. ♄
simplicifolium *Vahl. sp.*	*à feuilles simples.* île des Amis. s. ch. ♄
multiflorum *Andr. Rep.*	*à fleurs nombreuses.* s. ch. ♄
hirsutum *H. K.*	
fruticans *L.*	*cytise.* F. m. ♄ (orn.)
humile *L.*	*d'Italie.* or. ♄ (orn.)
odoratissimum *L.*	*jonquille.* Madère. or. ♄ (orn.)
azoricum *L.*	*des Açores.* or. ♄ (orn.)
volubile *Jacq. H. sch.*	*sarmenteux.* Inde. s. ch. ♄ (orn.)
mauritianum.	*de l'île de France.* s. ch. ♄
officinale *L.*	*officinal.* Inde. ♄ (orn.)
grandiflorum *L.*	*à grandes fleurs.* Inde. or. ♄

LIGUSTRUM
vulgare *L.*
japonicum *Thunb. Jap.*
lucidum *H. K.*

ORDO V.

VITICEÆ.

I. Flores oppositè corymbosi.

CLERODENDRUM
viscosum *Vent. Malm.*
infortunatum *L.* ?
phlomitis *Vahl. symb.*

siphonanthus *H. K.*
siphonanthus indica *L.*
ovieda mitis *L.*

VOLKAMERIA
tomentosa *Vent. Malm.*
aculeata *L.*
inermis *L.*
angustifoliâ *Encycl.*

ligustrina *Jacq. coll.*
japonica *Jacq. H. sch.*
clerodendrum fragrans *Willd. Enum.*

ÆGIPHILA
martinicensis *L. Mant.*
macrophylla (*an* generis?).

VITEX
agnus-castus *L.*
— albidus.
incisa *Encycl.*
— alba.

CALLICARPA
americana *L.*
cana *Vahl. symb.*
tomentosa *Willd. Enum.*

CORNUTIA
pyramidata *L.*
Hosta cœrulea *Jacq. H. sch.*

TROÉNE
commun. F. ♄ (orn.)
du Japon. or. ♄
luisant. chine or. ♄

ORDRE V.

GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbe et opposées.

CLÉRODENDRUM
visqueux. inde. s. ch. ♄
à feuilles de phlomis. inde. s. ch. ♄
à longues fl. inde. s. ch. ♄

VOLKAMÉRIA
cotonneux. s. ch. ♄
épineux. antilles. s. ch. ♄
sans épines. inde. s. ch. ♄
à feuilles étroit. île de France. s. ch. ♄
à f. de Troéne. île de Fr. s. ch. ♄
du Japon. s. ch. ♄ (orn.)

ÉGIPHILA
de la Martinique. s. ch. ♄
à grand. f. Antilles. s. ch. ♄

VITEX
agnus-castus, F. m. ♄ (méd.)
— *blanc.*
incisé. chine. ♄ (orn.)
— *blanc.*

CALLICARPA
d'Amérique. Am. s. or. ♄
blanc. inde. s. ch. ♄
cotonneux. s. ch. ♄

CORNUTIA
pyramidal. Antilles. s. ch. ♄

II. *Flores racemosi in racemis alterni.*

II. Fleurs alternes en grappes

CITHAREXYLUM
villosum *willd. sp.*
tomentosum *encycl. suppl.*
quadrangulare *s. veg.*
coriaceum.
pentandrum *vent. h. cels.*

BOIS-GUITARE
velu. Antilles. s. ch. ♄
quadrangulaire. Antill. s. ch. ♄
coriace. s. ch. ♄
à 5 étamines. Antill. s. ch. ♄

DURANTA
plumieri *l.*
ellisia *l.*
microphylla.

DURANTA
de Plumier. Antilles. s. ch. ♄
lancéolé. Antilles. s. ch. ♄
à petites feuill. Antill. s. ch. ♄

LANTANA
trifolia *l.*
annua *l.*
involucrata *l.*
recta *h. k.*
salvifolia *jacq. h. sch.* (non *lin.*)
violacea.
cinerea *encycl.*
nivea *vent. malm.*
suaveolens.
camara *l.*
aculeata *l.*
— flava.

LANTANA
à feuilles ternées. Ant. s. ch. ♄
annuel. Antilles. ☉
à involucre. Antilles. s. ch. ♄
à tige droite. Antill. s. ch. ♄
à feuill. de sauge. cap. or. ♄
violet. s. ch. ♄
cendré. Antilles. s. ch. ♄
à fleurs blanch. inde. s. ch. ♄
odorant. s. ch. ♄
camara. Antilles. s. ch. ♄
épineux. Antilles. s. ch. ♄
— *jaune.*

SPIELMANNIA
africana *willd. sp.*
lantana africana *l.*

SPIELMANNE
d'Afrique. cap. or. ♄

ZAPPANIA
globifera.
verbena globifera *l'her. stirp.*
odoratissima *scop. insubr.*

ZAPPANIA
globuleux. Antilles. s. ch. ♄

PRIVA
nodiflora *pers. syn.*
verbena nodiflora *l.*

nodiflore. f. m. or. ♄

PRIVA
mexicana *pers. syn.*
verbena mexicana *l.*

du Mexique. s. ch. ♄

STACHYTARPHETA
angustifolia *vahl. sp.*
verbena indica *jacq. obs.* (non *lin.*).
mutabilis *vahl. sp.*
verbena mutabilis *jacq. ic.*
jamaicensis *vahl. sp.*
verbena jamaicensis *l.*

STACHYTARPHETA
à feuilles étroites. Am. m. ☉
changeant. chili. s. ch. ♄
de la Jamaïque. s. ch. ♄

VERBENA
triphylla *l'her. stirp.*
multifida *Fl. per.*
erinoides *Lamk. Ill.*
aubletia L. *f.*
urticæfolia L.
carolina L.
stricta *Vent. H. cels.*
rigens *Mich. Fl.*
paniculata *Lamk. Ill.*
diffusa.
hastata L.
bonariensis L.
bracteosa *Mich. Fl.*
officinalis L.
supina L.

SELAGO
corymbosa L.

HEBENSTRETIA
dentata L.

VERVEINE
à trois f. chili. or. ♄ (orn.)
laciniée. pérou. ☉
à bouquets. caroline. or. ♂
à feuilles d'ortie. am. s. ♌
de Caroline. ♆
fasciculée. am. s. ♆
paniculée. am. s. ♌
étalée. or. ♄
hastée. am. s. ♆
de Buénos-Ayres. or. ♂
à longues bractées. am. s. ☉
officinale. f. ♆ (méd.)
couchée. f. ☉

SÉLAGO
corymbifère. cap. or. ♄

HÉBENSTRETIA
denté. cap. or. ♂

ORDO VI.

LABIATÆ.

I. Stamina 2 *fertilia.*

LYCOPUS
europæus L.
exaltatus L. *f.*

AMETHYSTEA
cærulea L.

ZIZIPHORA
capitata L.
tenuior L.
cunila.
cunila capitata L. *f.*
pulegioides
cunila pulegioides L.
mariana.
cunila mariana *S. veg.*

MONARDA
fistulosa L.
didyma L.
violacea.
clinopodia L. ?
punctata *S. veg.*

ORDRE VI.

LABIÉES.

1. 2 étamines fertiles.

LYCOPUS
d'Europe. f. ♌
pinnatifide. italie. ♆

AMÉTHYSTÉA
bleu. sibérie. ☉

ZIZIPHORA
à fleurs en tête. orient. ☉
lancéolé. orient. ☉
cunila. sibérie.
à feuill. de pouliot. canada. ☉
de Virginie. am. s. ♆

MONARDA
fistuleux. am. s. ♆ (orn.)
écarlate. am. s. ♆ (orn.)
violet. am. s. ♆
ponctué. am. s. ♌

WESTERINGIA	*WESTERINGIA*
rosmarinifolia *Andr. rep.*	*à f. de* romarin. N. holl. or. ♄
ROSMARINUS	*ROMARIN*
officinalis L.	*officinal.* F. ♄ (méd. orn.)
SALVIA.	*SAUGE.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tiges ligneuses.
pomifera L.	*pomifère.* crète. or. ♄
officinalis L.	*officinale.* F. m. ♄
— tricolor.	— *de trois couleurs.*
— variegata.	— *panachée.*
tenuior.	*de Catalogne.* F. m. ♄
grandiflora *vahl. sp.*	*à grandes fleurs.* orient. ♄
cretica L.	*de Crète.* ♄
sypilea *Lamk. ill.* / triloba L. *f. ?*	*du mont sypile.* or. ♄
africana L.	*d'Afrique.* cap. or. ♄
paniculata L. *mant.*	*paniculée.* cap. or. ♄
chamædryoides *cav. ic.*	*chamædrys.* mexique. or. ♄
aurea L.	*dorée.* cap. or. ♄
interrupta *schousb. mar.*	*interrompue.* maroc. or. ♄
canariensis L.	*des Canaries.* or. ♄
mexicana L.	*du Mexique.* or. ♄
formosa *l'her. stirp.* / leonuroides *vahl. sp.*	*écarlate.* pérou. s. ch. ♄
polystachya *cav. ic.*	*à plusieurs épis.* mexiq. or. ♄
melissæfolia.	*à feuilles de mélisse.* or. ♄
scorodoniæfolia.	*à feuill. de scorodonia.* or. ♄
lamiifolia *Jacq. h. sch.*	*à feuilles de Lamium.* or. ♄
leucantha *cav. ic.*	*à fleurs blanch.* mexiq. or. ♄
fœtida *Desf. Atl.* / tingitana *willd. sp.*	*fétide.* Alger. or. ♄
coccinea L. *f.*	*rouge.* Floride. or. ♄
pseudo-coccinea *Jacq. ic.*	*fausse écarlate.* Ant. s. ch. ♄
disermas L.	*disermas.* syrie. or. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tige herbacée.
pulchella *Dec. cat.*	*élégante.* or. ♃
pinnata L.	*pennée.* orient. or. ♆
azurea *vahl. sp.* / acuminata *vent. h. cels.* / angustifolia *Mich. Fl.*	*azurée.* caroline. or. ♆
reptans *Jacq. h. sch.* / angustifolia *cav. ic.*	*rampante.* N. Esp. s. ch. ♆
scabiosæfolia *Lamk., Journ. d'hist. nat.* / habliziana *willd. sp.*	*à f. de scabieuse.* orient. or. ♆

glutinosa *L.*	*gluante.* Alpes. ♆
amarissima *Vahl. sp.*	*amère.* Mexique. or. ♆
circinata *Cav. ic.*	
pratensis *L.*	*des prés.* F. ♄ (méd.)
sclarea *L.*	*sclarée.* F. ♂ (méd.)
patula *Desf. Atl.*	*étalée.* Barbarie. or. ♂
præcox.	*précoce.* orient. ☉
spinosa *Jacq. ic.*	
Æthiopis *L.*	*cotonneuse.* orient. ♂
austriaca *Jacq. Austr.*	*d'Autriche.* ♆
argentea *L.*	*argentée.* orient. or. ♂
phlomoides *Vahl. sp.*	*phlomoïde.* Esp. or. ♆
indica *L.*	*des Indes.* ♆
bicolor *Desf. Atl.*	*bicolore.* Alger. ♄ (orn.)
crassifolia *Jacq. Frag.*	
ceratophylla *L.*	*corne-de-cerf.* syrie. or. ♂
ceratophylloides *L. Mant.*	*laciniée.* sicile. or. ♂
runcinata *L. f.*	*pinnatifide.* cap. or. ♆
clandestina *Encycl.* (non *L.*)	*clandestine.* Italie. ♂
erosa.	*rongée.* ☉
sylvestris *L.*	*sauvage.* Allem. ♆
nemorosa *L.*	*des bois.* Autriche. ♆
virgata *Jacq. Hort.*	*effilée.* orient. ♄
gigantea.	*gigantesque.* ♂
nubia *Vahl. sp.*	*de Nubie.* ☉
nilotica *L. f.*	*du Nil.* ☉
viscosa *Jacq. ic.*	*visqueuse.* Italie. ♆
verticillata *L.*	*verticillée.* F. m. ♄
napifolia *Jacq. Hort.*	*à feuilles de Navet.* F. ♆
ægyptiaca *L.*	*d'Egypte.* or. ♆
Horminum *L.*	*ormin.* F. m. ☉
— rubens.	— *rouge.*
viridis *L.*	*verte.* Barbarie. ☉
nepetifolia.	*à feuilles de cataire.* ☉
lanceolata.	*lancéolée.* ☉
verbenaca *L.*	*verveine.* F. ♂
micrantha.	*à petites fleurs.* ♂
serotina *L. Mant.*	*tardive.* orient. ♂
dominica *L.*	*des Antilles.* S. ch. ♆
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ☉
tiliæfolia *Vahl. sp.*	*à feuilles de Tilleul.* Pérou. ☉
nutans *L.*?	*penchée.* Russie. ♆
pendula.	
nutans *Wald. et Kitt. Hung.*	*pendante.* Russie. ♆

COLLINSONIA	*COLLINSONIA*
canadensis *L.*	*de Canada.* ♆

II. Stamina 4 didynama, labium superius nullum aut brevissimum.	II. 4 étamines didynames, lèvre supérieure nulle ou presque nulle.
AJUGA	*BUGLE*
orientalis *L.*	*d'Orient.* or. ♆
genevensis *L.*	*de Genève.* F. ♆
pyramidalis *L.*	*pyramidale.* F. ♆
reptans *L.*	*rampante.* F. ♆
TEUCRIUM	*GERMANDRÉE*
canariense *Encycl.*	*des Canaries.* or. ♄
heterophyllum *willd. sp.*	
fruticans *L.*	*arbrisseau.* F. m. or. ♄
rosmarinifolium *Encycl.*	*à f. de* ROMARIN. orient. or. ♄
betonicum *l'Her. stirp.*	*à f. de Bétoine.* canar. or. ♄
canescens *Forst. Goett.*	
maderiense *Encycl.*	
abutiloides *l'Her. stirp.*	*à f. d'Abutilon.* canar. or. ♄
campanulatum *L.*	*campanulée.* orient. ♄
orientale *L.*	*d'Orient.* or. ♄
resupinatum *Desf. Atl.*	*renversée.* Alger. or. ♄
chamæpitys *L.*	*chamæpitys.* F. ☉ (méd.)
pseudo-chamæpitys *L.*	*faux chamæpitys.* barb. or. ♄
IVA *L.*	*Ivette.* F. m. or (méd.)
LAXMANNI *S. Veg.*	*de Laxmann.* sibérie. ♂
BOTRYS *L.*	*Botrys.* F. ☉ (méd.)
cubense *L. Mant.*	*de Cuba.* s. ch. ♆
flavum *L.*	*jaune.* Esp. ♄
lucidum *L.*	*luisante.* F. m. ♄
chamædrys *L.*	*chamædrys.* F. ♄ (méd.)
— major.	— *élevée.*
myrtiflorum.	*à feuill. de Myrte.* orient. or. ♄
MARUM *L.*	*Marum.* Esp. or. ♄ (méd.)
multifolium *L.*	*à fleurs nombr.* Esp. or. ♄
canadense *L.*	*de Canada.* ♄
hyrcanicum *L.*	*d'Hyrcanie.* ♄
massiliense *L.*	*de Marseille.* or. ♄
asiaticum *L. Mant.*	*d'Asie.* or. ♄
scorodonia *L.*	*des bois.* F. ♆ (méd.)
scordium *L.*	*scordium.* F. ♆ (méd.)
montanum *L.*	*de montagne.* F. m. or. ♄
pyrenaicum *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
aureum *schreb. vert.*	*jaunâtre.* F. m. or. ♄
flavicans *Encycl.*	
POLIUM *L.*	*POLIUM.* F. m. or. ♄
capitatum *L.*	*à fleurs en tête.* Esp. or. ♄
spinosum *L.*	*épineuse.* Esp. ♂

III. Stamina 4 didynama, corolla bilabiata.

SATUREIA
- græca L.
- juliana L.
- capitata L.
- thymbra L.
- montana L.
- hortensis L.

HYSSOPUS
- officinalis L.
- — myrtifolius.
- angustifolius *marsch. cauc.*
- lophanthus L.
- nepetoides L.
- scrophulariæfolius *willd. sp.*
- ocimifolius *encycl.*
- mentha patrini *pallas. n. act. petr.*
- mentha ovata *cav. ic.*
- elsholtzia cristata *willd. en.*

NEPETA
- cataria L.
- pannonica L.
- marrubioides *willd. enum.*
- incana *willd. sp.*
- nepetella L.
- amethystina.
- longiflora *vent. h. cels.*
- nuda L.
- — alba.
- violacea L.
- crispa *willd. sp.*
- italica L.
- reticulata *desf. atl.*
- tuberosa L.
- bipinnata *cav. ic.*
- botryoides *willd. sp.*
- multifida L. *f.* (non L. *sp.*)
- multifida L.
- lavendulacea L. *f.*

PERILLA
- ocimoides *s. veg.*

LAVANDULA
- spica L.
- latifolia.

III. 4 étamines didynames, corolle à deux lèvres.

SARRIETTE
- *de Grèce.* or. ♄
- *à feuill. linéair.* orient. or. ♄
- *à fleurs en tête.* orient. or. ♄
- *thymbra.* orient. or. ♄
- *de montagne.* F. ♄
- *des jardins.* F. ☉ (écon. méd.)

HYSOPE
- *officinal.* F. ♄ (méd.)
- — *à feuilles de myrte.*
- *à feuilles étroites.* ibérie. ♄
- *à fl. renversées.* chine. or. ♄
- *à feuill. de cataire.* AM. S. ♆
- *à f. de scrophulaire.* canad. ♄
- *à grandes bractées.* sibér. ☉

CATAIRE
- *herbe-aux-chats.* F. ♄ (méd.)
- *paniculée.* hongrie. ♆
- *à feuilles de marrube.* ♄
- *blanche.* orient. ♄
- *à feuilles étroites.* F. ♄
- *améthyste.* ♆
- *à longues fleurs.* orient. or. ♆
- *nue.* suisse. ♆
- — *à fleurs blanches.*
- *violette.* ESP. ♄
- *crépue.* orient. or. ♄
- *d'Italie.* ♆
- *réticulée.* barbarie. ♆
- *tubéreuse.* ESP. ♄
- *bipennée.* sibérie. ☉

PÉRILLA
- *à feuill. de basilic.* inde. ☉

LAVANDE
- *spic.* F. m. ♄ (orn. méd.)
- *à larges feuilles.* or. ♄

stœchas L.	*stéchas.* F. m. or. ♄ (méd.)
heterophylla.	*à feuilles variables.* or. ♄
dentata L.	*dentée.* esp. or. ♄
multifida L.	*découpée.* barbarie. ☉
pinnata *willd. sp.*	*pennée.* madère. or. ♄
elegans. abrotanoides *willd. sp.*	*élégante.* canaries. or. ♄

SIDERITIS.

SIDÉRITIS.

1. *Ebracteatæ.*

1. Fleurs sans bractées.

cretica L.	*de Crète.* or. ♄
candicans *willd. sp.*	*blanchâtre.* madère. or. ♄
canariensis L.	*des Canaries.* or. ♄
montana L.	*des montagnes.* F. ☉
romana L.	*de Rome.* F. m. ☉
nigricans *encycl.* elegans *willd. sp.*	*noirâtre.* ☉

2. *Bracteatæ bracteis integris.*

2. Fleurs accompagnées de bractées entières.

syriaca L.	*de Syrie.* or. ♄
perfoliata L.	*perfolié.* orient. or. ♆

3. *Bracteatæ bracteis dentatis.*

3. Bractées dentées.

hirsuta L. (*exclus. syn. Bauhini.*)	*velu.* F. ♄
fœtida.	*fétide.* esp. ♄
scordioides L.	*à feuilles de scordium.* F. ♃
hyssopifolia L.	*à feuilles d'hysope.* F. ♄
incana L.	*blanc.* esp. or. ♄

BISTROPOGON

BISTROPOGON

canariense *l'her. sert.*	*des Canaries.* or. ♄
punctatum *l'her. sert.*	*ponctué.* canaries. or. ♄

MENTHA.

MENTHE.

1. *Spicatæ.*

1. Fleurs en épis.

lavandulæfolia.	*à feuilles de lavande.* or. ♃
sylvestris L.	*sauvage.* F. ♆ (méd.)
viridis L.	*verte.* F. ♆
rotundifolia L.	*ronde.* F. ♆
crispa L.	*crépue.* F. ♃
piperita L.	*poivrée.* angleterre. ♆ (méd.)

2. *Capitatæ.*

2. Fleurs en tête.

aquatica L.	*aquatique.* F. ♆
citrata *willd. sp.*	*citronnelle.* europe. ♃

3. *Verticillatæ.*

sativa L.
gentilis L.
arvensis L.
pulegium L.
cervina L.

HYPTIS
capitata *Jacq. ic.*

GLECOMA
hederacea L.
hirsuta *Wald. et Kitt. Hung. ?*

LAMIUM
orvala L.
hirsutum *Encycl.*
maculatum L.
garganicum L.
purpureum L.
amplexicaule L.
album L.
molle *H. K.*

GALEOPSIS
tetrahit L.
ladanum L.
villosa *smith. Fl.*
grandiflora *Willd. sp.*
versicolor *smith. Fl.*

GALEOBDOLON
luteum *smith. Fl.*
leonurus galeobdolon *Willd. sp.*
galeopsis galeobdolon L.

BETONICA
officinalis L.
hirsuta L. *mant.*
orientalis L.
grandiflora *Willd. sp.*
alopecuros L.

STACHYS
sylvatica L.
palustris L.
coccinea *Jacq. H. sch.*
lanata *Jacq. ic.*
germanica L.
intermedia *Willd. sp.*

3. Fleurs verticillées.

cultivée. EUR. ♃ (méd.)
purpurine. EUR. ♃ (méd.)
des champs. F. ♃ (méd.)
poul'ot. F. ♆ (méd.)
fétide. F. ♃

HYPTIS
à fleurs en tête. Antill. s. ch. ♃

GLÉCOMA
Lierre terrestre. F. ♆ (méd.)
velu. F. ♃

LAMIUM
orvale. Italie. ♆
velu. F. ♆
maculé. F. ♃
à feuilles de cataire. Italie. ♆
pourpre. F. ☉
amplexicaule. F. ☉
blanc. F. ♃ (méd.)
à feuilles entières. ♆

GALEOPSIS
Tétrahit. F. ☉
Ladanum. F. ☉
velu. F. ☉
à grandes fleurs. F. ☉

GALEOBDOLON
à fleurs jaunes. F. ♆

BÉTOINE
officinale. F. ♃ (méd.)
velue. F. ♆
d'Orient. ♃
à grandes fleurs. orient. ♃
jaune. Alpes. ♃

STACHYS
des bois. F. ♃
des marais. F. ♃
écarlate. Mexique. or. ♆
laineux. Sibérie. ♆
cotonneux. F. ♆
intermédiaire. ♆

scordioides.	*à f. de scordium.* maroc. or. ♄
palestina L.	*de Palestine.* or. ♄
alpina L.	*des Alpes.* ♆
circinata *l'her. stirp.*	*à feuilles rondes.* barb. or. ♆
nepetifolia.	*à feuilles de cataire.* or. ♄
hirta L.	*velu.* F. ♄
glutinosa L.	*gluant.* crète. or. ♆
mollissima *willd. enum.*	*velouté.* ♄
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
recta L. *mant.*	*crapaudine.* F. ♄
purpurea.	*pourpre.* or. ♆
annua L.	*annuel.* F. ☉
maritima L. *mant.*	*maritime.* ♆
BALLOTA	*BALLOTE*
lanata L.	*laineux.* sibérie. ♄
nigra L.	*noir.* F. ♆
MARRUBIUM.	*MARRUBE.*
1. *Calicibus quinquedentatis.*	1. Calices à 5 dents.
Alysson L.	*Alysson.* esp. or. ♆
peregrinum L.	*étranger.* orient. ♄
candidissimum L.	*très-blanc.* orient. ♆
supinum L.	*couché.* F. m. or. ♆
rugosum.	*ridé.* or. ♆
astracanicum *marsch. cauc.*	*d'Astracan.* ♆
2. *Calicibus decemdentatis.*	2. Calices à 10 dents.
vulgare L.	*commun.* F. ♆ (méd.)
crispum L.	*crépu.* italie. or. ♄
pseudo-dictamnus L.	*faux dictame.* crète. or. ♄
hispanicum *encycl.* (non L.)	*d'Espagne.* ♄
LEONURUS	*CARDIAQUE*
marrubiastrum. L.	*à petites fleurs.* Allem. ☉
sibiricus L.	*de Sibérie.* ♂
cardiaca L.	*officinale.* F. ♆ (méd.)
crispus L.	*crépue.* sibérie. ♆
villosus.	*velue.* ♆
tataricus L.	*de Tartarie.* ♂
PHLOMIS	*PHLOMIS*
fruticosa L.	*arbrisseau.* sicile. ♄ (orn.)
— angustifolia.	— *à feuilles étroites.*
— latifolia.	— *à larges feuilles.*
italica *smith. spicil.*	*d'Italie.* or. ♄
purpurea *smith. spicil.*	*pourpre.* esp. or. ♄
lychnitis L.	*à feuill. de sauge.* F. m. or. ♄
laciniata L.	*lacinié.* syrie. ♆

herba-venti *L.* — *violet.* F. m. ♅
tuberosa *L.* — *tubéreux.* sibérie. ♅ (orn.)
Leonurus *L.* — *Léonurus.* cap. or. ♄ (orn.)
nepetifolia *L. f.* — *à feuilles de cataire.* inde. ☉
zeylanica *L.* — *de Ceylan.* ☉
caribæa *Jacq. ic.* / martinicensis *willd. sp.* — *des Antilles.* ☉

Molucella — *Molucelle*
lævis *L.* — *lisse.* syrie. ☉
spinosa *L.* — *épineuse.* syrie. ☉

Clinopodium — *Clinopodium*
vulgare *L.* — *commun.* F. ♅
incanum *L.* — *blanc.* Am. S. ♅

Origanum — *Origan*
Dictamnus *L.* — *Dictame.* crète. or. ♅ (orn.)
vulgare *L.* — *commun.* F. ♅ (méd).
humile. — *nain.* ♅
pallidum. — *pâle.* orient. ♅
smyrneum *L.* — *de Smyrne.* orient. or. ♅
ægyptiacum *L.* — *à coquilles.* orient. or. ♄ (orn.)
majoranoïdes *willd. sp.* — *Marjolaine.* orient. or. ♄

Thymus — *Thym*
serpyllum *L.* — *serpolet.* F. ♅ (méd.)
— villosum. — *velu.*
— citratum. — *citronnelle.*
Piperella *S. veg.* — *Piperelle.* Esp. or. ♄
vulgaris *L.* — *commun.* Esp. ♄ (orn. méd.)
— latifolius. — *à larges feuilles.*
majoranæfolius. — *à feuilles de Marjolaine.* ♄
filiformis *willd. sp.* — *filiforme.* Mahon. or. ♄
zygis *L.* — *zygis.* Esp. or. ♄
hispanicus. — *d'Espagne.* or. ♄
Mastichina *L.* — *Mastichine.* Esp. or. ♄
alpinus *L.* — *des Alpes.* ♅
patavinus *Jacq. obs.* — *de Padoue.* or. ♂
Acinos *L.* — *Acinos.* F. ☉
virginicus *S. veg.* / Brachystemum virginicum *Mich. Fl.* — *de Virginie.* ♅

Thymbra — *Thymbra*
spicata *L.* — *à épis.* orient. or. ♄

Melissa — *Mélisse*
officinalis *L.* — *officinale.* F. ♅ (écon. méd.)
hirsuta. — *velue.* ♅
grandiflora *L.* — *à grandes fleurs.* Alpes. ♅

nepeta L.	*Népéta.* F. ♆
calamintha L.	*calament.* F. ♃
cretica L.	*de Crète.* OR. ♆
DRACOCEPHALUM	*DRACOCEPHALUM*
virginianum L.	*de Virginie*, ou *cataleptique.* ♆ (ORN.)
canariense L.	*des Canaries.* OR. ♄
peregrinum L.	*découpé.* SIBÉRIE. ♃
austriacum L.	*d'Autriche.* ♆
ruyschiana L.	*à feuilles linéaires.* SIBÉRIE. ♃
sibiricum L.	*de Sibérie.* ♆
moldavica L.	*moldavique.* SIBÉRIE. ☉
canescens L.	*blanc.* ORIENT. ☉
peltatum L.	*en bouclier.* ORIENT. ☉
nutans L.	*à fleurs penchées.* SIBÉRIE. ☉
thymiflorum L.	*à fleurs de thym.* SIBÉRIE. ☉
MELITTIS	*MÉLITTIS*
melissophyllum L.	*à feuilles de mélisse.* F. ♃
HORMINUM	*ORMIN*
pyrenaicum L. / melissa pyrenaica *willd. sp.*	*des Pyrénées.* ♆
virginicum L.	*de Virginie.* ♃
caulescens *ortega. dec.* / lepechinia spicata *willd. enum.*	*jaune.* MEXIQUE. OR. ♆
PLECTRANTHUS	*PLECTRANTHUS*
fruticosus *l'her. stirp.* / germanea urticæfolia *encycl.*	*arbrisseau.* CAP. OR. ♄
punctatus *l'her. stirp.* / ocimum punctatum L. *f.*	*tacheté.* AFR. ♂
parviflorus *willd. enum.*	*à petites fleurs.* PÉROU. S. CH. ♄
OCIMUM	*BASILIC*
gratissimum L.	*suave.* INDE. S. CH. ♄
zeylanicum.	*de Ceylan.* S. CH. ♄
micranthum *willd. enum.*	*à fleurs menues.* ☉
tenuiflorum L.	*à petites fleurs.* INDE. ☉
basilicum L.	*cultivé.* INDE. ☉ (ORN.)
— fimbriatum.	— *laciniè.*
— bullatum.	— *bulleux.*
minimum L.	*nain.* CEYLAN. ☉
SCUTELLARIA	*SCUTELLAIRE*
fruticosa.	*arbrisseau.* PERSE. OR. ♄
lupulina L.	*jaune-pâle.* SIBÉRIE. ♆
alpina L.	*des Alpes.* ♆
lateriflora L.	*à grappes.* AM. S. ♃

galericulata L.
minor L.
integrifolia L.
peregrina L.
altissima L.
albida L. *Mant.*

BRUNELLA
vulgaris L.
grandiflora *Willd. sp.*
laciniata L.
hyssopifolia L.
ovata.

CLEONIA
lusitanica L.

PRASIUM
majus L.
minus L.

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA
globosa *Lamk. Ill.*
salvifolia *Willd. sp.*
salicifolia *Jacq. H. sch.*

SCOPARIA
dulcis. L.

CAPRARIA
biflora L.
lucida *Willd. sp.*

HALLERIA
lucida L.

SCROPHULARIA
nodosa L.
aquatica L.
betonicifolia L. *Mant.*
auriculata L.
altaica *Willd. sp.*
scorodonia L.
scopolii *Pers. syn.*
sambucifolia L.
mellifera *Vahl. symb.*

toque. F. ♄
petite. F. ♄
à feuilles entières. AM. S. ♆
étrangère. ITALIE. ♆
élevée. ORIENT. ♆
blanche. ORIENT. ♆

BRUNELLE
commune. F. ♄
à grandes fleurs. F. ♆ (orn.)
laciniée. F. ♄
à feuilles d'hysope. F. M. ♄
à feuilles ovales. AM. S. ♆

CLÉONIA
de Portugal. ☉

PRASIUM
arbrisseau. F. M. OR. ♄
herbacé. ITALIE. OR. ♆

ORDRE VII.

SCROPHULAIRES.

I. 4 étamines didynames.

BUDLEIA
à globules. CHILI. ♄
à feuill. de sauge. CAP. OR. ♄
à feuill. de saule. CAP. OR. ♄

SCOPARIA
doux. ANTILLES. ☉

CAPRARIA
à deux fleurs. ANT. S. CH. ♄
à feuilles luisantes. CAP. OR. ♄

HALLÉRIA
luisant. CAP. OR. ♄

SCROPHULAIRE
des bois. F. ♆ (méd.)
aquatique. F. ♄ (méd.)
à f. de bétoine. PORTUG. OR. ♄
auriculée. BARBARIE. OR. ♆
de Sibérie. ♆
scorodonia. BARBARIE. OR. ♆
de Scopoli. CARNIOLE. ♄
à f. de sureau. PORTUG. OR. ♆
mellifère. BARBARIE. OR. ♄

trifoliata L.	*à trois folioles.* barbar. or. ♄
appendiculata *Jacq. H. sch.*	
orientalis L.	*d'Orient.* ♄
vernalis L.	*printanière.* F. ♂
peregrina L.	*étrangère.* Italie or. ♄
glabrata *Jacq. H. sch.*	*glabre.* canaries. or. ♂
lucida L.	*luisante.* orient. or. ♆
chrysanthemifolia *Willd. H. Ber.*	*à feuill. de chrysanthème.* F. ♄
verbenæfolia.	*à feuilles de verveine.* ♄
DODARTIA	*DODARTIA*
orientalis L.	*d'Orient.* ♆
LINARIA (antirrhinum L.).	*LINAIRE.*
1. *Foliis angulatis.*	1. Feuilles anguleuses.
cymbalaria *Willd. Enum.*	*cymbalaire.* F. ♆ (méd.)
pilosa *Willd. Enum.*	*velue.* Alpes. ♆
Elatine L.	*Elatiné.* F. ☉
spuria L.	*velvote.* F. ☉
cirrhosa *Willd. Enum.*	*à vrilles.* Égypte. ☉
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* ☉
2. *Foliis inferioribus oppositis.*	2. Feuilles inférieures opposées.
triphylla *Willd. Enum.*	*à feuilles ternées.* Tunis. ☉
triornithophora *Willd. Enum.*	*à grand. fleurs.* Portugal. ☉
purpurea *Willd. Enum.*	*pourpre.* F. ♄
bipartita *Willd. Enum.*	*à fleurs d'orchis.* Maroc. ☉
versicolor *Willd. Enum.*	*bigarrée.* F. ☉
repens *Willd. Enum.*	*rampante.* F. ☉
marginata *Desf. Atl.*	*membraneuse.* Barbarie. or. ♆
supina *Willd. Enum.*	*couchée.* F. ☉
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
simplex *Willd. Enum.*	*à tiges simples.* F. ☉
pelisseriana L.	*de Pelissier.* F. ☉
multicaulis L.	*paniculée.* orient. ☉
juncea *Encycl.*	
Antirrhinum sparteum *Cav. Ic*	*jonciforme.* Esp. ☉
alpina *Willd. Enum.*	*des Alpes.* ♂
elegans.	*élégante.* Esp. ☉
origanifolia *Willd. Enum.*	*à feuilles d'origan.* F. m. ☉
minor *Willd. Enum.*	*petite.* F. ☉
littoralis *Willd. Enum.*	*des rivages.* Autriche. ☉
pubescens.	*pubescente.* ☉
3. *Foliis alternis.*	3. Feuilles alternes.
hirta L.	*velue.* Esp. ☉
genistifolia *Willd. Enum.*	*à feuilles de Genêt.* Suisse. ♄
vulgaris *Willd. Enum.*	*commune.* F. ♆
chalepensis *Willd. Enum.*	*à long éperon* F. ☉
canadensis L.	*de Canada.* ☉

ANTIRRHINUM
majus L.
orontium L.
angustifolium *Encycl. suppl.*
molle L.
sempervirens *Lapeyr. pyr.*
Asarina L.

MUFLIER
des jardins. F. ♂ (orn.)
tête-de-mort. F. ☉
à feuilles étroites. OR. ♄
velouté. ESP. OR. ♄
toujours vert. F. M. OR. ♄
Asarine. F. ♃

ANARRHINUM
bellidifolium.
Antirrhinum bellidifolium L.

ANARRHINUM
à feuilles de Paquerette. F. ♂

NEMESIA
fœtens *Vent. Malm.*
chamædryfolia *Vent. Malm.*
Antirrhinum macrocarpum *Vahl. symb.*

NÉMÉSIA
fétide. CAP. OR. ♄
à f. de chamædrys. CAP. OR. ♃

HORNEMANNIA
bicolor *Willd. Enum.*

HORNEMANNIA
bicolore. CAP. OR. ♂

DIGITALIS
canariensis L.
purpurea L.
minor L. *Mant.*
ambigua L. *f.*
lutea L.
aurea.
ferruginea L.
parviflora *Jacq. Hort.*
orientalis *Encycl.*
obscura L. *Mant.*

DIGITALE
des Canaries. OR. ♄ (orn.)
pourprée. F. ♂ (méd. orn.)
petite. ESP. OR. ♃
ambiguë. F. ♆
jaune. F. ♃
dorée. ♆
rouillée. ITALIE. ♃
à petites fleurs. ♂
d'Orient. ♃
à feuilles étroites. ESP. OR. ♄

USTERIA
scandens *Cav. Ic.*
maurandia semperflorens *Jacq. H. Sch.*

USTÉRIA
sarmenteux. MEXIQUE. OR. ♆

II. Stamina 2.

II. 2 étamines.

CALCEOLARIA
pinnata L. *Mant.*

CALCÉOLAIRE
pennée. PÉROU. ☉

III. Genera scrophulariis affinia, oppositifolia.

III. Genres qui ont de l'affinité avec les scrophulaires, feuilles opposées.

COLUMNEA
erecta *Encycl.*
cyrilla pulchella *l'Her. Stirp.*
buchnera coccinea *Scop. Ins.*
Gesneria coccinea *Swartz. Pr.*
Achymenes coccinea *Pers. Syn.*
Trevirana coccinea *Willd. En.*
hirsuta *Swartz. Prodr.?*

COLUMNÉA
écarlate. ANTILL. S. CH. ♃ (orn.)
velu. ANTILLES. S. CH. ♄

GRATIOLA
officinalis L.

MIMULUS
ringens L.
glutinosus *willd. sp.*
aurantiacus *bot. mag.*
guttatus *dec. cat.*
luteus *bot. mag.* (non L.)

LINDERNIA
pyxidaria L. *mant.*

BROWALLIA
elata L.
demissa L.

ORDO VIII.

SOLANEÆ.

I. Fructus capsularis.

CELSIA
orientalis L.
arcturus *s. veg.*
cretica L. *f.*
heterophylla *pers. syn.*

HEMITOMUS
fruticosus *l'her. mss.*
celsia linearis *jacq. ic.*
hemimeris coccinea *willd. sp.*
urticæfolia.
celsia urticæfolia *bot. mag.*
hemimeris urticæfolia *willd. sp.*

VERBASCUM
thapsus L.
thapsoides L.
elongatum *willd. enum.*
phlomoides L.
lychnitis L.
— album.
nigrum L.
rugulosum *willd. enum.*
floccosum *willd. enum.*
pulverulentum *smith. fl.*
pyramidatum *marsch. cauc.*
sinuatum L.

GRATIOLE
officinale. F. ♃ (méd.)

MIMULUS
à deux lèvres. AM. S. ♃
glutineux. S. CH. ♄
tacheté. PÉROU. S. CH. ♆

LINDERNIA
pyxidaire. F. ☉

BROWALLIA
à tige droite. PÉROU. ☉
à tige tombante. AM. M. ☉

ORDRE VIII.

SOLANÉES.

I. Une capsule.

CELSIA
d'Orient. ☉
Arcturus. orient. or. ♂
de Crète. or. ♂
à feuilles variables. or. ♂

HÉMITOMUS
arbrisseau. PÉROU. S. CH. ♄
à feuilles d'ortie. PÉROU. OR. ♄

MOLÉNE
commune. F. ♂ (méd.)
thapsoïde. F. ♂
à longue grappe. ♂
phlomoïde. F. ♂
cunéiforme. F. ♂
— *à fleurs blanches.*
noire. F. ♂
ridée. ♂
floconneuse. HONGRIE. ♂
pulvérulente. F. ♂
pyramidale. CAUCAS. ♂
sinuée. F. ♂

phœniceum L.
Blattaria L.
— alba.
Blattarioides *Encycl.*
spinosum L.

RAMONDA
pyrenaica *Pers. syn.*
verbascum Myconi L.

HYOSCIAMUS
niger. L.
pallidus *Willd. Enum.*
reticulatus L.
albus L.
betæfolius *Encycl.*
Datora *Forsk. Fl.*
muticus L. *Mant.*
aureus L.
pusillus L.
physaloides L.
scopolia L. *Mant.*
scopolia carniolica *Jacq. obs.*

NICOTIANA
Tabacum L.
fruticosa L.?
glutinosa L.
rustica L.

paniculata L.
plumbaginifolia *Willd. Enum.*
crispa.
undulata *Vent. Malm.*

DATURA
stramonium L.
ferox L.
Tatula L.
fastuosa L.
Metel L.
humilis.
ceratocaula *Jacq. H. sch.*
lævis L. *f.*
arborea.
suaveolens *Willd. Enum.*

II. Fructus baccatus.

TRIGUERA
ambrosiaca *Cav. Diss.*

bleue. carniole. ♂
Blattaire. F. ♂
— à fleurs blanches.
fausse Blattaire. ♂
épineuse. orient. or. ♄

RAMONDA
des Pyrénées. ♆

JUSQUIAME
noire. P. ♂ (vénén.)
pâle. Hongrie. ☉
à réseau. orient. ♂
blanche. F. m. ☉
à feuill. de Bette. Égypte. or. ♂
jaune. orient. or. ♃
grêle. orient. ☉
faux coqueret. sibérie. ♆
scopolia. Italie. ♃

NICOTIANE
Tabac. Am. m. ☉ (écon. méd.)
arbrisseau. chine. or. ♄
glunnte. Pérou. ☉
rustique. Am. m. ☉ (écon. méd.)
paniculée. Pérou. ☉ (écon.)
crépue. Pérou. ☉
ondée. N. Holl. or. ♂

DATURA
épineux. F. ☉ (vénén.)
à grosses épin. chine. ☉ (vén.)
Tatula. Asie. ☉
violet. Égypte. ☉ (orn).
Métel. Asie. ☉
nain. ☉
cornu. cuba. ☉
à fruit lisse. Abyssin. ☉
en arbre. Pérou. s. ch. ♄ (orn.)

II. Une baie.

TRIGUÉRA
odorant. Portugal. ☉

SOLANDRA	*SOLANDRA*
grandiflora *Swartz. prodr.* DATURA sarmentosa *Encycl.*	*à grandes fleurs.* ANT. s. ch. ♄
ATROPA	*ATROPA*
MANDRAGORA *L.*	*Mandragore.* F. ♅ (méd. vén.)
BELLADONA *L.*	*Belladone.* F. ♅ (vénén.)
solanacea *L. Mant.*	*à f. de solanum.* cap. or. ♄
arborescens *L.* cestrum campanulatum *Enc.*	*en arbre.* inde. s. ch. ♄
frutescens *L.*	*arbrisseau.* ESP. or. ♄
procumbens *Cav. Ic.*	*couché.* MEXIQUE. ☉
NICANDRA	*NICANDRA*
physalodes. ATROPA physalodes *L.*	*du Pérou.* ☉
PHYSALIS.	*COQUERET.*
1. *Perennes.*	1. Vivaces.
somnifera *L.*	*somnifère.* ESP. or. ♄
arborescens *L.*	*arbre.* ANTILLES. s. ch. ♄
aristata *H. K.*	*barbu.* CANARIES. or. ♄
incana. chenopodiifolia *Lamk. Ill.*	*incane.* PÉROU. s. ch. ♄
curassavica *L.*	*de Curaçao.* s. ch. ♅
pensylvanica *L.*	*de Pensylvanie.* ♅
Alkekengi *L.*	*Alkékenge.* F. ♅ (méd.)
2. *Annuæ.*	2. Annuelles.
barbadensis *L.*	*de la Barbade.* ☉
prostrata *L'Her. Stirp.*	*couché.* PÉROU. ☉
angulata *L.*	*anguleux.* INDE. ☉
pubescens *L.*	*pubescent.* INDE. ☉
fœtens.	*fétide.* N. ESP. ☉
philadelphica *Lamk. Ill.*	*à gros fruit.* AM. s. ☉
SARACHA	*SARACHA*
umbellata *Dec. Cat.*	*ombellifère.* ☉
LYCOPERSICUM	*TOMATE*
esculentum *Dunal. Sol.* solanum LYCOPERSICUM *L.*	*cultivée.* AM. m. ☉ (écon.)
cerasiforme *Dunal. Sol.* solanum PSEUDO-LYCOPERSICUM *Jacq. Hort.*	*cerise.* PÉROU. ☉
HUMBOLDTII. solanum HUMBOLDTII *Willd. H. Ber.*	*de Humboldt.* AM. m. ☉
peruvianum *Dunal. Sol.* solanum peruvianum *L.*	*du Pérou.* s. ch. ♅

SOLANUM.

1. *Inermia.*

dulcamara L.
triquetrum *cav. ic.*
crassifolium *Lamk. ill.*
quercifolium L.
radicans L.
corymbosum *Jacq. ic.*
nigrum L.
villosum *Lamk. ill.*
miniatum *Dunal. sol.*
suffruticosum *Dunal. sol.*
guineense *Dunal. sol.*
nodiflorum *Jacq. ic.*
tuberosum L.

reclinatum *l'Her. stirp.*
pinnatifidum *Lamk. ill.*
laciniatum *H. K.*
macrocarpon L.
æthiopicum L.
zucchagnianum *Dunal. sol.*
diphyllum L.
pseudo-capsicum L.

aggregatum *Jacq. ic.*
muricatum *H. K.*
scabrum *Lamk. ill.*
variegatum *Fl. per.*
pubigerum *Dunal. sol.*
lanceolatum *cav. ic.*
macrophyllum *Dunal. sol.*
grandiflorum *Desf. Arbr.*
verbascifolium L.
auriculatum *Lamk. ill.*
bonariense L.
betaceum *cav. ic.*

2. *Aculeata.*

esculentum *Dunal. sol.*
ovigerum *Dunal. sol.*
fuscatum L.
mammosum L.
ciliatum *Lamk. ill.*
aculeatissimum *Jacq. ic.*
coagulans *Vahl. symb.*
decurrens *Balbis. H. Taur.*
Balbisii *Dunal. sol.*

SOLANUM.

1. Point d'aiguillons.

douce-amère. F. ♄ (méd.)
triangulaire. N. Esp. s. ch. ♄
à feuilles épaisses. cap. or. ♄
à feuill. de chêne. Pérou. or. ♆
rampant. Pérou. or. ♄
corymbifère. Pérou. or. ♄
à fruit noir. F. ⊙ (méd.)
velu. F. ⊙
à fruit rouge. F. ⊙
sous-arbrisseau. Barbarie? ♄
de Guinée. ⊙
nodiflore. île de Fr. s. ch. ♄
Pomme-de-terre. Pérou. ♆ (alim.)

recliné. Pérou. s. ch. ♂
lacinié. N. zél. or. ♄
à gros fruit. Pérou. s. ch. ♄
d'Ethiopie. ⊙
de Zucchagni. s. ch. ♄
à deux feuill. Am. m. s. ch. ♄
Faux-Piment. Madère. or. ♄ (orn.)
aggloméré. Guinée. s. ch. ♄

rude. Pérou. s. ch. ♆

pubescent. s. ch. ♄
lancéolé. Mexique. s. ch. ♄
à larges feuill. Mexiq. s. ch. ♄
à f. de Molène. Antill. s. ch. ♄
auriculé. île de Fr. s. ch. ♄
à bouquets. or. ♄ (orn.)
à f. de Bette. Pérou. s. ch. ♄

2. Tiges garnies d'aiguillons.

Melongène. ⊙ (alim.)
ovifère. ⊙
brun. Am. m. ⊙
Pomme-de-teton. Antilles. ⊙
cilié. ⊙
très-épineux. Am. m. s. ch. ♄
coagulant. Égypte. s. ch. ♄
décurrent. île de Fr. s. ch. ♄

fontanesianum *Encycl. suppl.*	*de Desfontaines.* ⊙
sodomæum *L.*	*hérissé.* cap. or. ♄
rostratum *Dunal. sol.*	*corniculé.* s. ch. ♄
heterodoxum *Dunal. sol.*	*hétérodoxe.* s. ch. ♄
sarmentosum *Lamk. Ill.*	*sarmenteux.* Antilles. s. ch. ♄
lanceæfolium *Jacq ic.*	
vespertilio *H. K.*	*vespertilion.* canaries. or. ♄
Nycterium cordifolium *Vent. Malm.*	
giganteum *Jacq. ic.*	*gigantesque.* cap. s. ch. ♄
marginatum *L. f.*	*blanc.* Abyssinie. s. ch. ♄
tomentosum *L.*	*cotonneux.* Éthiopie. s. ch. ♄
coccineum *Jacq. ic.*	*écarlate.* s. ch. ♄
polygamum *Vahl. symb.*	*polygame.* Antilles. s. ch. ♄
elæagnifolium *Cav. ic.*	*à feuilles de chalef.* Am. m. s. ch. ♄
leprosum *Ortega. Dec.*	*lépreux.* chili. s. ch. ♄
bahamense *L.*	*de Bahama.* s. ch. ♄
igneum *L.*	*couleur de feu.* Ant. s. ch. ♄
pyracantha *Lamk. Ill.*	*de Madagascar.* s. ch. ♄
polyacanthos *Lamk. Ill.*	*polyacanthos.* Antill. s. ch. ♄
carolinense *L.*	*de Caroline.* or. ♄
Milleri *Jacq. ic.*	*de Miller.* cap. s. ch. ♄
ferrugineum *Jacq. H. sch.*	
stramoniifolium *Lamk. Ill.*	
torvum *Swartz. Prodr.*	*ferrugineux.* Antilles. s. ch. ♄
ficifolium *Ortega. Dec.*	
indicum *L. ex Swartz.*	
glutinosum *Encycl. suppl.*	*glutineux.* s. ch. ♄
cuneifolium *Dunal. sol.*	*cunéiforme.* Antilles. s. ch. ♄
lycioides *L. Mant.*	*Faux-Lycium.* Pérou. or. ♄ (orn.)

Capsicum	*Piment*
grossum *L. Mant.*	*irrégulier.* inde. s. ch. ♂
— deflexum.	— *abaissé.*
annuum *L.*	*annuel.* Antilles. ⊙ (écon.)
conicum.	*conique.* s. ch. ♂
frutescens *L.*	*arbrisseau.* inde. s. ch. ♄
violaceum.	*violet.* chine. s. ch. ♂
cerasiforme *Willd. Enum.*	*cerise.* s. ch. ♄
baccatum *L. Mant.*	*baccifère.* inde. s. ch. ♄ (écon.)

Lycium	*Lycium*
afrum *L.*	*d'Afrique.* Esp. or. ♄
europæum *L. Mant.*	*d'Europe.* F. m. or. ♄
carnosum.	*charnu.* or. ♄
rhutenicum *Willd. sp.*	*de Russie.* ♄
barbarum *S. Veg.*	*lancéolé.* chine. ♄

chinense *zamk. ill.*
boerhaaviifolium *l. f.*
ehretia halimifolia *l'her. stirp.*

de Chine. ♄
à feuilles de boerhaavia. pérou. or. ♄

CESTRUM
nocturnum *l.*
diurnum *l.*
laurifolium *l'her. stirp.*
macrophyllum.
fœtidissimum *jacq. h. sch.*
auriculatum *l'her. stirp.*
salicifolium *jacq. h. sch.*
vespertinum *l'her. stirp.*
alaternoides.
parqui *l'her. stirp.*

CESTRUM
de nuit. chili. s ch. ♄
de jour. chili. s. ch. ♄
à f. de laurier. Am. m. s. ch. ♄
à grand. feuill. Ant. s. ch. ♄
fétide. Antilles. s. ch. ♄
auriculé. pérou. s. ch. ♄
à f. de saule. caracas. s. ch. ♄
à fruit noir. Antilles. s. ch. ♄
à f. d'alaterne. Ant. s. ch. ♄
parqui. chili. ♄

III. Genera solaneis affinia.

III. Genres qui ont de l'affinité avec les solanées.

BILLARDIERA
scandens *smith. n. holl.*

BILLARDIERA
sarmenteux. n. holl. or. ♄

BONTIA
daphnoides *l.*

BONTIA
à f. de daphné. Ant. s. ch. ♄

BRUNSFELSIA
americana *l.*

BRUNSFELSIA
d'Amérique. Antill. s. ch. ♄

CRESCENTIA
cujete *l.*

CALEBASSIER
des Antilles. s. ch. ♄

ORDO IX.

BORRAGINEÆ.

I. Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.

ORDRE IX.

BORRAGINÉES.

I. Une baie, tiges lignenses.

CORDIA
officinalis *zamk. ill.*
myxa *l.*
crenata *delile. ægypt.*
dentata *vahl. mss.*
gerascanthus *l.*
macrophylla *l.*
nitida *vahl. mss.*
parviflora *ortega. dec.*
sebestena *andr. rep.*
patagonula.

CORDIA
officinal. égypte. s. ch. ♄ (méd. alim.)
crénelé. égypte. s. ch. ♄
à feuill. dentées. Ant. s. ch. ♄
à f. de verveine. Ant. s. ch. ♄
à grandes feuill. Ant. s. ch. ♄
à feuill. luisant. Ant. s. ch. ♄
à petites fl. n. esp. s. ch. ♄
sébestier. Antilles. s. ch. ♄
patagonula. s. ch. ♄

EHRETIA
tinifolia *l.*
beurreria *l.*

EHRETIA
à f. de laurier-tin. Ant. s. ch. ♄
de Beurrer. Antill. s. ch. ♄

VARRONIA	*VARRONIA*
ferruginea *Lamk. Ill.*	*ferrugineux.* Am. m. s. ch. ♄
bullata *L.*	*bulleux.* Antilles. s. ch. ♄
mirabilioides *Jacq. Am.*	*à grandes fl.* Antill. s. ch. ♄
tournefortia serrata *L.*	
corymbosa *Desvaux, Journ. d'hist. nat.*	*corymbifère.* caracas. s. ch. ♄
monosperma *Jacq. H. sch.*	
TOURNEFORTIA	*TOURNEFORTIA*
lucida	*luisant.* Antilles. s. ch. ♄
volubilis *L.*	*sarmenteux.* Antill. s. ch. ♄
humilis *L.*	*nain.* Am. m. s. ch. ♄
scabra *Lamk. Ill.*	*rude.* Antilles. s. ch. ♄
hirsutissima *Swartz. Obs.*	*hérissé.* Antilles. s. ch. ♄
cymosa *Swartz. Obs.*	*à longs épis.* Antilles. s. ch. ♄
lævigata *Lamk. Ill.*	*lisse.* Antilles. s. ch. ♄
angulosa.	*anguleux.* s. ch. ♄
laurifolia *Vent. ch. de Pl.*	*à f. de Laurier.* Ant. s. ch. ♄
mutabilis *Vent. ch. de Pl.*	*à fl. changeantes.* Java. s. ch. ♄
MESSERSCHMIDIA	*MESSERSCHMIDIA*
arguzia *L. f.*	*herbacé.* sibérie. ♄
fruticosa *L. f.*	*arbrisseau.* canaries. or. ♄
angustifolia *Lamk. Ill.*	*à feuilles étroit.* canar. or. ♄
II. Fructus uni aut bicapsularis.	II. Une ou deux capsules.
ELLISIA	*ELLISIA*
nyctelea *L. Mant.*	*de Virginie.* ☉
HYDROPHYLLUM	*HYDROPHYLLE*
virginianum *L.*	*de Virginie.* ♄
canadense *L.*	*de Canada.* ♄
magellanicum *Lamk. Ill.*	*de Magellan.* ♆
DICHONDRA	*DICHONDRA*
caroliniensis *Mich. Fl.*	*de Caroline.* or. ♆
argentea *Willd. H. Ber.*	*argenté.* île de Fr. s. ch. ♆
CERINTHE	*MÉLINET*
major *L.*	*glabre.* F. ☉
glabra *Dec. syn.*	*rude.* F. ☉
aspera *Dec. syn.*	*à fleurs aiguës.* F. ♂
minor *L.*	
III. Fructus gymnospermus, faux corollæ nuda.	III. Quatre fruits distincts, entrée de la corolle nue.
HELIOTROPIUM	*HÉLIOTROPE*
peruvianum *L.*	*du Pérou.* or. ♄ (orn.)
grandiflorum.	*à grandes fl.* s. ch. ♄ (orn.)
indicum *L.*	*des Indes.* ☉

europæum *L.*
parviflorum *L. Mant.*
supinum *L.*
curassavicum *L.*

ECHIUM.

1. *Herbacea.*

vulgare *L.*
pyrenaicum *Desf. Atl.* }
italicum *L. Var. b.* }
australe *Lamk. Ill.*
violaceum *L. Mant.*
plantagineum *L. Mant.* }
creticum *Lamk. Ill.* }
prostratum.

2. *Fruticosa.*

giganteum *L. f.*
candicans *Jacq. Ic.*
strictum *Lamk. Ill.* }
virescens *Dec. Cat.* }
cynoglossoides.

LITHOSPERMUM
arvense *L.*
officinale *L.*
purpureo-cœruleum *L.*
distichum *Jacq. Fragm.*
tinctorium *Dec. Fl. Fr.*
Anchusa tinctoria *Lamk. Ill.* (non *Lin.*) }
fruticosum *L.*
tenuiflorum *L. f.*

PULMONARIA
officinalis *L.*
angustifolia *L.*
virginica *L.*
sibirica *L.*
maritima *L.*

ONOSMA
echioides *L.*

IV. Fructus gymnotetraspermus, faux corollæ instructa squamis.

SYMPHYTUM
officinale *L.*
tauricum *Willd. Enum.* }
orientale *Marsch. Cauc.* }
asperrimum *Marsch. Cauc.*

d'Europe. F. ☉ (méd.)
à petites fleurs. Inde. ☉
couché. F. ☉
de Curaçao. S. Ch. ♄

VIPERINE.

1. Tige herbacée.

commune. F. ♂ (méd.)
des Pyrénées. F. Or. ♂
à fleur rouge. Orient. ☉
violette. F. M. ☉
à feuill. de plantain. Italie. ☉
couchée. Égypte. Or. ♆

2. Tiges ligneuses.

gigantesque. Canaries. Or. ♄
blanchâtre. Canaries. Or. ♄
ramassée. Canaries. Or. ♄
à f. de cynoglosse. Canaries, Or. ♄

GRÉMIL
des champs. F. ☉
officinal. F. ☉
bleu-pourpre. F. ♄
distique. Or. ♆
des teinturiers. F. M. ♆
arbrisseau. F. M. Or. ♄
à petites fleurs. Égypte. ☉

PULMONAIRE
officinale. F. ♄ (méd.)
à feuilles étroites. F. ♆
de Virginie. ♄ (orn.)
de Sibérie. ♄
maritime. F. ☉

ONOSMA
à f. de viperine. F. ♂

IV. 4 fruits distincts, tube de la corolle couronné d'écailles.

CONSOUDE
officinale. F. ♄ (méd.)
d'Orient. ♆
à feuilles rudes. Caucase. ♄

LYCOPSIS	*LYCOPSIS*
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
ECHIOIDES	*ECHIOIDES*
nigricans *Desf. Atl.*	*à fleurs noires.* Italie. ☉
rubra *Desf. Atl.*	*à fleurs rouges.* Italie. ☉
grandiflora.	*à grandes fleurs.* ☉
MYOSOTIS	*MYOSOTIS*
arvensis *Willd. sp.*	*des champs.* F. ☉
palustris.	*des marais.* F. ♆
Lappula L.	*hérissé.* F. ☉
ANCHUSA	*BUGLOSE*
italica *Retz. obs.*	*officinale.* F. ♄ (méd.)
angustifolia L. ?	*à feuilles étroites.* Italie. ♄
ochroleuca *Marsch. cauc.*	*jaune-pâle.* Caucase. ♆
Barrelieri *Dec. Fl.* / Buglossum Barrelieri. *All. ped.*	*de Barrelier.* Alpes. ♆
tinctoria L.	*orcanette.* F. m. or. ♆
undulata L.	*ondulée.* F. m. or. ♆
Milleri *Willd. Enum.*	*de Miller.* Égypte. ☉
sempervirens L.	*toujours verte.* Esp. ♆
verrucosa *Lamk. Ill.* / Asperugo ægyptiaca L.	*tuberculeuse.* Égypte. ☉
laxiflora *Dec. syn.*	*à fleurs lâches.* Corse. ♄
BORAGO	*BOURRACHE*
officinalis L.	*officinale.* F. ☉ (méd.)
orientalis L.	*d'Orient.* ♄
indica L.	*des Indes.* ☉
africana L.	*d'Afrique.* ☉
ASPERUGO	*RAPETTE*
procumbens L.	*couchée.* F. ☉
CYNOGLOSSUM	*CYNOGLOSSE*
officinale L.	*officinale.* F. ♂ (méd.)
apenninum L.	*des Apennins.* ♂
montanum *Lamk. Ill.*	*des Alpes.* ♆
hispidum *Jacq. H. sch.* / canescens *Willd. Enum.* / parviflorum *Encycl. suppl.*	*à petites fleurs.* Inde. ☉
cheirifolium L.	*à feuilles de cheiri.* Orient. ♂
linifolium L.	*à feuilles de Lin.* Esp. ☉
nitidum *Willd. Enum.*	*luisante.* Portugal. ♆
omphalodes L.	*omphalodès.* F. ♆ (orn.)
RINDERA	*RINDÉRA*
tetraspis *Pallas. Itin.* / cynoglossum Rindera L. *f.*	*ailé.* Russie.
NOLANA	*NOLANA*
prostrata L.	*couché.* Pérou. or. ♂

ORDO X.

CONVOLVULACEÆ.

CONVOLVULUS.

1. *Caule volubili.*

arvensis *L.*
sepium *L.*
inflatus.
panduratus *L.*
farinosus *L. Mant.*
Batatas *L.*
nervosus *Lamk. Ill.*
canariensis *L.*
Jalapa *L. Mant.*
Ipomæa macrorhiza *Mich. Fl.*
althæoides *L.*
pentaphyllus *L.*
cairicus *L.*
dissectus *L. Mant.*
hermanniæ *l'Her. sert.*
crenatus *Jacq. Ic.*
fruticulosus *Lamk. Ill.*
sibiricus *L. Mant.*
ebracteatus *Lamk. Ill.*
siculus *L.*

2. *Caule non volubili.*

pentapetaloides *S. veg.*
evolvuloides *Desf. Atl.*
humilis *Jacq. coll.*
undulatus *Cav. Ic.*
lineatus *L.*
cneorum *L.*
oleæfolius *Lamk. Ill.*
scoparius *L. f.*
cantabrica *L.*
pilosellæfolius *Lamk. Ill.*
Dorycnium *L.*
tricolor *L.*
pes-capræ *L.*
soldanella *L.*
Falkia.

IPOMÆA

Quamoclit *L.*
coccinea *L.*

ORDRE X.

CONVOLVULACÉES.

LISERON.

1. Tige grimpante.

des champs. F. ♃
des haies. F. ♃
renflé. Am. S. ♆ (orn.)
sinué. Am. S. ♆
farineux. Madère. or. ♆
Patate. Antilles. s. ch. ♆ (alim.)
à nervures. Inde. s. ch. ♄
des Canaries. or. ♄
Jalap. Mexique. or. ♃ (méd.)
à f. de Guimauve. F. m. or. ♆
à cinq feuilles. Antilles. ☉
du Caire. or. ♃
découpé. Antilles. ☉
à feuill. d'Hermannia. Pérou, s. ch. ♆
fruticuleux. canaries. or. ♄
de Sibérie. ☉
sans bractées.
de Sicile. ☉

2. Tige non grimpante.

à 5 divisions. Italie. ☉
ondulé. Barbarie. ☉
rayé. F. m. or. ♃
satiné. orient. or. ♄
à feuilles d'olivier. or. ♄
effilé. canaries. or. ♄
à feuilles linéaires. F. ♃
à f. de Piloselle. orient. or. ♄
Dorycnium. orient. or. ♄
tricolore. Esp. ☉ (orn.)
Pied-de-chèvre. Inde. s. ch. ♃
soldanelle. F. ♆ (méd.)
de Falk. cap. or. ♆

IPOMÆA

Quamoclit. Inde. ☉ (orn.)
écarlate. Antilles. ☉

luteola *Jacq. ic.* — *jaune.* Antilles. ⊙
leucantha *Jacq. ic.* — *à fleurs blanches.* Am. m. ⊙
Bona-nox *L.* — *Bona-nox.* inde. s. ch. ⊙
tuberculosa. stipulacea *Jacq. h. sch.* convolvulus tuberculosus *Lamk. ill.* — *tuberculeux.* île de F. ♄
heterophylla *Jacq. Fragm.* — *à feuill. variabl.* cuba. s. ch. ♄
triloba *L.* — *à trois lobes.* Antilles. ⊙
hederacea *Jacq. ic.* — *à feuill. de Lierre.* Am. m. ⊙
nil. convolvulus nil *L.* ipomæa bicolor *Lamk. ill.* — *Nil.* Antilles. ⊙
purpurea *Lamk. ill.* convolvulus purpureus *L.* — *pourpre.* Antilles. ⊙ (orn.)

Evolvulus — *Evolvulus*
alsinoides *L.* — *à feuilles d'Alsiné.* inde. ⊙
linifolius *L.* — *à feuilles de Lin.* Antilles. ⊙

Cuscuta — *Cuscute*
europæa *L.* — *d'Europe.* F. ⊙

ORDO XI.

POLEMONIACEÆ.

Phlox — *Phlox*
suaveolens *H. K.* — *odorant.* Am. s. ♆ (orn.)
glaberrima *L.* — *glabre.* Am. s. ♄ (orn.)
paniculata *L.* — *paniculé.* Am. s. ♆ (orn.)
divaricata *L.* — *étalé.* Am. s. ♄ (orn.)
maculata *L. Mant.* — *tacheté.* Am. s. ♆ (orn.)
suffruticosa *Willd. Enum.* — *sous-arbrisseau.* Am. s. ♄ (orn.)
ovata *Bot. Mag.* — *ovale.* Am. s. ♄ (orn.)
subulata *L.* — *en alêne.* virginie. ♄
reptans *Mich. Fl.* — *rampant.* Am. s. ♄ (orn.)

Polemonium — *Polémoine*
cœruleum *L.* — *à fleurs bleues.* Eur. ♄ (orn.)
reptans *L.* — *rampante.* Am. s. ♄ (orn.)

Cantua — *Cantua*
ligustrifolia *Juss. Ann.* periphragmos fœtidus *Fl. pér.* vestia lycioides *Willd. Enum.* — *à f. de Troëne.* Pérou. s. ch. ♄

Bonplandia — *Bonplandia*
geminiflora *Cav. ic.* caldasia heterophylla *Willd. H. Ber.* — *à fleurs géminées.* N. Esp. or. ♄

Cobæa — *Cobéa*
scandens *Cav. ic.* — *grimpant.* Mexiq. or. ♄ (orn.)

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

Chelone
glabra *L.*
obliqua *willd. sp.*
barbata *cav. ic.*

Pentstemon
lævigata *willd. sp.*
pubescens *willd. sp.*
chelone pentstemon *L. mant.*
campanulata *willd. sp.*
chelone campanulata *cav. ic.*

Sesamum
orientale *L.*

Bignonia.

1. *Foliis simplicibus.*

catalpa *L.*
catalpa syringifolia *H. K.*
Quercus *Encycl.*
longissima *willd. sp.*
catalpa longissima *H. K.*
sempervirens *L.*

2. *Foliis conjugatis.*

unguis-cati *L.*
pseudo-unguis.
capreolata *L.*
crucigera *L.*
paniculata *vahl. symb.*

3. *Foliis digitatis.*

triphylla *L.* ?
pentaphylla *L.*

4. *Foliis pinnatis.*

grandiflora *Andr. rep.*
radicans *L.*
stans *L.*
pandorea *Andr. rep.*
australis *Brown. prodr.*
chelonoides *L. f.* ?

Martynia
proboscidea *willd. sp.*

ORDRE XII.

BIGNONES.

Chéloné
glabre. Am. s. ♈
oblique. virginie. ♅
barbue. mexique. or. ♅ (orn.)

Pentstémon
à feuilles lisses. Am. s. or. ♎
pubescent. Am. s. or. ♎
campanulé. mexiq. or. ♎ (orn.)

Sésame
d'Orient. ☉ (écon.)

Bignone.

1. Feuilles simples.

catalpa. Am. s. ♄ (orn.)
à f. de chêne. Antill. s. ch. ♄
toujours verte. Am. s. or. ♄

2. Feuilles conjuguées.

à griffes. Antilles. s. ch. ♄
Fausse-griffe. Antill. s. ch. ♄
à vrilles. Antilles. s. ch. ♄
crucifère. Am. s. or. ♄
paniculée. Antilles. s. ch. ♄

3. Feuilles digitées.

trifoliée. Antilles. s. ch. ♄
à 5 feuilles. Antilles. s. ch. ♄

4. Feuilles pennées.

à grand. fl. chine. or. ♄ (orn.)
grimpante. Am. s. ♄ (orn.)
droite. Antilles. s. ch. ♄
Pandorea. île Norfolk. or. ♄
Faux-chéloné. inde. s. ch. ♄

Martynia
à longues cornes. Ant. ☉ (orn.)

angulosa *encycl.*
diandra *jacq. h. sch.*
perennis L.
gloxinia maculata *l'her. stirp.*

anguleux. mexique. ⊙ (orn.)

vivace. Antilles. s. ch. ♆

ORDO XIII.

GENTIANEÆ.

I. Capsula simplex unilocularis.

GENTIANA.

1. *Corollis 5 fidis, subcampanulatis.*

lutea L.
asclepiadea L.
pneumonanthe L.
acaulis L.
amarella L.

2. *Corollis 4 fidis.*

campestris L.
cruciata L.

SWERTIA
perennis L.

CHLORA
perfoliata *s. veg.*

II. Capsula simplex, bilocularis.

CHIRONIA
decussata *vent. h. cels.*
frutescens L.
linoides L.
baccifera L.
centaurium *willd. sp.*
gentiana centaurium L.
— minus.
filiformis.
gentiana filiformis L.
exacum filiforme *smith. fl.*

SAROTHRA
gentianoides L.

VILLARSIA
ovata *vent. ch. de pl.*
menyanthes ovata L. *f.*
nymphoides *vent. ch. de pl.*
menyanthes nymphoides L.

ORDRE XIII.

GENTIANÉES.

I. Une capsule à une loge.

GENTIANE.

1. Corolle presque en cloche, à 5 divisions.

jaune. Alpes. ♆ (méd.)
à feuill. d'asclépias. Alpes. ♆
pneumonanthé. f. ♄
sans tige. Alpes. ♆ (orn.)
amarella. f. ⊙

2. Corolle à 4 divisions.

des champs. f. ⊙
croisette. f. ♆

SWERTIA
vivace. f. ♆

CHLORA
perfolié. f. ⊙

II. Capsule simple, à 2 loges.

CHIRONIA
à feuill. en croix. cap. or. ♄
arbrisseau. cap. or. ♄ (orn.)
à feuilles de lin. cap. or. ♄
baccifère. cap. or. ♄
petite-centaurée. f. ⊙ (méd.)
— *naine.*
filiforme. f. ⊙

SAROTHRA
filiforme. am. s. ⊙

VILLARSIA
ovale. cap. or. ♆
à feuilles de nymphea. f. ♆

SPIGELIA
anthelmia L.
marylandica S. Veg.

SPIGELIA
Anthelmia. Antilles. ☉
de Maryland. or. ♄

ORDO XIV.

APOCYNEÆ.

I. Germina 2, *fructus bifollicularis, semina absque pappo.*

VINCA
major L.
minor L.
herbacea *Wald. et Kitt. Hung.*
rosea L.

TABERNÆMONTANA
angustifolia *Willd. sp.*
Amsonia L.
citrifolia L.
nervosa.

CAMERARIA
latifolia L.

PLUMIERA
rubra L.
alba L.

II. Germen duplex, fructus bifollicularis, semina papposa.

NERIUM
oleander.
— album.
odorum *Willd. sp.*
grandiflorum.
coronarium *Jacq. ic.*

STAPELIA
hirsuta L.
grandiflora *Mass. Stap.*
Asterias *Mass. Stap.*
cæspitosa *Mass. Stap.*
papillosa *Dec. pl. gr.*
variegata L.
reticulata *Mass. Stap.*

PERIPLOCA
græca L.
angustifolia *Bill. Dec.*

APOCYNUM
androsæmifolium L.

ORDRE XIV.

APOCYNÉES.

I. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines sans aigrette.

PERVENCHE
grande. F. ♄ (méd.)
petite. F. ♄
herbacée. Hongrie. ♆
rose. Inde. s. ch. ♄

TABERNÉMONTANA
à feuilles étroites. Am. s. ♄
Amsonia. Am. s. ♄
à f. de citronnier. Ant. s. ch. ♄
à grosses nerv. Antill. s. ch. ♄

CAMÉRARIA
à larg. feuill. Antill. s. ch. ♄

PLUMIÉRA
rouge. Antilles. s. ch. ♄ (orn.)
blanc. Antilles. s. ch. ♄ (orn.)

II. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines aigrettées.

NÉRIUM
Laurier-rose F. m. or. ♄ (orn.)
— *à fleurs blanches.*
odorant. Inde. or. ♄ (orn.)
à grande fleur. or. ♄ (orn.)
à bouquets. Inde. s. ch. ♄ (orn.)

STAPÉLIA
velu. cap. s. ch. ♄
à grandes fleurs. cap. s. ch. ♄
Astérias. cap. s. ch. ♄
touffu. cap. s. ch. ♄
mameloné. cap. s. ch. ♄
panaché. cap. s. ch. ♄
à réseau. cap. s. ch. ♄

PÉRIPLOCA
de Grèce. ♆
à f. étroites. orient. or. ♄

APOCIN
à f. d'Androsème. Am. s. ♆

cannabinum L.	*à fleurs vertes.* Am. s. ♄
hypericifolium *Willd. sp.*	*à f. d'hypéricum.* Am. s. ♄
venetum L.	*denté.* italie. ♆
CYNANCHUM	*CYNANCHUM*
prostratum *cav. ic.*	*couché.* mexique. s. ch. ♆
acutum L.	*aigu.* F. ♄
monspeliacum L.	*de Montpellier.* or. ♆
caroliniense *Jacq. ic.*	*de Caroline.* or. ♄
macrophyllum (*an* generis?).	*à grandes feuilles.* s. ch. ♄
erectum L.	*à tige droite.* syrie. ♄
mauritianum *Encycl.*	*de l'île de France.* s. ch. ♄
ASCLEPIAS	*ASCLÉPIAS*
vincetoxicum L.	*dompte-venin.* F. ♄ (méd.)
nigra L.	*noir.* F. ♆
nivea L.	*blanc.* Am. s. or. ♄
curassavica L.	*de Curaçao.* s. ch. ♄
incarnata L.	*incarnat.* Am. s. ♄
tuberosa L.	*tubéreux.* Am. s. or. ♄
amœna L.	*rose.* Am. s. ♄
linaria *cav. ic.*	*à f. de Linaire.* or. ♆
angustifolia *Willd. H. Ber.*	*à f. étroites.* Mexique? s. ch. ♄
mexicana *cav. ic.*	*du Mexique.* s. ch. ♆
carnosa *Bot. Mag.*	*charnu.* chine. s. ch. ♄
fruticosa L.	*arbrisseau.* Tunis. or. ♄
syriaca L.	*à la ouate.* Am. s. ♆
arborescens L. *Mant.*	*arbre.* cap. s. ch. ♄
III. Germen simplex, fructus baccatus aut rariùs capsularis.	III. Ovaire simple, une baie ou plus rarement une capsule.
ALLAMANDA	*ALLAMANDA*
cathartica L. *Mant.*	*cathartique.* caïenne. s. ch. ♄
verticillata.	*verticillé.* s. ch. ♄
RAUWOLFIA	*RAUWOLFIA*
nitida L.	*à f. luisantes.* Antill. s. ch. ♄
glabra *cav. ic.*	*glabre.* N. Esp. s. ch. ♄
OPHIOXYLON	*OPHIOXYLON*
serpentinum L.	*noix-de-serpent.* inde. s. ch. ♄
CERBERA	*CERBERA*
thevetia L.	*thévétia.* Antilles. s. ch. ♄
manghas L.	*manghas.* inde. s. ch. ♄
ARDUINIA	*ARDUINIA*
bispinosa *Willd. sp.*	*bifurqué.* cap. s. ch. ♄
THEOPHRASTA	*THÉOPHRASTA*
americana L.	*d'Amérique,* Antilles. s. ch. ♄

ORDO XV.

SAPOTÆ.

SIDEROXYLUM
melanophleos *L. Mant.*
laurifolium *Encycl.*
atrovirens *Encycl.*
mastichodendrum *Jacq. coll.*
BUMELIA salicifolia *Swartz. prodr.*
lycioides *L.*
tenax *L. Mant.*
BUMELIA tenax *Willd. sp.*

CHRYSOPHYLLUM
glabrum *L.*
cainito *L.*
argenteum *Jacq. Am.*

ACHRAS
sapota *L.*

MYRSINE
africana *L.*
retusa *Vent. H. cels.*

ORDRE XV.

SAPOTILLIERS.

SIDÉROXYLUM
à f. de Laurier. Inde. s. ch. ♄
vert-sombre. Am. m. s. ch. ♄
à f. de Saule. Antill. s. ch. ♄
à feuilles de Lycium. Am. s. ♄
satiné. Caroline. or. ♄

CAIMITIER
glabre. Antilles. s. ch. ♄
cainito. Antilles. s. ch. ♄
argenté. Antilles. s. ch. ♄

SAPOTILLIER
cultivé. Ant. s. ch. ♄ (alim.)

MYRSINÉ
d'Afrique. Cap. or. ♅
à feuill. obtuses. Açores. or. ♄

CLASSIS IX.

CLASSE IX.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(Corolla perigyna.)

(Corolle attachée au calice.)

ORDO I.

GUAIACANÆ.

DIOSPYROS
ebenum *Encycl.*
virginiana *L.*
LOTUS *L.*
KAKI *L. f.*

ORDRE I.

PLAQUEMINIERS.

PLAQUEMINIER
ébénier. Ile de Fr. s. ch. ♄ (écon.)
de Virginie. ♄
Lotos. Orient. ♄
Kaki. Japon. ♄ (écon.)

hirsuta *desf. Ann.*
royena hirsuta *L.*
lycioides *desf. Ann.*

velu. cap. or. ♄
à feuill. de lycium. cap.? or. ♄

ROYENA
lucida *L.*

ROYÉNA
luisant. cap. or. ♄

VISNEA
mocanera *L. f.*

VISNÉA
mocanéra. canaries. or. ♄

STYRAX
officinale *L.*
lævigatum *cav. diss.*
grandifolium *Willd. sp.*

STYRAX
officinal. F. m. ♄ (méd.)
glabre. Am. s. ♄
à grand. feuill. carol. or. ♄

HALESIA
tetraptera *L.*

HALÉSIA
à 4 ailes. Am. s. ♄ (orn.)

HOPEA
tinctoria *L. Mant.*
symplocos tinctoria *Willd. sp.*

HOPÉA
des teinturiers. caroline. ♄

ORDO II.

RHODODENDRA.

KALMIA
latifolia *L.*
angustifolia *L.*
glauca *H. K.*

RHODODENDRON
ferrugineum *L.*
hirsutum *L.*
chamæcistus *L.*
minus *Mich. Fl.*
punctatum *Vent. H. cels.*
maximum *L.*
ponticum *L.*

AZALEA
viscosa *L.*
glauca *L.*
nudiflora *L.*
pontica *L.*
procumbens *L.*

RHODORA
canadensis *L.*

LEDUM
palustre *L.*
latifolium *Encycl.*
thymifolium *Encycl.*

ORDRE II.

ROSAGES.

KALMIA
à larges feuill. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. étroit. Am. s. ♄ (orn.)
glauque. Am. s. ♄ (orn.)

RHODODENDRON
ferrugineux. Alpes. ♄ (orn.)
velu. Alpes. ♄ (orn.)
à feuill. de ciste. Autriche. ♄
ponctué. Am. s. ♄ (orn.)
d'Amérique. Am. s. ♄ (orn.)
de Pont. ♄ (orn.)

AZALÉA
visqueux. Am. s. ♄ (orn.)
glauque. Am. s. ♄ (orn.)
à fleurs nues. Am. s. ♄ (orn.)
de Pont. ♄ (orn.)
couché. Alpes. ♄

RHODORA
de Canada. ♄

LÉDUM
des marais. Alpes. ♄ (écon.)
à larges feuill. Am. s. ♄
à feuill. de thym. Am. s. ♄

Befaria	*Béfaria*
paniculata *Mich. Fl.* Bejaria racemosa *Vent. H. cels.*	*paniculé.* Am. s. ♄
Menziezia	*Menziézia*
poliifolia *Juss. Ann.* erica baboecii *L.*	*à feuilles de* polium. F. ♄
Itea	*Itéa*
virginica *L.*	*de Virginie.* Am. s. ♄ (orn.)

ORDO III.

ERICÆ.

1. *Antheræ aristatæ.*

a. *Foliis ternis.*

viridi-purpurea *L.*

b. *Foliis quaternis.*

arborea *L.*
Tetralix *L.*
abietina *L.*

c. *Foliis senis.*

mammosa *L.*

2. *Cristatæ.*

a. *Foliis oppositis.*

vulgaris *L.*

b. *Foliis ternis.*

scoparia *L.*
cinerea *L.*
australis *L. Mant.*

c. *Foliis quaternis.*

baccans *L.*

3. *Muticæ.*

a. *Foliis ternis.*

ciliaris *L.*
versicolor. *Andr. Rep.*

b. *Foliis quaternis aut pluribus.*

curviflora *L.*
tubiflora *L.*
simpliciflora *Willd. sp.*
cerinthoides *L.*
conspicua *H. K.*
mediterranea *L.*
multiflora *L.*

ORDRE III.

BRUYÈRES.

1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles ternées.

vert-pourpre. portugal. ♄

b. Feuilles quatre à quatre.

en arbre. F. m. or. ♄
Tétralix. F. ♄
à feuill. de sapin. cap. or. ♄

c. Feuilles six à six.

mamelonée. cap. or. ♄

2. Anthères en crête.

a. Feuilles opposées.

commune. F. ♄

b. Feuilles ternées.

à balais. F. ♄
cendrée. F. ♄
australe. F. m. or. ♄

c. Feuilles quatre à quatre.

globuleuse. cap. or. ♄

3. Anthères sans appendice.

a. Feuilles ternées.

ciliée. F. ♄
bigarrée. cap. or. ♄

b. Feuilles quatre à quatre ou en plus grand nombre.

à fleurs courbes. cap. or. ♄
tubulée. cap. or. ♄
à fleurs simples. cap. or. ♄
à fl. de Mélinet. cap. or. ♄
remarquable. cap. or. ♄
de la Méditerranée. F. m. or. ♄
à fl. nombreuses. F. m. or. ♄

vagans L.	*étalée.* F. m. or. ♄
herbacea *Willd. sp.* / carnea L.	*précoce.* suisse. ♄
CYRILLA	*CYRILLA*
racemiflora L.	*à grappes.* caroline. ♄
ANDROMEDA	*ANDROMÉDA*
mariana L.	*de Maryland.* Am. s. ♄ (orn.)
nitida *Mich. fl.* / lucida *Encycl.* / coriacea *H. K.*	*luisant.* Am. s. ♄
axillaris *H. K.*	*axillaire.* Am. s. ♄
cassinefolia *Vent. H. cels.* / speciosa *Mich. fl.*	*à feuill. de cassiné.* Am. s. ♄
pulverulenta *Vent. Malm.*	*pulvérulent.* Am. s. ♄
paniculata L.	*paniculé.* Am. s. ♄
racemosa L.	*à grappes.* Am. s. ♄
arborea L.	*en arbre.* Am. s. ♄
caliculata L.	*caliculé.* Am. s. ♄
crispa.	*crépu.* Am. s. ♄
ferruginea L. *f.*	*ferrugineux.* Am. s. ♄
polifolia L.	*à feuill. de polium.* Am. s. ♄
— angustifolia.	— *à feuilles étroites.*
— latifolia.	— *à larges feuilles.*
ARBUTUS	*ARBOUSIER*
unedo L.	*des Pyrénées.* or. ♄ (orn.)
Andrachne L.	*Andrachné.* orient. or. ♄ (orn.)
uva-ursi L.	*Busserole.* Alpes. ♄ (méd.)
alpina L.	*des Alpes.* ♄
CLETHRA	*CLÉTHRA*
alnifolia L.	*à feuill. d'Aune.* Am. s. ♄ (orn.)
— pubescens.	— *pubescent.*
arborea *H. K.*	*arbre.* canaries. or. ♄
PYROLA	*PYROLE*
rotundifolia L.	*à feuilles rondes.* F. ♆
minor L.	*petite.* F. ♆
maculata L.	*maculée.* Am. s. ♄
EPIGÆA	*EPIGÉA*
repens L.	*rampant.* Am. s. ♄
GAULTHERIA	*GAULTHÉRIA*
procumbens L.	*de Canada.* Am. s. ♄
VACCINIUM	*MYRTILLE*
myrtillus L.	*Lucet.* F. ♄
pensylvanicum *Encycl.*	*de Pensylvanie.* ♄
uliginosum L.	*des marais.* F. ♄

vitis-idea *L.*
stamineum *L.*
amœnum *H. K.*
disomorphum *Mich. Fl.*
macrocarpon *H. K.*
oxycoccos *L.*

ponctué. Alpes. ♄ (méd.)
à longues étamines. Am. s. ♄
corymbifère. Am. s. ♄
à gros fruit. Am. s. ♄
canneberge. F. ♄

STYPHELIA
daphnoides *smith. N. Holl.*
Lissanthe daphnoides *Brown. prodr.*
Gnidium *Vent. Malm.*
Leucopogon lanceolatus *Brown. prodr.*

STYPHÉLIA
à f. de Daphné. N. Holl. or. ♄
gnidium. N. Holl. or. ♄

EMPETRUM
nigrum *L.*

EMPÉTRUM
à fruit noir. Alpes. ♄

ORDO IV.

CAMPANULACEÆ.

I. Antheræ distinctæ.

ORDRE IV.

CAMPANULACÉES.

I. Anthères distinctes.

MICHAUXIA
campanuloides *l'Her. N. Gen.*

MICHAUXIA
à fruit rude. syrie. or. ♂

CANARINA
campanulata *L. Mant.*

CANARINE
campaniforme. madère. or. ♄

CAMPANULA.

1. *Foliis lævibus; calicis sinubus non deflexis.*

uniflora *L.*
hederacea *L.*
rotundifolia *L.*
carpatica *L. f.*
Rapunculus *L.*
persicifolia *L. sp. ed. 1ª.*
obliqua *Jacq. H. Sch.*
pyramidalis *L.*
lilifolia *L.*
grandiflora *L. f.*
gentianoides *Lamk. Ill.*
rhomboidalis *L.*
verticillata *L. f.*

CAMPANULE.

1. Feuilles lisses; sinus du calice non abaissés.

à une fleur. Alpes. ♄
à feuilles de Lierre. F. ♆
à feuilles rondes. F. ♄
des monts Krapac. ♆ (orn.)
Raiponce. F. ♃ (alim.)
à feuilles de Pêcher. F. ♄
oblique. ♂
Pyramidale. F. ♂ (orn.)
à feuilles de Lis. sibérie. ♆
à grandes fleurs. sibérie. ♆
rhomboïdale. F. ♄
verticillée. Russie. ♄

2. *Foliis asperis; sinubus calicis non deflexis.*

rhutenica *Marsch. Cauc.*

2. Feuilles rudes; sinus du calice non réfléchis.

de Russie. ♄

latifolia L.	*à larges feuilles.* Alpes. ♆
trachelium L.	*Gantelée.* F. ♄
rapunculoides L.	*fausse raiponce.* F. ♄
bononiensis L.	*de Bologne.* Italie. ♆
glomerata L.	*agglomérée.* F. ♆
petræa L.	*des rochers.* Mont Baldo. ♄
thyrsoidea L.	*en thyrse.* Alpes. ♂.
tomentosa *Lamk. Ill.*	*cotonneuse.* orient. or. ♄
peregrina L.	*hérissée.* orient. or. ♂
lanuginosa *Lamk. Ill.*	
erinus L.	*érine.* F. ☉
3. *Sinubus calicis deflexis.*	3. Sinus du calice abaissés.
laciniata L.	*laciniée.* crète. or. ♄
caucasica *Marsch. cauc.*	*du Caucase.* ♄
betonicæfolia *Marsch. cauc.*	*à feuilles de Bétoine.* cauc. ♆
lingulata *Wald. et Kitt.*	*de Hongrie.* ♂
medium L.	*des jardins.* F. ♂ (orn.)
longifolia *Lapeyr. Fl.*	*à long. f.* Pyrénées. ♆ (orn.)
barbata L.	*barbue.* Alpes. ♆
spicata L.	*à épis.* Alpes. ♂
sibirica L.	*de Sibérie.* ♂
4. *Capsulis columniferis aut prismaticis.*	4. Capsules en colonne ou prismatiques.
speculum L.	*miroir de Vénus.* F. ☉ (orn.)
hybrida L.	*hybride.* F. ☉
perfoliata L.	*perfoliée.* Am. s. ☉
5. *Caule fruticoso.*	5. Tige ligneuse.
aurea L. *f.*	*jaune.* canaries. or. ♄
TRACHELIUM	*TRACHELIUM*
cœruleum L.	*à fl. bleues.* Alger. or. ♆ (orn.)
GESNERIA	*GESNÉRIA*
tomentosa L.	*cotonneux.* Antilles. s. ch. ♄
PHYTEUMA	*PHYTEUMA*
canescens *Wald. et Kitt. Hung.*	*blanchâtre.* Hongrie. ♆
spicata L.	*en épi.* F. ♆
orbicularis L.	*orbiculaire.* F. ♆
hemisphærica L.	*hémisphérique.* F. ♄
pinnata L.	*à feuill. pennées.* orient. or. ♆
II. Antheræ connatæ.	II. Anthères réunies.
LOBELIA	*LOBÉLIA*
fulgens *Willd. Enum.*	*éclatant.* mexique. or. ♄ (orn.)
surinamensis L.	*de Surinam.* s. ch. ♆
longiflora L.	*à longues fleurs.* Antilles. s. ch. ♆ (vénén.)

cardinalis L.
syphilitica L.
inflata L.
cliffortiana L.
urens L.
triquetra L. *Mant.*
Laurentia L.
Erinus L.
pubescens *Jacq. H. Sch.*
minuta L. *Mant.*

cardinale. Am. s. ♃ (orn.)
syphilitique. Am. s. ♆ (méd.)
renflé. Am. s. ☉
de Cliffort. Antilles. s. ch. ☉
brûlant. F. ☉
triangulaire. cap. or. ♂
à longs pédoncules. Italie. ☉
à feuilles d'Érine. cap. ☉
pubescent. cap. or. ♆
nain. Corsè. or. ♆

Goodenia
ovata *smith. soc. Linn.*
grandiflora *Bot. Mag.*
lævigata *Bot. Mag.*

Goodénia
à feuill. ovales. N. Holl. or. ♃
à grandes fleurs. N. Holl. or. ♃
lisse. N. Holl. or. ♆

Jasione
montana L.

Jasioné
de montagne. F. ♂

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(Corolla pistillo imposita; antheræ connatæ.)

ORDO I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum nudum; semen absque pappo.

Lampsana
communis L.
— crispa.
lyrata *willd. Enum.*

Rhagadiolus
stellatus *willd. sp.* } Lampsana stellata L.
lampsanoides. } edulis *willd. sp.* } Lampsana rhagadiolus L.
Kolpinia. } Lampsana Kolpinia L. *f.*

CLASSE X.

DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil ; anthères réunies.)

ORDRE I.

SEMIFLOSCULEUSES.

I. Réceptacle nu ; graines sans aigrette.

Lampsane
commune. F. ☉
— crépue.
en lyre. Mer casp. ♃

Rhagadiole
étoilée. orient. ☉
comestible. F. ☉
Kolpinia. Tartarie. ☉

II. Receptaculum nudum ; semen papposum.

PRENANTHES
muralis L.
hispida *Willd. sp.*
viminea L.
purpurea L.
pinnata L. *f.*

CHONDRILLA
juncea L.

LACTUCA
perennis L.
tenerrima *Willd. sp.*
saligna L.
sagittata *Wald. et Kitt. hung.*
virosa L.
— laciniata.
maculata *Horn.*
scariola L.
— sanguinea.
sativa L.
— romana.
— capitata.
— crispa.
intybacea *Jacq. ic.*
spinosa *Desf. Atl.*
prenanthes spinosa *Willd. sp.*

SONCHUS
fruticosus *l'Her. stirp.*
pinnatus *H. K.*
congestus *Decand. cat.*
broussonetii ?
macranthos *Encycl. suppl.*
tataricus L. *Mant.*
macrophyllus *Willd. sp.*
plumieri L.
alpinus L.
floridanus L.
multiflorus.
racemosus *Encycl.*
oleraceus L.
— asper.
lacerus *Willd. Enum.*
divaricatus *Desf. Ann.*
chondrilloides *Desf. Atl.*
tenerrimus L.

II. Réceptacle nu ; graine couronnée d'une aigrette.

PRÉNANTHES
des murailles. F. ♂
hérissé. sibérie. ♆
effilé. F. ♄
pourpre. Alpes. ♄
penné. canaries. or. ♄

CONDRILLE
jonciforme. F. ♆

LAITUE
vivace. F. ♆
glauque. F. ♆
lancéolée. F. ☉
sagittée. hongrie. ♂
vireuse. F. ☉
— laciniée.
maculée. ☉
Escariole. F. ☉
— pourpre.
cultivée. ☉ (alim. méd.)
— romaine.
— pommée.
— crépue.
à tige nue. Antilles. ☉
épineuse. barbarie. or. ♄

LAITRON
arbrisseau. canaries. or. ♄
penné. madère. or. ♄
aggloméré. canaries. or. ♄
de Tartarie. ♆
à grandes feuilles. Am. s. ♆
de Plumier. Alpes. ♆
des Alpes. ♄
de la Floride. Am. s. ♂
à fleurs nombreuses. ☉
commun. ☉
— rude.
lacéré. ☉
étalé. Égypte. or. ♄
à tige de condrille. barb. ♆
lacinié. F. ☉

palustris L. — *des marais.* F. ♆
arvensis L. — *des champs.* F. ☉
uliginosus *marsch. cauc.* — *aquatique.* caucase ☉
maritimus L. — *maritime.* F. ♄

HIERACIUM. — *EPERVIÈRE.*

1. *Caule folioso.* — 1. Tige feuillue.

fruticosum *willd. sp.* — *arbrisseau.* Madère? or. ♄
umbellatum L. — *ombellifère.* F. ♄
sabaudum L. — *de Savoie.* F. ♄
— maculatum. — *tachetée.*
— latifolium. — *à larges feuilles.*
blattarioides L. — *à feuill. de blattaire.* Alpes. ♆
amplexicaule L. — *amplexicaule.* Alpes. ♄
villosum L. — *velue.* Alpes. ♆
grandiflorum *wald. et kitt. hung.* / pappoleucum *vill. delph.* — *à grandes fleurs.* Alpes. ♆
prostratum. — *couchée.* ♆
eriophorum *dec. syn.* — *lanugineuse.* F. ♄
lanatum *wald. et kitt. hung.* — *laineuse.* Hongrie. ♆
glaucum *All. ped.* — *glauque.* Alpes. ♄
lævigatum *willd. h. ber.* — *lisse.* ♄
nigrescens *willd. h. ber.* — *à graines noires.* ♆
alpinum L. — *des Alpes.* ♄
intybaceum *jacq. austr.* / albidum *vill. delph.* / tubulosum *encycl.* — *tubulée.* Alpes. ♄
paludosum L. — *des marais.* Alpes. ♄
lampsanoides *gouan. ill.* — *à f. de Lampsane.* Pyrénées. ♄
prenanthoides L. — *à f. de Prénanthes.* Alpes. ♆
globosum. — *globuleuse.* ♆
jacquini *vill. delph.* / pumilum *jacq. austr.* / humile *willd. sp.* — *de Jacquin.* Alpes. ♄
murorum L. — *des murailles.* F. ♄
sylvaticum *willd.* — *des bois.* F. ♆
prunellæfolium *All. péd.* / pumilum L. *mant.* — *à feuill. de Brunelle.* Alpes. ♆
porrifolium L. — *à feuill. de Poireau.* Alpes. ♄
echioides *wald. et kitt. hung.* — *hérissée.* Hongrie. ♄

2. *Caule nudo multifloro.* — 2. Tige nue à plusieurs fleurs.

aurantiacum L. — *couleur de feu.* Alpes. ♄ (orn.)
florentinum *willd. sp.* — *de Florence.* ♆
piloselloides *vill. delph.* — *à feuill. de Piloselle.* Alpes. ♄
cymosum L. — *corymbifère.* Alpes. ♄.

repens. — *rampante.* ♃
auricula L. } dubium L. } — *auriculée.* F. ♃

3. *Caule nudo unifloro.* — 3. Tige nue à une fleur.

PILOSELLA L. — *piloselle.* F. ♆
aureum *Willd. sp.* } LEONTODON aureum L. } — *orangée.* Alpes. ♆
bulbosum *Willd. sp.* } LEONTODON bulbosum L. } — *bulbeuse.* F. ♆

CREPIS — *CRÉPIS*

sibirica L. } HIERACIUM sibiricum *Willd. sp.* } — *de Sibérie.* ♃
parviflora. — *à petites fleurs.* orient. ☉
coronopifolia *Desf. Atl.* — *à f. de corne-de-cerf.* barb. ☉
albida *Vill. Delph.* — *blanc.* Alpes. ♃
alpina L. — *des Alpes.* ☉
rubra L. — *rouge.* F. ☉ (orn.)
pauciflora. — *à fleurs rares.* Égypte. ☉
nemausensis *Gouan. Ill.* } ANDRYALA nemausensis *Vill. Delph.* } — *à tige nue.* F. ☉
fœtida L. — *fétide.* F. ☉
pulchra L. } prenanthes hieraciifolia *Willd. sp.* } — *à feuill. de* LAMPSANE. F. ☉
hispida *Wald. et Kitt. Hung.* — *hérissé.* Hongrie. ☉
DIOSCORIDIS *Thuil. Fl.* (non L.) — *de Dioscoride.* F. ☉
patula. — *étalé.* ☉
tectorum L. } virens *Vill. Delph.* } — *des toits.* F. ☉
biennis L. — *bisannuel.* F. ♂
taurinensis *Willd. sp.* } BARKHAUSIA taraxacifolia *Dec. Fl.* } — *de Turin.* F. ☉
rigida *Wald. et Kitt. Hung.* — *roide.* Hongrie. ♃
aspera L. — *piquant.* orient. ☉

DREPANIA — *DRÉPANIA*

barbata. } crepis barbata L. } — *barbu.* F. m. ☉
— pallida. — *—à fleurs pâles.*

HYOSERIS. — *HYOSÉRIS.*

1. *Caule ramoso.* — 1. Tige rameuse.

HEDYPNOIS L. — *dormeuse.* F. ☉
RHAGADIOLOIDES L. — *Rhagadiole.* F. ☉
cretica L. — *de Crète.* ☉

2. *Caule nudo simplici.* — 2. Tige nue simple.

radiata L. — *rayonnée.* F. ⊙
lucida L. *mant.* — *luisante.* orient. ♂
scabra L. — *rude.* italie. ⊙
fœtida *gouan. monsp.* / LAMPSANA fœtida *willd. sp.* — *fétide.* F. ⊙
minima L. / LAMPSANA minima *dec. fl.* — *petite.* F. ⊙
taraxacoides *vill. delph.* / TRINCIA hispida *dec. fl.* — *commune.* F. ♆

ZACINTHA
verrucosa *willd. sp.* / LAMPSANA zacintha L. — *ZACINTHA tuberculeux.* orient. ⊙

TARAXACUM
DENS-LEONIS *desf. atl.* / LEONTODON TARAXACUM L. — *TARAXACUM dent-de-lion.* F. ♃
obovatum. / LEONTODON obovatus *willd. sp.* — *ovale renversé.* ESP. ♃
palustre *dec. syn.* — *des marais.* F. ♆

APARGIA
alpina *willd. sp.* / LEONTODON pyrenaicum *gouan. ill.* — *APARGIA des Alpes.* ♃
autumnalis *willd. sp.* / LEONTODON autumnale L. — *d'automne.* F. ♃
hastilis *willd. sp.* / LEONTODON hastile L. — *lancéolé.* F. ♆
hispida *willd. sp.* / LEONTODON hispidum L. — *hérissé.* F. ♃
crispa *willd. sp.* / LEONTODON crispum *vill. delph.* — *crépu.* F. ♃

PICRIS
hieracioides L. — *PICRIS épervière.* F. ♂
sprengeriana. / HIERACIUM sprengerianum L. — *de Sprenger.* F. ⊙
integrifolia. — *à feuilles entières.* ⊙
globulifera. / CREPIS dioscoridis *dec. ic.* — *globuleux.* F. ⊙

HELMINTIA
echioides *willd. sp.* / PICRIS echioides L. — *HELMINTIA hérissé.* F. ⊙

SCORZONERA
hispanica L. — *SCORSONÈRE d'Espagne.* ♂ (alim.)

angustifolia *L.*	*à feuilles étroites.* F. ♆
austriaca *Willd. sp.*	*d'Autriche.* ♆
humilis *L.*	*petite.* F. ♆
laciniata *L.*	*laciniée.* F. ♂
calcitrapifolia *Vahl. symb.*	*à f. de chausse-trape.* orient. ☉
villosa *Scop. carn.*	*velue.* carniole. ♂
eriosperma *Willd. sp.*	*laineuse.* F. m. ♄
PICRIDIUM	*PICRIDIUM*
vulgare *Desf. Atl.* / scorzonera picroides *L.* / sonchus picroides *Willd. sp.*	*commun.* F. ☉ (alim.)
tingitanum *Desf. Atl.* / scorzonera tingitana *L.* / sonchus tingitanus *Willd. sp.*	*de Tanger.* ☉
TRAGOPOGON	*CERCIFIX*
pratensis *L.*	*des prés.* F. ♂ (alim.)
major *Jacq. Austr.*	*élevé.* Autriche. ☉
undulatus *Jacq. ic.*	*ondulé.* orient. ♂
mutabilis *Jacq. ic.*	*à fl. changeantes.* sibérie. ♂
porrifolius *L.*	*à feuilles de poireau.* F. ♂
crocifolius *L.*	*à feuilles de safran.* F. m. ♂
UROSPERMUM	*UROSPERMUM*
dalechampii. / TRAGOPOGON DALECHAMPII *L.* / ARNOPOGON DALECHAMPII *Willd. sp.*	*de Dalechamp.* F. ♂
picroides. / TRAGOPOGON PICROIDES *L.* / ARNOPOGON PICROIDES *Willd. sp.*	*hérissé.* F. ☉
III. Receptaculum villosum aut paleaceum.	III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.
GEROPOGON	*GÉROPOGON*
glaber *L.*	*glabre.* italie. ☉
HYPOCHÆRIS	*HYPOCHÉRIS*
maculata *L.*	*tacheté.* F. ♆
helvetica *Jacq. ic.*	*de Suisse.* ♆
glabra *L.*	*glabre.* F. ☉
radicata *L.*	*à longues racines.* F. ♆
SERIOLA	*SÉRIOLA*
æthnensis *L.*	*de l'Etna.* italie. ☉
cretensis *L.*	*de Crète.* ☉
ANDRYALA	*ANDRYALA*
integrifolia *L.*	*à feuilles entières.* F. ♂

sinuata *L.*
lanata *L.*
ragusina *L.*
cheiranthifolia *l'her. stirp.*

sinué. F. ♂
laineux. F. ♆
de Raguse. or. ♆
à f. de giroflée. madère. or. ♄

CATANANCHE
cœrulea *L.*
lutea *L.*

CATANANCHÉ
bleu. F. ♂ (orn.)
jaune. F. m. ☉

CICHORIUM
intybus *L.*
endivia *L.*
— crispa.
pumilum *Jacq. obs.*
spinosum *L.*

CHICORÉE
sauvage. F. ♆ (méd. alim.)
endive. ♂ (alim.)
— *crépue.*
naine. ☉
épineuse. F. m. ♂

SCOLYMUS
maculatus *L.*
hispanicus *L.*

SCOLYMUS
panaché. italie. ☉
d'Espagne. ♂

ORDO II.

FLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum setosum aut paleaceum; semen papposum; flores flosculosi omnes hermaphroditi. (*Polygamia æqualis.*)

ORDRE II.

FLOSCULEUSES.

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines aigrettées; tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale.)

CNICUS.

1. *Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.*

centauroides *willd. sp.*
cernuus *willd. sp.*
oleraceus *willd. sp.*
tataricus *willd. sp.*
ochroleucus *willd. sp.*
uliginosus *marsch. cauc.*
erisithales *willd. sp.*
semipectinatus *encycl.*
rivularis *willd. sp.*
pratensis *willd. sp.* }
carduus anglicus *encycl.* }
tuberosus *willd. sp.*
serratuloides *willd. sp.*
munitus *marsch. cauc.*
arachnoideus *marsch. cauc.*
ferox *willd. sp.*
spinosissimus *willd. sp.*

CNICUS.

1. Feuilles sessiles ou embrassantes.

à feuilles de centaurée. F. ♆
penché. sibérie. ♆
des prés. F. ♄
de Tartarie. ♄
jaunâtre. F. ♆
des marécages. caucase. ♆
erisithalès. Alpes ♄
semipecténé. tartarie. ♆
des ruisseaux. autriche. ♆
des prés. F. ♆
tubéreux. F. ♄
à feuilles de sarrète. F. ♆
armé. caucase. ♆
arachnoïde. caucase. ♆
hérissé. Alpes. ♂
très-épineux. suisse. ♆

ciliatus *willd. sp.*	*ciliè.* sibérie. ♄
eriophorus *willd. sp.*	*à tête laineuse.* F. ♂
diacantha *bill. dec.*	*à doubles épines.* syrie. ♂
casabonæ *willd. sp.*	*casabon.* Eur. austr. or. ♂
stellatus *willd. sp.*	*étoilé.* orient. ☉
syriacus *willd. sp.*	*de Syrie.* ☉
acaulis *willd. sp.*	*sans tige.* F. ♄
fruticosus.	*arbrisseau.* or. ♄

2. *Foliis decurrentibus.*

2. Feuilles décurrentes.

arvensis. / serratula arvensis L.	*des champs.* F. ♂
lanceolatus *willd. sp.*	*lancéolé.* F. ♂
Acarna *Willd. sp.*	*Acarna.* Esp. ☉
palustris *willd. sp.*	*des marais.* F. ♅
monspessulanus *willd. sp.*	*de Montpellier.* F. ♅
pyrenaicus *willd. sp.*	*des Pyrénées.* ♅
canus *willd. sp.*	*blanchâtre.* Autriche. ♅

CARDUUS	*CHARDON*
leucographus *willd. sp.*	*panaché.* F. m. ☉
arabicus *willd. sp.*	*d'Arabie.* ☉
argentatus *willd. sp.*	*argenté.* Égypte. ☉
candicans *wald. et Kitt. hung.*	*blanchâtre.* Hongrie. ♂
crispus *willd. sp.*	*crépu.* F. ☉
personata *willd. sp.* / Arctium personata L.	*fausse Bardane.* Alpes. ☉
acanthoides *willd. sp.*	*à feuilles d'Acanthe.* F. ☉
pycnocephalus *willd. sp.*	*à fleurs tombantes.* F. ☉
carlinoides *Gouan. ill.*	*fausse carline.* Pyrénées. ♄
medius *Gouan. ill.*	*intermédiaire.* Pyrénées. ♅
defloratus *willd. sp.*	*défleuri.* Alpes. ♄
nutans *willd. sp.*	*à tête penchée.* F. ♂
glaucophyllus.	*à feuilles glauques.* ♅
marianus *willd. sp.*	*Marie.* F. ♂
— viridis.	*— vert.*

ONOPORDON	*ONOPORDON*
Acanthium L.	*à feuilles d'Acanthe.* F. ♂
— viride.	*— vert.*
illyricum L.	*d'Illyrie.* ♂
arabicum L	*d'Arabie.* ♂
acaulon L.	*sans tige.* Pyrénées. ♂

CINARA	*ARTICHAUT*
scolymus L.	*cultivé* F. m. ♅ (alim.)
cardunculus L.	*cardon.* Barbarie. ♄ (alim.)
humilis L.	*nain.* Alger. or. ♅

LEUZEA	*LEUZÉA*
conifera *dec. fl.*	*conifère.* Alpes. ♃
centaurea conifera *l.*	
CARLINA	*CARLINE*
subacaulis *dec. fl.*	*à tige courte.* Alpes. ♃
chamæleon *vill. delph.*	
caulescens *encycl.*	
acanthifolia *all. ped.*	*à f. d'Acanthe.* Alpes. ♆ (alim.)
lanata *l.*	*laineuse.* F. m. ☉
corymbosa *l.*	*corymbifère.* Italie. or. ♆
aggregata *willd. sp.*	*fasciculée.* croatie. ♆
vulgaris *l.*	*commune.* F. ♂
ATRACTYLIS	*ATRACTYLIS*
cancellata *l.*	*chardon-prisonnier.* F. m. ☉
CARTHAMUS	*CARTHAME*
tinctorius *l.*	*des teinturiers.* Égypte. ☉
lanatus *l.*	*laineux.* F. ☉
creticus *l.*	*de Crète.* ☉
cœruleus *l.*	*bleu.* Esp. ♃
mitissimus *l.*	*sans épines.* F. ♆
corymbosus *l.*	*corymbifère.* Tunis. or. ♆
BROTERA corymbosa *willd. sp.*	
salicifolius *l. f.*	*à f. de saule.* canaries. or. ♄
carlowisia salicifolia *dec. ann.*	
ARCTIUM	*BARDANE*
LAPPA *l.*	*officinale.* F. ♂ (méd.)
— tomentosa.	*— cotonneuse.*
grandiflora.	*à grandes fleurs.* F. ♂
STÆHELINA	*STÉHÉLINA*
dubia *l.*	*à f. de* ROMARIN. F. m. or. ♄
chamæpeuce *s. reg.*	*chamepeucé.* orient. or. ♄
serratula chamæpeuce *l.*	
SERRATULA	*SARRETTE*
centauroides *l.*	*laciniée.* sibérie. ♃
tinctoria *l.*	*des teinturiers* F. ♆
quinquefolia *marsch. cauc.*	*à cinq folioles.* perse sept. ♃
coronata *l.*	*couronnée.* sibérie. ♆
heterophylla *desf. atl.*	*à feuilles variables.* Alpes. ♆
pinnatifida.	*pinnatifide.* hongrie. ♃
carduus radiatus *wald. et kitt. hung.*	
alata.	*ailée.* ♆

II. Receptaculum setosum aut paleaceum; flosculi steriles in ambitu; semen papposum. (*Polygamia frustranea.*)

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines couronnées d'aigrettes; fleurons stériles à la circonférence. (Polygamie frustranée.)

ZOEGEA

leptaurea L. *Mant.*

ZOÉGÉA

d'Orient. ⊙ (orn.)

CENTAUREA.

CENTAURÉE.

1. *Squamæ calicinæ læves, nec ciliatæ, nec spinosæ.*

1. Ecailles du calice lisses, ni ciliées, ni épineuses.

crupina L.
Lippii L.
Amberboi *Encycl.*
suaveolens *Willd. sp.*
moschata L.
rhutenica *Encycl.*
centaurium L.
alpina L.
africana *Encycl.*

à f. de condrille. F. m. ⊙
de Lippi. Egypte. ⊙
odorante. orient. ⊙ (orn.)
musquée. orient. ⊙ (orn.)
de Russie. ♅
grande. Italie. ♆
des Alpes. ♄
d'Afrique. Barbarie. ♄

2. *Squamæ calicinæ serrato-ciliatæ.*

2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

phrygia L.
Jacea L.
nigra L.
nigrescens *Willd. sp.*
uniflora L. *Mant.*
pullata L.
montana L.
axillaris *Willd. sp.*
seusana *Vill. Delph.*
variegata *Encycl.*
cyanus L.
paniculata L.
spinosa L.
ragusina L.
candidissima *Encycl.*
cinerea *Encycl.*
dealbata *Willd. sp.*
decumbens *Pers. syn.*
scabiosa L.

plumeuse. Alpes. ♄
Jacée. F. ♅
noire. F. ♅
brune. Autriche. ♄
à une fleur. F. m. ♆
à collerette. F. m. ♅
de montagne. Alpes. ♄
axillaire. Alpes. ♄
Bluet. F. ⊙ (orn.)
paniculée. F. ⊙
épineuse. orient. or. ♄
de Raguse. orient. or. ♄
très-blanche. Italie. or. ♄
cendrée. Italie. or. ♄
blanchâtre. Ibérie. ♄
couchée. Alpes. ♅
scabieuse. F. ♆

3. *Squamæ calicinæ aridæ, scariosæ, ciliato-serratæ.*

3. Ecailles du calice desséchées, ciliées, dentées en scie.

atropurpurea *Wald. et Kitt. Hung.*
orientalis L.
Balsamita *Encycl.*

noire-pourpre. Hongrie. ♆
d'Orient. or. ♅
à f. de Balsamite. orient. ⊙

4. *Squamæ calicinæ scariosæ, integræ vel laceræ.*

glastifolia *L.*
alata *Encycl.*
alba *L.*
picris *Willd. sp.*
splendens *L.*
Rhapontica *L.*
macrocephala *Willd. sp.*

4. Écailles du calice desséchées, entières ou déchirées.

à f. de Pastel. orient. ♄
ailée. Tartarie. ♆
blanche. Esp. ♆
picris. orient. or. ♄
luisante. suisse. ♂
Rhapontic. Alpes. ♄
à grosse tête. Ibérie. ♄

5. *Spinæ calicinæ palmatæ.*

sonchifolia *L.*
ferox *Desf. Atl.*
seridis *L.*
aspera *L.*
napifolia *L.*
sphærocephala *L.*
prolifera *Vent. H. cels.*
straminea *Willd. sp.*
melitensis *L.*
sicula *L.*
solstitialis *L.*

5. Épines du calice palmées.

à feuilles de Laitron. F. m. ☉
hérissée. Alger. ♆
à feuilles de chicorée. Esp. ♆
rude. F. m. ♆
à feuilles de Navet. orient. ☉
à tête ronde. Barbarie. ☉
prolifère. Égypte. ☉
de Malte. ☉
de Sicile. ☉
du solstice. F. ☉

6. *Spinæ calicinæ compositæ.*

verutum *L.*
apula *Encycl.*
eriophora *L.*
benedicta *L.*
calcitrapa *L.*

6. Épines du calice rameuses.

à longues épines. orient. ☉
de la Pouille. ☉
à tête laineuse. Alger. ☉
chardon-bénit. F. m. ☉ (méd.)
chausse-trape. F. ♂

7. *Squamæ calicinæ ciliatæ, spinâ terminatæ.*

diffusa *Encycl.*
multifida *Pers. syn.*
pubescens *Willd. sp.*
collina *L.*
diluta *H. K.*

7. Écailles du calice ciliées, terminées par une épine.

étalée. orient. ♄
laciniée. ♆
des collines. F. ♆
rose-pâle. Eur. m. ☉

8. *Squamæ calicinæ integræ; spinæ simplices.*

salmantica *L.*
pumila *L.*
crocodylium *L.*
muricata *L.*
Galactites *L.*
Galactites tomentosa *Dec. Ann.*

8. Écailles du calice entières; épines simples.

de Salamanque. F. m. ♄
naine. Égypte. or. ♂
à f. de Vulnéraire. Égypte. ☉
à fleurs de Bluet. Esp. ☉
panachée. F. m. ♂

III. Flosculi calice proprio cincti. (Polygamia segregata.)

III. Fleurons entourés d'un calice partiel. (Polygamie séparée.)

ELEPHANTOPUS
scaber *L.*

ELÉPHANTOPUS
rude. inde. s. ch. ♆

SPHÆRANTHUS
indicus *L.*

BOULETTE
des Indes. s. ch. ♆

LAGASCEA
mollis *Willd. Enum.*

LAGASCÉA
velouté. cuba. ☉

OEDERA
prolifera *L.*

OEDÉRA
prolifère. cap. s. ch. ♄

ECHINOPS
sphærocephalus *L.*
nitro *L.*
strigosus *L.*

ECHINOPS
à grosse tête. F. ♈
azuré. F. m. ♈
à feuilles rudes. esp. ☉

IV. Receptaculum nudum; semina absque pappo; flosculi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis.)

IV. Réceptacle nu; graines sans aigrettes; tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale.)

BALSAMITA
ageratifolia.
chrysanthemum flosculosum *L.*

BALSAMITE
à f. d'Ageratum. crête. or. ♄

suaveolens.
TANACETUM BALSAMITA *L.*

odorante. F. m. ♈

annua.
TANACETUM ANNUUM *L.*

annuelle. esp. ☉

FLAVERIA
contrayerba *Willd. Enum.*
milleria contrayerva. *Encycl.*

FLAVÉRIA
contrayerva. pérou. ☉

ETHULIA
conyzoides *L.*

ETHULIA
fausse conyse. inde. ☉

HUMEA
elegans *Smith. Exot. Bot.*
calomeria amaranthoides *Vent. Malm.*

HUMÉA
élégant. N. holl. or. ♂

V. Receptaculum nudum, villosum aut paleaceum; semina nuda; flosculi fœminei in ambitu. (Polygamia superflua.)

V. Réceptacle nu, velu ou garni de paillettes; graines nues; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)

HIPPIA
frutescens *L. f.*

HIPPIA
arbrisseau. cap. or. ♄

GYMNOSTYLES
anthemifolia *Juss. Ann.*

GYMNOSTYLE
à f. d'Anthémis. N. holl. ☉

TANACETUM	*T'ANAISIE*
suffruticosum L.	*sous-arbrisseau.* cap. or. ♄
vulgare L.	*commune.* F. ♆ (méd.)
— crispum.	*— crépue.*
sibiricum L.	*de Sibérie.* ♄
CARPESIUM	*CARPESIUM*
cernuum L.	*penché.* F. ♂
abrotanoides L.	*à fl. d'Aurone.* chine. s. ch. ♄
GRANGEA	*GRANGÉA*
latifolia *Encycl. suppl.*	*à larges feuilles.* inde. ⊙
maderaspatana *Encycl. suppl.*	*à feuilles sinuées.* inde. ⊙
Artemisia maderaspatana L.	
cotula maderaspatana *Willd. sp.*	
minima *Encycl. suppl.*	*petit.* inde. ⊙
Artemisia minima L.	
cotula minima *Willd. sp.*	
ARTEMISIA.	*ARMOISE.*
1. *Herbaceæ; calices oblongi.*	1. Tiges herbacées; calices oblongs.
capillifolia *Encycl.*	*capillaire.* chine. or. ♄
vulgaris L.	*commune.* F. ♆ (méd.)
palmata *Encycl.*	*palmée.* Esp. or. ♄
maritima L.	*maritime.* F. ♄
suaveolens *Encycl.*	*odorante.* F. ♄
2. *Herbaceæ; calice hemisphærico.*	2. Tiges herbacées; calice hémisphérique.
austriaca *Jacq. Austr.*	*d'Autriche.* ♄
annua L.	*annuelle.* sibérie. ⊙
leucanthemifolia.	*à f. de Leucanthème.* ♆
campestris L.	*des champs.* F. ♆
neglecta *Willd. Enum.*	*de Sprengel.* sibérie. ♆
Dracunculus L.	*Estragon.* tartarie. ♆ (écon.)
inodora *Willd. Enum.*	*inodore.* Daourie. ♄
biennis *Willd. sp.*	*bisannuelle.* N. zélande. or. ♂
zeelandica *Encycl.*	
pectinata *Pallas, Itin.*	*pectinée.* Daourie. ⊙
sivertiana *Willd. sp.*	*fausse Absinthe.* sibérie. ♂
violacea.	*à fleur violette.* ♄
tanacetifolia L.	*à feuill. de Tanaisie.* Alpes. ♄
glacialis L.	*des glaciers.* Alpes. ♄
rupestris L.	*des rochers.* Alpes. ♆
insipida *Vill. Delph.*	*insipide.* Alpes. ♆
Absinthium L.	*Absinthe.* F. ♆ (méd.)
pontica L.	*de Pont.* ♆ (méd.)

3. *Fruticosæ.*

cœrulescens L.
corymbosa *Encycl.*
valentina *Encycl.*
Abrotanum L.
afra *Willd. sp.*
chinensis L.
argentea *l'Her. sert.*
arborescens L.

MICROPUS
erectus L.
supinus L.
pygmæus. } Filago pygmæa L.

VI. Receptaculum nudum, rariùs paleaceum; semina papposa; flosculi fœminei in ambitu. (*Polygamia superflua.*)

FILAGO
montana L.
germanica L.
gallica L.
pyramidata L.
Leontopodion L.

XERANTHEMUM
annuum L.
inapertum L.

ELICHRYSUM
fulgidum *Willd. sp.* } xeranthemum fulgidum L. *f.*
retortum *Willd. sp.* } xeranthemum retortum L.
bracteatum *Willd. Enum.* } xeranthemum bracteatum *Vent. Malm.*

GNAPHALIUM.

1. *Chrysocoma.*

stœchas L.
— minor.
crassifolium *Encycl.* (non L.)
ovatum. } crassifolium L. *Mant.*
cymosum L.
orientale L.

3. Tiges ligneuses.

bleuâtre. Italie. ♄
corymbifère. Italie. ♄
de Valence. Esp. or. ♄
citronnelle. F. m. ♄ (méd.)
d'Afrique. cap. or. ♄
Moxa. chine. or. ♄ (méd.)
argentée. canaries. or. ♄
en arbre. F. m. or. ♄

MICROPUS
à tige droite. F. ⊙
couché. F. ⊙
nain. F. ⊙

VI. Réceptacle nu, rarement garni de paillettes; graines aigrettées; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)

FILAGO
de montagne. F. ⊙
dichotome. F. ⊙
de France. ⊙
pyramidal. F. ⊙
Pied-de-lion. Alpes. ♆

XÉRANTHÈME
annuel. F. ⊙ (orn.)
fermé. F. ⊙

ELICHRYSUM
éclatant. cap. or. ♂ (orn.)
contourné. cap. or. ♄
à grandes bractées. N. Holl. or. ♂ (orn.)

IMMORTELLE.

1. Fleurs jaunes.

stéchas. F. m. or. ♄ (méd.)
— naine.
à feuilles épaisses. or. ♄
à feuilles ovales. cap. or. ♄
corymbifère. cap. or. ♄
d'Orient. or. ♄ (orn.)

arenarium *L.*	*des sables.* Allem. ☉
luteo-album *L.*	*jaune-blanche.* F. ☉
fœtidum *L.*	*fétide.* cap. ☉
patulum *L.*	*étalée.* cap. or. ♄
2. *Argyrocoma.*	2. Fleurs blanches.
diosmæfolium *Vent. Malm.*	*à f. de Diosma.* cap. or. ♄
teretifolium *L.*	*à feuill. cylindriq.* cap. or. ♄
undulatum *L.*	*ondulée.* Antilles. ☉
spathulatum *Encycl.*	*en spatule.* ☉
glomeratum.	*agglomérée.* N. Holl. or. ♎
serpyllifolium *Encycl.*	*à f. de serpolet.* cap. or. ♄
margaritaceum *L.*	*des jardins.* Am. s. ♎ (orn.)
dioicum *L.*	*Pied-de-chat.* F. ♎ (méd.)
leyseroides *Desf. Atl.*	*à feuill. de Leysera.* Tunis. ☉
supinum *L.*	*petite.* Alpes. ♎
alpinum *L.*	*des Alpes.* ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F. ♂
uliginosum *L.*	*des marais.* F. ☉
Conyza et Baccharis	*Conyse*
neriifolia. / Baccharis neriifolia *L.*	*à f. de Nérium.* cap. or. ♄
ivæfolia. / Baccharis ivæfolia *L.*	*à feuilles d'Iva.* Am. s. or. ♄
halimifolia. / Baccharis halimifolia *L.*	*à feuilles d'Halime.* Am. s. ♄
Dioscoridis. / Baccharis dioscoridis *L.*	*de Dioscoride.* syrie. or. ♄
odorata *L.*	*odorante.* Antilles. s. ch. ♄
candida *L.*	*blanche.* candie. or. ♄
asteroides.	*à feuilles d'Aster.* s. ch. ♄
Gouani. / Erigeron Gouani *L.*	*de Gouan.* canaries. or. ♆
thapsioides *Marsch. cauc.*	*à feuill. de Molène.* caucase. ♆
paniculata.	*paniculée.* ☉
ægyptiaca *Willd. sp.* / Erigeron ægyptiacum *L. Mant.*	*d'Egypte.* or. ♎
squarrosa *L.*	*rude.* F. ♂
rupestris *L. Mant.*	*des rochers.* Barbarie. or. ♄
sordida *L. Mant.*	*à fleurs ternées.* F. m. or. ♄
saxatilis *L.*	*à une fleur.* F. m. or. ♄
Tussilago	*Tussilage*
alpina *L.*	*des Alpes.* ♆
Farfara *L.*	*Pas-d'âne.* F. ♎ (méd.)
alba *L.*	*blanc.* F. ♆
Petasites *L.*	*Pétasite.* F. ♆
fragrans *Vill. Delph.*	*odorant.* ♆ (orn.)

VII. Receptaculum nudum; semen pappposum; flosculi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis.)

VII. Réceptacle nu; graine aigrettée; tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale.)

CACALIA.

1. *Fruticosæ.*

laciniata *Jacq. ic.*
articulata *L. f.*
papillaris *L.*
Anteeuphorbium *L.*
Kleinia *L.*
Ficoides *L.*
cylindrica *Encycl.*
repens *L. Mant.*
odorata.
reticulata *Vahl. symb.*

2. *Herbaceæ.*

linaria *cav. ic.*
Porophyllum *L.*
suaveolens *L.*
senecioides.
Petasites *Encycl.*
tomentosa *Encycl.*
alliariæfolia *Encycl.*
atriplicifolia *L.*
sagittata *willd. sp.*

CACALIA.

1. Tiges ligneuses.

lacinié. cap. s. ch. ♄
mamelonné. cap. s. ch. ♄
à feuilles ovales. cap. s. ch. ♄
Kleinia. canaries. s. ch. ♄
Ficoïde. cap. s. ch. ♄
cylindrique. cap. s. ch. ♄
rampant. cap. s. ch. ♄
odorant. N. holl. or. ♄
à réseau. Ile de F. s. ch. ♄

2. Tiges herbacées.

à f. linéaires. N. Esp. s. ch. ♆
à f. poreuses. Antilles. s. ch. ♄
suave. Am. s. ☿
à fleurs de seneçon. ♆
à f. de Tussilage. Alpes. ♆
cotonneux. Alpes. ♆
à f. d'Alliaire. Alpes. ♆
à f. d'Arroche. Am. s. ♆
à f. hastées. Java. ☉ (orn.)

CHRYSOCOMA
dichotoma *L. f.*
coma-aurea *L.*
cernua *L.*
biflora *L.*
dracunculoides *Encycl.*
Linosyris *L.*
juncea.
graminifolia *L.*

CHRYSOCOME
dichotome. canaries. or. ♄
dorée. cap. or. ♄
penchée. cap. or. ♄
à deux fleurs. sibérie ♆
Linosyris. F. ♆
jonciforme. ♆
à f. de Gramen. Am. s. ☿

VERNONIA
novæboracensis *willd. sp.*
serratula novæboracensis *L.*
prælta *willd. sp.*
serratula prælta *L.*
anthelmintica *willd. sp.*
conyza anthelmintica *L*

VERNONIA
de Newyork. ♆ (orn.)
gigantesque. Am. s. ♆ (orn.)
anthelmintique. Inde. s. ch. ♆

LIATRIS
spicata *willd. sp.*
serratula spicata *L.*
squarrosa *willd. sp.*
serratula squarrosa *L.*

LIATRIS
à épis. Am. s. ♆
rude. Am. s. ☿

EUPATORIUM.	*EUPATOIRE.*
1. *Calix imbricatus*, 3 *ad* 9 *florus.*	1. Calice imbriqué, renfermant 3-9 fleurs.
houstonis L.	*de Houston.* Am. s. s. ch. ♄
mikania houstonis *willd. sp.*	
balea L.	*de la Jamaïque.* s. ch. ♄
scandens L.	*grimpante.* Am. s. or. ♆
mikania scandens *willd. sp.*	
altissimum L.	*élevée.* Am. s. or. ♆
cannabinum L.	*à f. de chanvre.* F. ♄ (méd.)
syriacum *jacq. ic.*	*de Syrie.* ♆
sessilifolium L.	*à feuilles sessiles.* Am. s. ♄
purpureum L.	*pourpre.* Am. s. ♆
maculatum L.	*maculée.* Am. s. ♄
2. *Calix imbricatus, decemflorus et ultrà.*	2. Calice imbriqué, renfermant 10 ou un plus grand nombre de fleurs.
atriplicifolium *vahl. symb.*	*à f. d'Arroche.* Ant. s. ch. ♄
deltoideum *jacq. h. sch.*	*deltoïde.* s. ch. ♄
perfoliatum L.	*perfoliée.* Am. s. ♆
aromaticum L.	*aromatique.* Am. s. ♄
cœlestinum L.	*à f. de scorodonia.* Am. s. ♆
ageratoides L. *f.*	*agératoïde.* Am. s. ♆
fruticosum.	*ligneuse.* or. ♄
STEVIA	*STÉVIA*
serrata *cav. ic.*	*à f. en scie.* Mexique. or. ♄
Ageratum punctatum *ortega, dec.*	
ivæfolia *willd. enum.*	*à f. d'iva.* Mexique. or. ♄
purpurea *willd. enum.*	*pourpre.* Mexique. or. ♆
eupatoria *willd. enum.*	*fausse eupatoire.* Mexiq. or. ♆
pedata *cav. ic.*	*en pédale.* cuba. ☉
Ageratum pedatum *ortega, dec.*	
KUHNIA	*KUHNIA*
rosmarinifolia *vent. h. cels.*	*à f. de romarin.* cuba. s. ch. ♄
eupatorium canescens *ortega, dec.*	
PIQUERIA	*PIQUÉRIA*
trinervia *cav. ic.*	*à trois nervures.* Mexiq. s. ch. ♄
AGERATUM	*AGÉRATUM*
conyzoides L.	*fausse conyse.* Antilles. ☉
cœruleum.	*à fleurs bleues.* Antilles. ☉
CEPHALOPHORA	*CÉPHALOPHORA*
glauca *cav. ic.*	*glauque.* chili. or. ♆

VIII. Receptaculum villosum aut palaceum; semen nudum aut subnudum.

CALEA
aspera *Jacq. ic.*

TARCHONANTHUS
camphoratus *L.*

ATHANASIA
annua *L.*
trifurcata *L.*
crithmifolia *L.*
parviflora *L. Mant.*
tricuspis.

DIOTIS
maritima *Desf. Atl.* } athanasia maritima *L.* }

SANTOLINA
chamæcyparissus *L.*
rosmarinifolia *L.*
tomentosa.
eriosperma *Pers. Syn.* } pinnata *Viv. Fragm.* }

ANACYCLUS
aureus *L. Mant.*

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes; graines sans aigrette.

CALÉA
à feuilles rudes. Antilles. ☉

TARCONANTE
camphré. cap. or. ♄

ATHANASIA
annuel. F. m. ☉
trifurqué. cap. or. ♄
à f. de Bacelle. cap. or. ♄
à petites fleurs. cap. or. ♄
à trois pointes. cap. or. ♄

DIOTIS
maritime. F. m. or. ♄

SANTOLINE
commune. F. m. ♄
à f. de Romarin. Esp. or. ♄
cotonneuse. Esp. or. ♄
à tête laineuse. Italie. or. ♆

ANACYCLUS
jaune. F. m. ☉

ORDO III.

RADIATÆ.

I. Receptaculum nudum; pappus nullus.

COTULA
aurea *L.*
anthemoides *L.*
coronopifolia *L.*
turbinata *L.*
Lidbeckia turbinata *Willd. sp.* }

BELLIS
annua *L.*
perennis *L.*

MATRICARIA
parthenium *L.*
parthenioides.

ORDRE III.

RADIÉES.

I. Réceptacle nu; graines sans aigrette.

COTULA
jaune. Esp. ☉
à feuilles d'Anthémis. Esp. ☉
corne-de-cerf. cap. ☉
conique. cap. ☉

PAQUERETTE
annuelle. F. ☉
vivace. F. ♄ (orn.)

MATRICAIRE
officinale. F. ♆ (méd.)
inodore. ♆

chamomilla L.	*camomille.* F. ☉
suaveolens L.	*odorante.* F. ☉ (méd.)
capensis L. *Mant.*	*du Cap.* ☉

CHRYSANTHEMUM. — *CHRYSANTHÈME.*

1. *Leucanthema.* — 1. Fleurs blanches ou roses.

Fruticosa. — Tiges ligneuses.

frutescens L. PYRETHRUM frutescens *Willd. sp.*	*arbrisseau.* canaries. or. ♄
pinnatifidum L. *f.*	*pinnatifide.* canaries. or. ♄
grandiflorum. PYRETHRUM grandiflorum *Willd. Enum.*	*à grandes fl.* canaries. or. ♄
asteroides.	*astéroïde.* s. ch. ♄

Herbacea. — Tiges herbacées.

prœaltum *Vent. H. cels.* PYRETHRUM partheniifolium *Willd. Enum.*	*à f. de Matricaire.* caucase. ♆
pulverulentum. PYRETHRUM pulverulentum *Willd. Enum.*	*pulvérulente.* ibérie. ♆
corymbosum L. PYRETHRUM corymbosum *Willd. sp.*	*corymbifère.* F. ♃
tenuifolium. PYRETHRUM tenuifolium *Willd. Enum.*	*à feuilles menues.* caucase. ♃
coccineum *Willd. sp.* PYRETHRUM roseum *Willd. Enum.*	*rose.* ibérie. ♃
serotinum L. PYRETHRUM serotinum *Willd. sp.*	*d'automne.* AM. S. ♃
LEUCANTHEMUM L.	*grande Marguerite.* F. ♃
maximum *Ramond. Bull. Phil.* PYRETHRUM latifolium *Willd.* grandiflorum *Lapeyr. pyr.*	*à larges feuilles.* PYRÉNÉES. ♃
ceratophylloides *All. ped.*	*à feuilles cornues.* ALPES. ♃
arcticum L.	*du Caucase.* ♃
montanum L.	*des montagnes.* F. ♆
BALSAMITA L. PYRETHRUM BALSAMITA *Willd. sp.*	*Balsamite.* or. ♆

multifidum.
PYRETHRUM pinnatifidum *willd. sp.*
MATRICARIA tanacetifolia *encycl. excl. syn. tourn.*
— *lacinié.* ♆

monspeliense *L.* — *de Montpellier.* F. ♆
alpinum *L.*
PYRETHRUM alpinum *willd. sp.*
— *des Alpes.* ♆
carinatum *schousb. maroc.* — *caréné.* MAROC. ⊙

2. *Chrysanthema.* — 2. Fleurs jaunes.

MICONIS *L.* — *à feuilles entières.* F. ⊙
segetum *L.* — *des moissons.* F. ⊙
coronarium *L.* — *des jardins.* F. M. ⊙
ROXBURGHII.
PYRETHRUM indicum *H. K.*
— *de ROXBURGH.* INDE. ⊙

CALENDULA — *SOUCI*
arvensis *L.* — *des champs.* F. ⊙
officinalis *L.* — *cultivé.* F. ⊙ (écon.)
stellata *cav. ic.* — *étoilé.* ESP. ⊙
hybrida *L.* — *hybride.* CAP. ⊙
pluvialis *L.* — *des pluies.* CAP. ⊙
fruticosa *L.* — *arbrisseau.* CAP. S. CH. ♄
chrysanthemifolia *vent. malm.* — *à f. de chrysanthême.* CAP. OR. ♄
flaccida *vent. malm.* — *à fleurs rougeâtres.* CAP. OR. ♄

MADIA — *MADIA*
viscosa *cav. ic.* — *visqueux.* CHILI. ⊙

OSTEOSPERMUM — *OSTÉOSPERME*
moniliferum *L.* — *à colliers.* CAP. OR. ♄
spinosum *L.* — *épineux.* CAP. OR. ♄
pinnatifidum *l'her. stirp.* — *pinnatifide.* CAP. OR. ♄

MILLERIA — *MILLÉRIA*
quinqueflora *L.* — *à cinq fleurs.* AM. M. ⊙

ERIOCEPHALUS — *ERIOCÉPHALE*
africanus *L.* — *d'Afrique.* CAP. OR. ♄

II. Receptaculum nudum; semina papposa. — II. Réceptacle nu ; graines aigrettées.

BELLIUM — *BELLIUM*
bellidioides *L. mant.* — *fausse paquerette.* ITALIE. ⊙

HELENIUM — *HÉLÉNIUM*
autumnale *L.* — *d'automne.* AM. S. ♆
quadridentatum *bill. soc. nat.* — *à quatre dents.* AM. S. ♆

PECTIS — *PECTIS*
prostrata *cav. ic.* — *couché.* N. ESP. S. CH. ♆

SCHKUHRIA	*SKURIA*
abrotanoides *roth. cat.* pectis multifida *ortega, dec.* pectis bipinnata *lamk. journ. d'hist. nat.*	*à f. d'aurône.* mexique. ☉
TAGETES	*TAGÉTÈS*
erecta L.	*oeillet-d'inde.* mexiq. ☉ (orn.)
patula L.	*toussu.* mexique. ☉ (orn.)
lucida *cav. ic.*	*luisant.* N. esp. or. ♄
tenuifolia *cav. ic.*	*à feuilles étroites.* pérou. ☉
minuta L.	*à petites fleurs.* chili. ☉
BOEBERA	*BOEBÉRA*
chrysanthemoides *willd. sp.* tagetes papposa *vent. h. cels.*	*à f. de chrysanthème.* am. s. ☉
DORONICUM	*DORONIC*
pardalianches L.	*pardalianchès.* Alpes. ♆
plantagineum L.	*à feuilles de plantain.* F. ♆
arnica arnica montana L.	*arnica.* F. ♆ (méd.)
bellidiastrum L. arnica bellidiastrum *willd. sp.*	*à fleurs de paquerette.* Alpes. ♄
GORTERIA	*GORTÉRIA*
ringens L.	*à grandes fl.* cap. or. ♆ (orn.)
pectinata *willd. sp.*	*à f. pennées.* cap. or. ♆ (orn.)
GRINDELIA	*GRINDÉLIA*
inuloides *willd. enum*	*à fleurs d'aunée.* mexiq. or. ♄
INULA	*AUNÉE*
helenium L.	*officinale.* F. ♄ (méd.)
verbascifolia.	*à feuilles de molène.* ♆
bifrons L.	*décurrente.* F. ♄
oculus-christi *encycl.* (non L.)	*oeil-de-christ.* F. ♄
britannica L.	*britannique.* F. ♄
dysenterica L.	*dysentérique.* F. ♄
pulicaria L.	*pulicaire.* F. ☉
arabica L. *mant.*	*d'Arabie.* or. ♆
crispa. gnapholodes *vent. h. cels.* aster crispus *forsk. fl.*	*crépue.* égypte. ☉
squarrosa L. spiræifolia *encycl.*	*rude.* F. ♄
salicina L.	*à feuilles de saule.* F. ♄
ensifolia L.	*ensiforme.* F. ♆
crithmoides L.	*criste marine.* F. ♄
hirta L.	*velue.* F. ♆
montana L.	*de montagne.* F. ♆

cinerea *Encycl.* vaillantii *All. ped.*	*cendrée.* F. ♄
viscosa. Erigeron viscosum *L.*	*visqueuse.* F. m. or. ♆
graveolens. Erigeron graveolens *L.*	*fétide.* F. ☉
tuberosa. Erigeron tuberosum *L.*	*tubéreuse.* F. m. or. ♄
glutinosa. Aster glutinosus *cav. ic.*	*glutineuse.* Mexique. or. ♄
Erigeron	*Erigeron*
canadense *L.*	*de Canada.* F. ☉
siculum *L.*	*de Sicile.* F. m. ☉
linifolium *Willd. sp.* bonariense.	*à feuilles de Lin.* ☉
longifolium.	*à longues feuilles.* Am. s.
annuum. Aster annuus *L.*	*à fleurs blanches.* Am. s. ☉
delphinifolium *Willd. Hort. Ber.*	*à f. de Delphinium.* Am. m. s. ch. ♂
philadelphicum *L*	*de Philadelphie.* ♆
amplexicaule.	*amplexicaule.* Am. s. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* ♆
villarsii *Bellardi, App.* atticum *Vill. Delph.*	*de Villars.* Alpes. ♆
acre *L.*	*âcre.* F. ☉
fœtidum *L.*	*fétide.* Cap. or. ♂
viscosum. Psiadia glutinosa *Jacq. H. sch.*	*visqueux.* Antilles. s. ch. ♄
Boltonia	*Boltonia*
asteroides *l'Her. sert.*	*à fleurs d'Aster.* Am. s. ♆
glastifolia *l'Her. sert.*	*à feuilles de Pastel.* Am. s. ♆
Aster	*Aster*
liratus *Bot. Magaz.*	*sillonné.* N. Holl. or. ♄
argophyllus *Bill. n. Holl.*	*blanchâtre.* N. Holl. or. ♄
tomentosus *Willd. sp.* dentatus *Andr. Rep.*	*cotonneux.* N. Holl. or. ♄
cymbalariæ *H. K.*	*cymbalaire.* Cap. or. ♄
fruticosus *L.*	*arbrisseau.* Cap. or. ♄
argenteus *Mich. Fl.* sericeus *Vent. H. cels.*	*satiné.* Am. s. ♄
lithospermifolius.	*à feuilles de Grémil.* ♄
tenellus *L.*	*fragile.* Cap. ☉
chrysocomoides. conyza chrysocomoides, *Desf. All.*	*changeant.* Barbarie. or. ♄

Tripolium L.	*maritime.* F. ♂
alpinus L.	*des Alpes.* ♆
pyrenæus.	*des Pyrénées.* ♄
Amellus L.	*Amelle.* F. ♆ (orn.)
amygdalinus *Encycl.*	*à f. d'Amandier.* Am. s. ♆
leucanthemus.	*à fleurs blanches.* ♆
carolinianus *Willd. sp.*	*de Caroline.* ♄
linifolius L.?	*à feuilles de Lin.* Am. s. ♆
acris L.	*âcre.* F. m. ♆
trinervis.	*à trois nervures.* ♆
æstivus *Willd. sp.*	*d'été.* Am. s. ♆
punctatus *Willd. sp.*	*ponctué.* Hongrie. ♆
dracunculoides *Encycl.*	*à feuilles d'Estragon.* ♄
diversifolius *Mich. Fl.*	*à feuilles variables.* Am. s. ♆
adulterinus *Willd. Enum.*	*adultérin.* Am. s. ♄
amplexicaulis *Encycl.*	*amplexicaule.* Am. s. ♆ (orn.)
decorus.	*d'ornement.* ♄
novæ-angliæ L.	*de la Nouv.-Anglet.* ♆ (orn.)
cordifolius L.	*à f. en cœur.* Am. s. ♆ (orn.)
corymbosus *Willd. sp.*	*corymbifère.* Am. s. ♆
patulus *Encycl.*	*étalé.* Am. s. ♄ (orn.)
rubricaulis *Encycl.*	*à tige pourpre.* Am. s. ♆
lævigatus *Encycl.*	*glabre.* Am. s. ♆ (orn.)
longifolius *Encycl.*	*à feuilles longues.* Am. s. ♆
amœnus *Encycl.*	*luisant.* Am. s. ♆
concinnus *Willd. Enum.*	*à grappes serrées.* Am. s. ♄
novi-belgii L.	*paniculé.* Am. s. ♆
paniculatus *Encycl.*	
salignus *Willd. sp.*	*de Hongrie.* ♆
versicolor *Willd. sp.*	*bigarré.* Am. s. ♆
subulatus *Mich. Fl.*	*en alêne.* Am. s. ♆
inflexus.	*courbé.* ♄
salicifolius *Encycl.*	*à feuilles de saule.* Am. s. ♄
strictus.	*ramassé.* ♄
Tradescanti L.	*de Tradescant.* Am. s. ♄
macrophyllus L.	*à larges feuilles.* Am. s. ♄
coridifolius *Mich. Fl.*	*à feuilles de coris.* Am. s. ♆
ericoides L.	*à feuill. de Bruyère.* Am. s. ♄
vimineus *Encycl.*	*flexible.* Am. s. ♄
tenuifolius L.	*à feuilles minces.* Am. s. ♆
fragilis *Willd. sp.*	*fragile.* Am. s. ♆
rigidulus.	*à feuilles rudes.* ♄
grandiflorus L.	*à grandes fl.* Am. s. ♆ (orn.)
chinensis L.	*Reine-marguerite.* chine. ☉ (orn.)
miser L.	*grêle.* Am. s. ♆

1. *Ramuli secundi patuli.*

sempervirens L.
elliptica *Encycl.* (an *Willd.?*)
canadensis L.
glabra.
nutans.
procera *H. K.*
aspera *H. K.*
conferta *Encycl.*

2. *Racemi erecti.*

integrifolia.
multiflora.
mexicana L.
latifolia L.
bicolor L. *Mant.*
flexicaulis L.
virga-aurea L.
alpestris *Wald. et Kitt. Hung.*
corymbosa.
minuta L.
rigida L.
petiolaris *Willd. sp.*
hirta *Willd. Enum.?*
arenaria.
gracilis *Encycl.*

CINERARIA

geifolia L.
lobata *l'Her. sert.*
alpina *Willd. sp.*
amelloides L.
maritima L.
populifolia *l'Her. sert.*
appendiculata L. *f.*
aurita *l'Her. sert.*
lanata *l'Her. sert.*
cruenta *l'Her. sert.*
alliariæfolia.
præcox *Cav. ic.*

SENECIO.

1. *Flores floseulosi.*

cernuus L. *f.*
rubens *Jacq. hort.*
hieracifolius L.
vulgaris L.

1. Grappes unilatérales étalées.

toujours verte. Am. s. ♄
elliptique. Am. s. ♄
de Canada. ♆ (orn.)
glabre. Am. s. ♆ (orn.)
à tête penchée. Am. s. ♄ (orn.)
élevée. Am. s. ♆ (orn.)
rude. Am. s. ♆ (orn.)
à grappes serrées. ♄

2. Grappes redressées.

à feuilles entières. Am. s. ♆
à fleurs nombreuses. ♆
du Mexique. ♄
à larges feuilles. Am. s. ♆
de deux couleurs. Am. s. ♄
tortueuse. Am. s. ♆
des bois. F. ♆
des rochers. Hongrie. ♄
corymbifère. ♄
petite. F. ♆
à feuilles dures. Am. s. ♆
à feuilles pétiolées. Am. s. ♄
velue. Am. s. ♆
des sables. ♆
grêle. ♄

CINÉRAIRE

à feuilles de Geum. cap. or. ♄
lobée. cap. or. ♄
des Alpes. ♆
à fleurs d'Amelle. cap. or. ♄
maritime. F. ♄
à f. de Peuplier. canar. or. ♆
auriculée. canaries. or. ♄
laineuse. canaries. or. ♄
pourpre. or. ♆
à feuilles d'Alliaire. or. ♆
précoce. Mexique. s. ch. ♄

SENEÇON.

1. Fleurs flosculeuses.

à fleurs penchées. Inde. ☉
à f. d'Épervière. Am. s. ☉
commun. F. ☉

arabicus *L. Mant.* — *d'Arabie.* Égypte. ☉
reclinatus *L'Her. Stirp.* — *recliné.* cap. or. ♆
discolor. — *de deux couleurs.* or. ♄
glomeratus. — *aggloméré.* N. Holl. ☉

2. *Flores radiati; ligulis revolutis.* — 2. Fleurs radiées; demi-fleurons réfléchis.

ægyptius *L.* — *d'Egypte.* ☉
sylvaticus *L.* — *des bois.* F. ☉
viscosus *L.* — *visqueux.* F. ☉
coronopifolius *Desf. Atl.* — *corne-de-cerf.* Barbarie. ☉

3. *Flores radiati; radio patente; foliis pinnatifidis.* — 3. Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles pinnatifides.

chrysanthemifolius *Encycl.* — *à f. de chrysanthème.* sicile. ☉
elegans *L.* — *violet.* cap. ☉ (orn.)
Jacobæa *L.* — *Jacobée.* F. ♆
erucifolius *L.* — *à feuilles de Roquette.* F. ♇
lycopifolius. — *à feuilles de Lycopus.* ♇
tenuifolius *S. veg.* — *à feuilles menues.* F. ♆
parviflorus *All. ped.* — *à petites fleurs.* Alpes. ♆
incanus *L.* — *blanc.* Alpes. ♇
nebrodensis *L.* — *à feuill. de Paquerette.* Esp. ☉

4. *Flores radiati; radio patente; foliis indivisis.* — 4. Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles entières.

paludosus *L.* — *des marais.* F. ♆
saracenicus *L.* — *traçant.* F. ♆
nemorensis *L.* — *des forêts.* F. ♆
Doria *L.* — *doria.* F. m. ♆
coriaceus *H. K.* — *à f. de Limonium.* orient. ♆
Doronicum *L.* — *Doronic.* Alpes. ♇
longifolius *L.* — *à feuilles longues.* cap. or. ♄
halimifolius *L.* — *à feuill. d'Halime.* cap. or. ♄
rigidus *L.* — *rude.* cap. or. ♄

Othonna — *Othonna*
cheirifolia *L.* — *spatule.* Tunis. ♇
coronopifolia *L.* — *corne-de-cerf.* cap. or. ♄
pectinata *L.* — *pectiné.* cap. or. ♄

III. Semina non papposa; receptaculum paleaceum. — III. Graines sans aigrette; réceptacle garni de paillettes.

Anthemis. — *Anthémis.*

1. *Floribus radio albo.* — 1. Demi-fleurons blancs.

cota *L.* — *piquante.* Italie. ☉
altissima *L.* — *élevée.* F. m. ☉
rigescens *Willd. Enum.* — *à feuilles rudes.* Caucase. ♆
maritima *L.* — *maritime.* F. ♆

mixta L.	*corne-de-cerf.* F. ⊙
montana L.	*des montagnes.* Alpes. ♆
arvensis L.	*des champs.* F. ⊙
clavata *Desf. Atl.*	*en massue.* Barbarie. ⊙
cotula L.	*fétide.* F. ⊙
nobilis L.	*camomille.* F. ♄ (méd.)
austriaca *Jacq. Austr.*	*d'Autriche.* ♆
2. *Floribus radio luteo aut violaceo.*	2. Demi-fleurons jaunes ou violets.
tinctoria L.	*des teinturiers.* Alpes. ♆
valentina L.	*de Valence.* F. m. ⊙
— bicolor.	*— de deux couleurs.*
arabica L.	*d'Arabie.* Alger. ⊙
grandiflora *Ramatuelle, Journ. d'Hist. nat.*	*à grandes fleurs.* chine. ♄ (orn.)
artemisiæfolia *Willd. sp.*	
chrysanthemum indicum *Bot. Magaz.* (non L.)	
ovalifolia *Ortega, Dec.*	*à f. ovales.* Pérou. s. ch. ♄
bupthalmoides *Willd. sp.*	
globosa *Ortega, Dec.*	*globuleuse.* Mexique. or. ♆
triloba *Ortega, Dec.*	*à trois lobes.* N. Esp. or. ♄
ACHILLEA.	*MILLEFEUILLE.*
1. *Corollis radio luteo.*	1. Demi-fleurons jaunes.
santolina L.	*santoline.* orient. or. ♄
falcata L.	*falciforme.* orient. or. ♄
tenuifolia *Encycl.*	*à f. menues.* orient. or. ♄
Ageratum L.	*Eupatoire.* F. m. ♆ (méd.)
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* orient. or. ♄
bipinnata L.	*bipennée.* orient. ♆
Tanacetum myriophyllum *Willd. sp.*	
pubescens L.	*pubescente.* orient. ♄
pauciflora *Encycl.*	*à fleurs rares.* orient. ♄
decumbens *Encycl.*	*tombante.* ♄
abrotanifolia L.	*à feuill. de citronnelle.* orient. or. ♄
semipectinata.	*semipectinée.* ♄
filipendulina *Encycl.*	*à f. de Filipendule.* orient. ♄
partheniifolia.	*à feuilles de Parthenium.* ♄
velutina.	*veloutée.* ♆
pectinata *Willd. sp.*	*pectinée.* Hongrie. ♆
ochroleuca *Wald.* et *Kitt. Hung.*	
flosculosa *Pers. syn.*	*flosculeuse.* ♆
2. *Corollis radio albo aut purpureo.*	2. Demi-fleurons blancs ou pourpres.
macrophylla L.	*à grandes feuilles.* Alpes. ♆

sambucifolia.	
chrysanthemum macrophyllum *wald.* et *Kitt. Hung.*	*à feuill. de sureau.* Hongrie. ♄
dracunculoides.	
Leucanthema *pers. syn.*	*à f. d'Estragon.* caucase. ♆
clavennæ *L.*	*corne-de-cerf.* Alpes. ♆
Herba-rota *L.*	
cuneifolia *Encycl.*	*cunéiforme.* Alpes. ♆
serrata *Retz. obs.*	*à feuilles en scie.*
decolorans *Willd. Enum.*	*décolorante.* ♄
speciosa *Willd. Enum.*	*élégante.* ♆
Ptarmica *L.*	*sternutatoire.* F. ♄ (méd.)
alpina *L.*	*des Alpes.* ♆
sibirica.	*de Sibérie.* ♄
impatiens *L.*	*pectinée.* sibérie. ♆
magna *All. Ped.*	
compacta *Encycl.*	*compacte.* Alpes. ♆
nana *L.*	
lanata *Encycl.*	*naine.* Alpes. ♄
nobilis *L.*	*odorante.* Alpes. ♆
ligustica *All. Ped.*	*fasciculée.* Alpes. ♄
setacea *Wald. et Kitt. Hung.*	*sétacée.* Hongrie. ♆
Millefolium *L.*	*commune.* F. ♄ (méd.)
— purpureum.	*—pourpre.* (orn.)
rosea.	
aspleniifolia *Vent. H. cels.*	*rose.* Am. s. ♄ (orn.)
Parthenium	*Parthenium*
hysterophorus *L.*	*lacinié.* Antilles. ☉
integrifolium *L.*	*à feuill. entières.* Am. s. or. ♆
Buphtalmum	*Buphtalmum*
frutescens *L.*	*arbrisseau.* Am. s. or. ♄
arborescens *L.*	*arbre.* Antilles. s. ch. ♄
sericeum *L. f.*	*satiné.* canaries. or. ♄
cordifolium *Wald. et Kitt. Hung.*	*à feuilles en cœur.* Hongrie. ♄
Inula caucasica *Pers. syn.*	
aquaticum *L.*	*aquatique.* F. ☉
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆
spinosum *L.*	*épineux.* F. ☉
grandiflorum *L.*	*à grandes fleurs.* F. ♆
procumbens.	*couché.* ♆
Sigesbeckia	*Sigesbeckia*
orientalis *L.*	*d'Orient.* Inde. ☉
flosculosa *l'Her. stirp.*	*flosculeux.* Pérou. ☉
Eclipta	*Eclipta*
erecta *S. veg.*	*à tige droite.* Inde ☉
prostrata *L. Mant.*	*couché.* Inde. ☉

BALTIMORA	*BALTIMORA*
erecta L. *Mant.*	*à tige droite.* Am. s. ☉
DYSODIUM	*DYSODIUM*
divaricatum *Pers. Syn.*	*étalé.* Am. m. ☉
ALCINA	*ALCINA*
perfoliata *Cav. Ic.*	*perfolié.* Mexique. ☉
DAHLIA	*DAHLIA*
superflua. Georgina superflua *Dec. Ann.* Georgina variabilis *Willd. Enum.*	*superflue.* Mexique. ♆ (orn.)
— purpurea.	— *pourpre.*
— rubra.	— *rouge.*
— lilacina.	— *lilas.*
— pallida.	— *pâle.*
— flavescens.	— *jaunâtre.*
frustranea. Georgina frustranea *Dec. Ann.*	*frustranée.* Mexique. ♄ (orn.)
— crocea.	— *safranée.*
— flava.	— *jaune.*
MELAMPODIUM	*MÉLAMPODIUM*
longifolium *Willd. Enum.*	*à feuill. longues.* Mexique. ☉
POLYMNIA	*POLYMNIA*
uvedalia L.	*à larges feuilles.* Am. s. ♆
ENCELIA	*ENCÉLIA*
halimifolia *Cav. Ic.* Pallasia grandiflora *Willd. Sp.*	*à f. d'Halime.* N. Esp. s. ch. ♄
canescens *Cav. Ic.* Pallasia halimifolia *Willd. Sp.*	*à f. blanches.* Mexiq. s. ch. ♄
XIMENESIA	*XIMÉNÉSIA*
encelioides *Cav. Ic.*	*à f. d'Encélia.* Mexique. ☉
SCLEROCARPUS	*SCLEROCARPE*
africanus *Jacq. Ic.*	*d'Afrique.* ☉
SILPHIUM	*SILPHIUM*
laciniatum L.	*lacinié.* Am. s. ♄ (orn.)
terebinthinaceum *Jacq. Hort.*	*à f. en cœur.* Am. s. ♆ (orn.)
perfoliatum L.	*perfolié.* Am. s. ♄
connatum L. *Mant.*	*à feuilles réunies.* Am. s. ♄
trifoliatum L.	*à feuilles ternées.* Am. s. ♄
ternatum.	*trifolié.* Am. s. ♆
scabrum.	*à feuilles rudes.* Am. s. ♄
COREOPSIS	*COREOPSIS*
auriculata L.	*auriculé.* Am. s. ♄

tripteris *L.*
verticillata *L.*
delphinifolia *Encycl.*
ferulæfolia *Jacq. H. sch.*
alternifolia *L.*
alata *cav. ic.*

à trois ailes. Am. s. ♄
verticillé. Am. s. ♄
à f. de Delphinium. Am. s. ♆
à f. de Férule. Mexiq. or. ♄
à feuilles alternes. Am. s. ♄
ailé. Mexique. or. ♄

COSMOS
bipinnata *cav. ic.*

COSMOS
bipenné. Mexique. ⊙

RUDBECKIA
laciniata *L.*
— angustifolia.
pinnata *Vent. H. cels.*
digitata *Willd. sp.*
aspera.
chrysomela *Mich. Fl.*
triloba *L.*
hirta *L.*
purpurea *L.*
amplexicaulis *Bosc. Soc. nat.*
perfoliata *cav. ic.*

RUDBECKIA
lacinié. Am. s. ♄ (orn.)
— *à feuilles étroites.*
à feuilles pennées. Am. s. ♄
rude. Am. s. ♆
trilobé. Am. s. ♂
velu. Am. s. ♂
pourpre. Am. s. or. ♄ (orn.)
amplexicaule. Mexique. ⊙

SANVITALIA
villosa *cav. ic.*
Lorantea atropurpurea *ortega, Dec.*

SANVITALIA
velu. N. Esp. ⊙

IV. Semina papposa; receptaculum paleaceum.

IV. Graines aigrettées; réceptacle garni de paillettes.

HELIANTHUS
annuus *L.*
multiflorus *L.*
tuberosus *L.*
mollis *Encycl.*
pubescens *Vahl. symb.*
canescens *Mich. Fl.*
tubæformis *Jacq. H. sch.*
atrorubens *Encycl.* (non *L.*)
altissimus *L.*
virgatus *Encycl.*
giganteus *L.*
angustifolius *L.*
strumosus *Encycl.* (an *L.*?)
divaricatus *L.*
lævis *L.*
buphtalmum helianthoides *L.*
heliopsis lævis *Pers. syn.*
procumbens *Pers. syn.*
dentatus *cav. ic.*

SOLEIL
cultivé. Pérou. ⊙ (orn.)
à fleurs nombr. Am. s. ♆ (orn.)
Topinambour. Brésil. ♄ (alim.)
cotonneux. Am. s. ♆
renflé. Mexique. ⊙
noir-pourpre. Am. s. ♆ (orn.)
élevé. Am. s. ♆
gigantesque. Am. s. ♆
à feuilles étroites. Am. s. ♆
fusiforme. Am. s. ♆
étalé. Am. s. ♆
lisse. Am. s. ♆
couché. Pérou. or. ♄
denté. Mexique. or. ♆

GALARDIA	*GALARDIA*
pulchella *Fougeroux, Acad.* virgilia helioides *l'Her. Gen.*	*élégante.* Louisiane. ⊙ (orn.)
GALINSOGA	*GALINSOGA*
parviflora *Cav. Ic.* triloba *Cav. Ic.*	*à petites fleurs.* Pérou. ⊙ *à trois lobes.* N. Esp. ⊙
PASCHALIA	*PASCHALIA*
glauca *Ortega, Dec.*	*glauque.* Chili. s. ch. ♄
BALBISIA	*BALBISIA*
elongata *Willd. Sp.* Amellus pedunculatus *Ortega, Dec.*	*à longs pédoncules.* Mexiq. ⊙
AMELLUS	*AMELLUS*
Lychnitis *L.*	*bleu.* cap. or. ♄
ZINNIA	*ZINNIA*
pauciflora *L.*	*à fleurs rares.* Pérou. ⊙ (orn.)
multiflora *L.*	*à fleurs nombr.* Louis. ⊙ (orn.)
verticillata *Andr. Rep.*	*verticillé.* Mexique. ⊙
violacea *Cav. Ic.* elegans *Jacq. Ic.*	*violet.* Mexique. ⊙ (orn.)
revoluta *Cav. Ic.* tenuiflora *Jacq Ic.*	*à fleurs renversées.* Mexiq. ⊙ (orn.)
VERBESINA	*VERBÉSINA*
gigantea *Jacq. Ic.*	*gigantesque.* Antilles. s. ch. ♄
atriplicifolia *Encycl.*	*à feuilles d'Arroche.* s. ch. ♄
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* Antilles. s. ch. ♄
serrata *Cav. Ic.*	*à f. en scie.* Mexiq. s. ch. ♄
alata *L.*	*ailée.* curaçao. s. ch. ♆
nodiflora *L.* synedrella nodiflora *Gærtn. Fruct.*	*nodiflore.* Am. m. ⊙
mutica *L.* wedelia carnosa *Persoon. Syn.* Buphtalmum repens *Willd. Sp.*	*rampante.* Antilles. s. ch. ♆
HETEROSPERMA	*HÉTÉROSPERME*
pinnata *Cav. Ic.*	*à feuilles pennées.* N. Esp. ⊙
BIDENS	*BIDENS*
tripartita *L.*	*trifolié.* F. ⊙
cernua *L.*	*penché.* F. ⊙
frondosa *L.*	*feuillu.* Am. s. ⊙
pilosa *L.*	*velu.* Antilles. ⊙
bullata *L.*	*bulleux.* Italie. ⊙

nivea *L.*	
melananthera hastata *Mich. Fl.*	*à fleurs blanches.* Am. s. ☉
bipinnata *L.*	*bipenné.* Am. s. ☉
multifida.	
pauciflora *Encycl. suppl.*	*lacinié.* ☉
serrulata.	
coreopsis serrulata *Encycl. suppl.*	*à feuilles en scie.* ☉
heterophylla *Orteg. Dec.*	*à feuilles var.* N. Esp. or. ♆
SPILANTHUS	*SPILANTHUS*
oleracea *S. Veg.*	*cresson de Para.* Inde. ☉ (méd.)
fusca.	*brun.* Am. m. ☉ (méd.)
Alcmella *L. Mant.*	*Alcmella.* Inde. ☉
AGRIPHYLLUM	*AGRIPHYLLUM*
spinosum.	
Gorteria spinosa *L.*	
Berckeya incana *Willd. Sp.*	*épineux.* cap. or. ♄
Rohria incana *Thunb. Prodr.*	
ciliare.	
Gorteria ciliaris *L.*	
Berckeya ciliaris *Willd. Sp.*	*cilié.* cap. or. ♄
Rohria ciliaris *Thunb. Prodr.*	
ARCTOTIS	*ARCTOTIS*
tristis *L.*	*à fleurs pâles.* cap. ☉
plantaginea *L.*	*à f. de Plantain.* cap. or. ♆
reptans *Jacq. H. Sch.*	*rampant.* cap. or. ♆
aspera *L.*	*à feuilles rudes.* cap. or. ♄
grandiflora *Jacq. H. Sch.*	*à grandes fleurs.* cap. or. ♄
revoluta *Jacq. H. Sch.*	*recourbé.* cap. or. ☉

CLASSIS XI.

CLASSE XI.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(Corolla epigyna ; antheræ distinctæ.)

(Corolle sur le pistil ; anthères distinctes.)

ORDO I.

ORDRE I.

DIPSACEÆ.

DIPSACÉES.

MORINA	*MORINE*
persica *L.*	*de Perse.* ♆ (orn.)

DIPSACUS	*DIPSACUS*
sylvestris *willd. sp.*	*sauvage.* F. ♂
fullonum *willd. sp.*	*chardon-bonnetier.* F. ♂ (arts.)
laciniatus L.	*lacinié.* F. ♂
pilosus L.	*velu.* F. ☉
SCABIOSA.	*SCABIEUSE.*
1. *Corollis quadrifidis.*	1. Corolles à 4 divisions.
alpina L.	*des Alpes.* F. ♄
tatarica L.	*de Tartarie.* ♂
rigida L.	*à feuilles dures.* cap. or. ♄
syriaca L. / dichotoma *Encycl.*	*de Syrie.* ☉
centauroides *Encycl.*	*fausse centaurée.* F. m. ♄
corniculata *Wald. et Kitt. Hung.*	*cornue.* Hongrie. ♄
leucantha L.	*à fleurs blanches.* F. m. ♄
succisa L.	*tronquée.* F. ♄ (méd.)
arvensis L.	*des champs.* F. ♆ (méd.)
sylvatica L.	*des bois.* F. ♄ (méd.)
montana *Marsch. cauc.*	*de montagne.* caucase. ♂
integrifolia L.	*à feuilles entières.* F. ☉
2. *Corollis quinquefidis.*	2. Corolles à 5 divisions.
columbaria L.	*colombaire.* F. ♄
ochroleuca L.	*jaune-pâle.* F. ♂
banatica *Wald. et Kitt. Hung.*	*de Hongrie.* ♂
suaveolens *Dec. Fl.*	*odorante.* F. ♆
lucida *Vill. Delph.*	*luisante.* Alpes. ♆
setifera *Encycl.*	*sétifère.* Italie. ☉
uniseta *Savi.*	*à une soie.* Italie. ♆
urceolata *Desf. Atl.* / rutæfolia *Valh. symb.* / divaricata *Encycl.*	*urcéolée.* Barbarie. ♄
argentea L.	*argentée.* orient. or. ♄
sicula L. *Mant.* / divaricata *Jacq. Austr.*	*de Sicile.* ☉
stellata L.	*étoilée.* F. m. ☉
parviflora *Desf. Atl.* / dichotoma *cirillo, Dec.*	*à petites fleurs.* Barbarie. ☉
prolifera L.	*prolifère.* orient. ☉
atropurpurea L	*des jardins.* Inde? ☉ (orn.)
africana L.	*d'Afrique.* or. ♄
caucasica *Marsch. cauc.*	*du Caucase.* ♄ (orn.)
cretica L.	*de Crète.* or. ♄
graminifolia L.	*à feuilles de Gramen.* F. Alpes.
palæstina L. *Mant.*	*de Palestine.* or. ♆

KNAUTIA
orientalis *L.*
plumosa *L. Mant.*

KNAUTIA
d'Orient. ⊙
plumeux. orient. ⊙

ORDO II.

VALERIANEÆ.

ORDRE II.

VALÉRIANÉES.

VALERIANA
rubra *L.*
angustifolia *All. ped.*
calcitrapa *L.*
dioica *L.*
officinalis *L.*
phu *L.*
tripteris *L.*
montana *L.*
tuberosa *L.*
celtica *L.*
saxatilis *L.*
pyrenaica *L.*

VALÉRIANE
rouge. F. ♆ (orn.)
à feuilles étroites. F. ♆
chausse-trape. orient. ⊙
dioïque. F. ♄
officinale. F. ♄ (méd.)
phu. F. ♄
à feuilles ternées. Alpes. ♄
de montagne. Alpes. ♆
tubéreuse. Alpes. ♄
Nard-celtique. Alpes. ♆
des rochers. Alpes. ♆
des Pyrénées. ♆

FEDIA
cornucopiæ *Vahl, sp.*
olitoria *Vahl, sp.*
vesicaria *Vahl, sp.*
coronata *Vahl, sp.*
echinata *Vahl, sp.*
sibirica *Vahl, sp.*

FÉDIA
corne-d'abondance. barb. ⊙
mâche. F. ⊙ (alim.)
vésiculeuse. orient. ⊙
couronnée. F. ⊙
hérissée. F. ⊙
de Sibérie. ♂

ORDO III.

RUBIACEÆ.

ORDRE III.

RUBIACÉES.

I. Fructus dicoccus dispermus; stamina sæpè 4.

I. 2 graines accolées; ordinairement 4 étamines.

SHERARDIA
arvensis *L.*
muralis *L.*

SHÉRARDIA
des champs. F. ⊙
des murailles. F. ⊙

ASPERULA
arvensis *L.*
odorata *L.*
galioides *Marsch. cauc.*
taurina *L.*
cynanchica *L.*
tinctoria *L.*
calabrica *L. f.*

ASPÉRULE
des champs. F. ⊙
odorante. F. ♄
à f. de caillelait. caucase. ♆
de Turin. Alpes. ♄
à l'esquinancie. F. ♆
des teinturiers. F. ♄
de Calabre. or. ♄

GALIUM. — *CAILLELAIT.*

1. *Fructu glabro.* — 1. Fruit glabre.

palustre L. — *des marais.* F. ♆
uliginosum L. — *aquatique.* F. ♄
lævе *Dec. Fl.* / umbellatum *Encycl.* — *lisse.* F. ♄
bocconi *All. Ped.* / nitidulum *Thuil. Fl.* — *de Boccone.* F. ♆
verum L. — *jaune.* F. ♆ (méd.)
rubrum L. / purpureum *Dec. Fl.* (non L.) — *pourpre.* F. ♄
rubrum *Dec. Fl.* / purpureum L. — *rouge.* F. ♄
mollugo L. — *blanc.* F. ♆
provinciale *Encycl.* — *de Provence.* ♆
lucidum *Pers. syn.* (excl. *syn.*) — *luisant.* F. ♆
megalospermum *Dec. Fl.* / arenarium *Lois. Fl.* — *des sables.* F. ♆
tyrolense *Willd. Enum.* — *du Tyrol.* ♆
spurium L. — *faux gratteron.* F. ☉
glaucum L. — *glauque.* F. ♄
rubioides L. — *à feuilles de garence.* F. ♄
sylvaticum L. — *des bois.* F. ♆
linifolium *Encycl.* — *à feuilles de Lin.* F. ♆
pumilum *Encycl.* / trichophyllum *All. Ped.* — *nain.* Alpes. ☉
anglicum *Smith, Fl.* — *d'Angleterre.* F. ☉
divaricatum *Encycl.* — *étalé.* F. ☉
tricorne *Smith, Fl.* — *à trois cornes.* F. ☉

2. *Fructu hispido aut aspero.* — 2. Fruit hérissé ou rude.

rotundifolium L. — *à feuilles rondes.* F. ♆
aparine L. — *gratteron.* F. ☉
hispidum *Willd. Enum.* / scaberrimum *Horn. Cat.* — *hérissé.* Égypte. ☉
vaillantii *Dec. Fl.* — *de Vaillant.* F. ☉
parisiense L. / litigiosum *Dec. Fl.* — *de Paris.* F. ☉
maritimum L. — *maritime.* F. ♄
villosum *Encycl.* — *velu.* Esp. ♄
boreale L. — *du Nord.* F. ♆

CRUCIANELLA — *CRUCIANELLE*
angustifolia L. — *à feuilles étroites.* F. ☉
latifolia L. — *à larges feuilles.* F. ☉
ciliata *Encycl.* — *ciliée.* orient. ☉
maritima L. — *maritime.* F. or. ♄

VALANTIA	*VALANTIA*
muralis L.	*des murailles.* F. ⊙
hispida L.	*velu.* F. ⊙
glabra L.	*glabre.* F. ⊙
articulata L.	*articulé.* orient. ⊙
Aparine L. / Galium saccharatum DEC. FL.	*à gros fruit.* F. ⊙
cruciata L.	*croisette.* F. ♃
RUBIA	*GARENCE*
tinctorum L.	*des teinturiers.* F. ♃ (arts.)
lucida *S. Veg.*	*luisante.* BARBARIE. or. ♄
angustifolia L. *Mant.*	*à f. étroites.* MINORQUE. or. ♄
cordifolia L. *Mant.*	*à feuilles en cœur.* RUSSIE. ♆
ANTHOSPERMUM	*ANTHOSPERMUM*
æthiopicum L.	*d'Ethiopie.* S. ch. ♄
II. Fructus dicoccus dispermus; stamina 4, *rariùs* 5 *aut* 6.	II. 2 graines accolées; 4 étamines, rarement 5 ou 6.
HOUSTONIA	*HOUSTONIA*
coccinea *Andr. Rep.* / IXORA americana *Jacq. H. Sch.* / BOUVARDIA triphylla *H. K.*	*écarlate.* MEXIQ. s. ch. ♄ (orn.)
SPERMACOCE	*SPERMACOCÉ*
verticillata L.	*verticillé.* ANTILLES. s. ch. ♄
tenuior L.	*grêle.* AM. m. ⊙
rubra *Jacq. H. Sch.*	*à fleurs rouges.* ⊙
PHYLLIS	*PHYLLIS*
nobla L.	*à f. ternées.* CANARIES. or. ♄
III. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus; stamina 5.	III. Un fruit à deux loges polyspermes; 5 étamines.
RANDIA	*RANDIA*
aculeata L.	*épineux.* ANTILLES. s. ch. ♄
PINCKNEIA	*PINCKNÉIA*
pubens *Mich. Fl.*	*pubescent.* AM. s. or. ♄
RONDELETIA	*RONDÉLÉTIA*
trifiora *Vahl. Symb.*	*à trois fleurs.* ANTILLES. s. ch. ♄
americana L.	*d'Amérique.* ANTILLES. s. ch. ♄
GARDENIA	*GARDÉNIA*
florida L.	*à grandes fl.* CAP. or. ♄ (orn.)
Thunbergia *H. K.*	*de Thunberg.* CAP. s. ch. ♄
spinosa *Thunb. Diss.*	*épineux.* CHINE. s. ch. ♄
radicans *Thunb. Diss.*	*rampant.* JAPON. s. ch. ♄
longiflora *H. K.* ?	*à long. fl.* SIERRA-LEONA. s. ch. ♄

IV. Fructus monocarpus bilocularis dispermus ; stamina 4.

IXORA
coccinea *L.*
alba *L.*

IV. Fructus monocarpus bilocularis dispermus ; stamina 4.

IXORA
écarlate. inde. s. ch. ♄ (orn.)
blanc. inde. s. ch. ♄

V. Fructus monocarpus bilocularis dispermus ; stamina 5.

SERISSA
fœtida.
LYCIUM fœtidum *L. f.*
LYCIUM indicum *RETZ. obs.*
LYCIUM japonicum *THUNB. JAP.*
BUCHOSIA coprosmoides *L'HER. GEN.*

V. Un fruit à deux loges monospermes ; 5 étamines.

SÉRISSA
fétide. JAPON. s. ch. ♄

CHIOCOCCA
racemosa *L.*

CHIOCOCCA
à grappes. ANTILLES. s. ch. ♄

PSYCHOTRIA
undulata *JACQ. H. SCH.*

PSYCHOTRIA
ondulé. ANTILLES. s. ch. ♄

COFFEA
arabica *L.*

CAFÉ
d'Arabie. s. ch. ♄ (écon.)

PÆDERIA
fœtida *L. MANT.*

PÉDÉRIA
fétide. inde. s. ch. ♄

VI. Fructus monocarpus multilocularis ; loculis monospermis ; stamina 4, 5, *aut plura.*

VI. Un fruit à plusieurs loges monospermes ; 4, 5 ou un plus grand nombre d'étamines.

GUETTARDA
scabra *VENT. ch. de PL.*
MATTHIOLA scabra *L.*

GUETTARDA
rude. ANTILLES. s. ch. ♄

PLOCAMA
pendula *H. K.*

PLOCAMA
incliné. CANARIES. or. ♄

VII. Fructus monocarpus multilocularis ; loculis polyspermis ; stamina 5.

VII. Un fruit à plusieurs loges polyspermes ; 5 étamines.

HAMELLIA
patens *L.*
lucida ?

HAMELLIA
étalé. ANTILLES. s. ch. ♄
à feuilles luisantes. s. ch. ♄

VIII. Flores aggregati supra receptaculum commune.

VIII. Fleurs aggrégées sur un réceptacle commun.

MITCHELLA
repens *L.*

MITCHELLA
rampant. AM. s. ♄

OPERCULARIA
ligustrifolia *JUSS. ANN.*

OPERCULARIA
à f. de troëne. N. HOLL. or. ♆

CEPHALANTHUS
occidentalis *L.*

CÉPHALANTE
d'Occident. AM. s. ♄ (orn.)

ORDO IV.

CAPRIFOLIA.

I. Calix caliculatus aut bracteatus; stylus 1 ; *corolla monopetala.*

LINNÆA
borealis *L.*

TRIOSTEUM
perfoliatum *L.*

SYMPHORICARPOS
parviflora.
LONICERA symphoricarpos *L.*

DIERVILLA
lutea.
LONICERA DIERVILLA *L.*

LONICERA.

1. *Caule volubili.*

parviflora *Encycl.*
dioica *H. K.*
caprifolium *L.*
periclymenum *L.*
sempervirens *L.*
japonica *Thunb. Jap.*

2. *Caule recto; pedunculis bifloris.*

tatarica *L.*
pyrenaica *L.*
nigra *L.*
cœrulea *L.*
xylosteum *L.*
alpigena *L.*

II. Calix caliculatus aut bracteatus; stylus 1 ; *corolla subpolypetala.*

VISCUM
album *L.*

III. Calix bracteatus; stylus 0 ; *stigmata* 3 ; *corolla monopetala.*

VIBURNUM
TINUS *L.*
— latifolius.
rigidum *Vent. Malm.*

ORDRE IV.

CHÈVREFEUILLES.

I. Calice caliculé ou accompagné de bractées; 1 style; corolle monopétale.

LINNÉE
boréale. Alpes. ♄

TRIOSTEUM
perfolié. Am. s. ♃

SYMPHORINE
à petites fl. Am. s. ♄ (orn.)

DIERVILLA
jaune. Am. s. ♄ (orn.)

CHÈVREFEUILLE.

1. Tige sarmenteuse.

à petites fleurs. Am. s. ♄ (orn.)
des jardins. F. m. ♄ (orn.)
des bois. F. ♄ (orn.)
toujours vert. Am. s. ♄ (orn.)
du Japon. or. ♄

2. Tige droite; pédoncules à deux fleurs.

de Tartarie. ♄ (orn.)
des Pyrénées. F. ♄ (orn.)
à fruit noir. Alpes. ♄ (orn.)
à fruit bleu. Alpes. ♄ (orn.)
velu. Alpes. ♄ (orn.)
des Alpes. ♄ (orn.)

II. Calice caliculé ou accompagné de bractées; 1 style; corolle presque polypétale.

GUI
blanc. F. ♄ (méd.)

III. Calice accompagné de bractées; style 0; 3 stigmates; corolle monopétale.

VIORNE
laurier-tin. Esp. ♄ (orn.)
— *à larges feuilles.*
à feuilles rudes. Madère. or. ♄

nudum L.	*nue.* Am. s. ♄ (orn.)
Lentago L.	*luisante.* Am. s. ♄ (orn.)
prunifolium L.	*à feuill. de prunier.* Am. s. ♄
pyrifolium *Encycl.*	*à feuill. de poirier.* Am. s. ♄
cassinoides L.	*à f. de cassiné.* Am. s. or. ♄
punicifolium	*à f. de grenadier.* Am. s. or. ♄
Lantana L.	*cotonneuse.* F. ♄
— canadensis.	— *de Canada.*
dentatum L.	*dentée.* Am. s. ♄
— longifolium.	— *à longues feuilles.*
acerifolium L.	*à f. d'Érable.* Am. s. ♄ (orn.)
opulus L.	*obier.* F. ♄ (orn.)
— sterilis.	— *boule-de-neige.* (orn.)
Sambucus	*Sureau*
Ebulus L.	*Hièble.* F. ♅ (méd.)
canadensis L.	*de Canada.* ♄
nigra L.	*noir.* F. ♄ (méd.)
— virescens.	— *à fruit vert.*
— laciniata.	— *lacinié.*
racemosa L.	*à grappes.* F. (orn.)
IV. Calix simplex; stylus 1; *corolla subpolypetala.*	IV. Calice simple; 1 style; corolle presque polypétale.
Cornus	*Cornouiller*
sanguinea L.	*sanguin.* F. ♄ (orn.)
alba L. *mant.*	*blanc.* Am. s. ♄ (orn.)
stricta *l'her. corn.*	*élancé.* Am. s. ♄ (orn.)
paniculata *l'her. corn.* / racemosa *Encycl.*	*paniculé.* Am. s. ♄ (orn.)
sericea *l'her. corn.* / Amomum *Miller. dict.* / cœrulea *Encycl.*	*à fruit bleu.* Am. s. ♄ (orn.)
circinata *l'her. corn.* / rugosa *Encycl.*	*à f. rondes.* Am. s. ♄ (orn.)
florida L.	*à grandes fl.* Am. s. ♄ (orn.)
mas L.	*mâle.* F. ♄ (orn.)
— flava.	— *à fruit jaune.*
alternifolia L. *f.*	*à f. alternes.* Am. s. ♄ (orn.)
Hedera	*Lierre*
Helix L.	*commun.* F. ♄ (méd. écon.)

CLASSIS XII.

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ.

(Stamina epigyna.)

ORDO I.

ARALIÆ.

CUSSONIA
thyrsoidea *Thunb. diss.*

ARALIA
capitata *swartz. prodr.*
hedera capitata *smith. ic. pict.*
arborea *L.*
spinosa *L.*
racemosa *L.*
hispida *mich. fl.*
nudicaulis *L.*

PANAX
quinquefolium *L.*
aculeatum *H. K.*
zanthoxylum trifoliatum *L.*
fruticosum *L.*

ORDO II.

UMBELLIFERÆ.

ÆGOPODIUM
podagraria *L.*

PIMPINELLA
saxifraga *L.*
magna *L. mant.*
— rubens.
dissecta *Retz. obs.*
peregrina *L.*
dioica *L. mant.*
villosa *schousb. maroc.*
bubonoides *brotero, fl.*

CLASSE XII.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(Etamines sur le pistil.)

ORDRE I.

ARALIES.

CUSSONIA
à fleurs en thyrse. cap. or. ♄

ARALIA
à fl. en tête. Antilles. s. ch. ♄
arbre. Antilles. s. ch. ♄
épineux. Am. s. ♄
à grappes. Am. s. ♄
velu. Am. s. ♄
à tige nue. Am. s. ♆

PANAX
Ginseng. Am. s. ♆ (méd.)
épineux. chine. or. ♄
lacinié. Amboine. s. ch. ♄

ORDRE II.

OMBELLIFÈRES.

EGOPODIUM
Podagraire. F. ♆

BOUCAGE
saxifrage. F. ♆
élevé. F. ♄
— rouge.
lacinié. Suisse. ♆
étranger. Italie. ♄
dioïque. F. ♆
velu. Maroc. or. ♄

glauca *willd. sp.*	*glauque.* F. ♂
Anisum *L.*	*Anis.* orient. (écon. méd.)
CARUM	*CARVI*
carvi *L.*	*cultivé.* F. ♂ (écon. méd.)
APIUM	*APIUM*
petroselinum *L.*	*persil.* sardaigne. ♂ (écon.)
— crispum.	*— crépu.*
— tuberosum.	*— tubéreux.*
graveolens *L.*	*des marais.* F. ♂
— celeri.	*— céleri.* (écon.)
prostratum *bill. N. holl.*	*couché.* N. holl. or. ♄
ANETHUM	*ANET*
segetum *L. mant.*	*des moissons.* portugal. ☉
graveolens *L.*	*fétide.* esp. ☉
fœniculum *L.*	*fenouil.* F. ♄ (écon. méd.)
SMYRNIUM	*MACERON*
olusatrum *L.*	*à feuilles ternées.* F. ♂
perfoliatum *L.*	*perfolié.* orient. ♂
integerrimum *L.*	*non denté.* am. s. ♄
PASTINACA	*PANAIS*
sativa *L.*	*cultivé.* F. ♂ (alim. méd.)
divaricata.	*étalé.* ♂
opopanax *L.*	*opopanax.* sicile. ♆ (méd.)
lucida *L. mant.*	*luisant.* mahon. ♂
THAPSIA	*THAPSIA*
villosa *L.*	*velu.* F. m. ♆
garganica *L. mant.*	*lisse.* F. m. ♄
SESELI	*SÉSÉLI*
montanum *L.*	*de montagne.* F. ♆
annuum *L.*	*annuel.* F. ♂
ammoides *L.*	*à feuilles d'Ammi.* portugal. ☉
elatum *L.*	*tuberculeux.* F. ♆
leucospermum *wald. et kitt. hung.*	*à graines blanches.* hongr. ♄
petræum *marsch. cauc.*	*des rochers.* caucase. ♆
tortuosum *L.*	*tortueux.* F. m. or. ♄
IMPERATORIA	*IMPÉRATOIRE*
ostruthium *L.*	*des Alpes.* ♆ (méd.)
sylvestris.	*des prés.* F. ♆
Angelica sylvestris *L.*	
verticillata *encycl.*	*verticillée.* F. ♄
Angelica verticillata *jacq. hort.*	
CHÆROPHYLLUM	*MYRRHIS*
sylvestre *L.*	*sauvage.* F. ♄

bulbosum *Z.*
temulum *Z.*
aromaticum *Z.*
aureum *Z.*
hirsutum *Z.*
coloratum *Z. Mant.*
tuberculosum.

bulbeux. F. ♂
tacheté. F. ♂
aromatique. Autriche. ♄
jaune. F. ♄
velu. F. ♄
coloré. Illyrie. ♂
tuberculeux. ♆

SCANDIX
odorata *Z.*
pecten *Z.*
australis *Z.*
pinnatifida *Vent. H. cels.*
cerefolium *Z.*
Anthriscus *Z.*

CERFEUIL
musqué. Alpes. ♄
peigne-de-Vénus. F. ☉
austral. F. m. ☉
pinnatifide. Perse. ☉
cultivé. F. ☉ (écon. méd.)
hérissé. F. ☉

CORIANDRUM
sativum *Z.*
testiculatum *Z.*

CORIANDRE
cultivée. Orient. ☉ (écon. méd.)
bilobée. Eur. austr. ☉

ÆTHUSA
cynapium *Z.*
Meum *S. Veg.*
Athamanta meum *Z.*
Bunius *S. Veg.*

ETHUSA
petite ciguë. F. ☉ (vénén.)
Meum. Alpes. ♄ (méd.)
à feuilles de coriandre. F. ♂

CICUTA
virosa *Z.*
maculata *Z.*

CIGUE
aquatique. F. ♄ (vénén.)
tachetée. Am. S. ♆ (vénén.)

PHELLANDRIUM
aquaticum *Z.*
Mutellina *Z.*

PHELLANDRIUM
aquatique. F. ♆ (vénén.)
des Alpes. ♆

ŒNANTHE
fistulosa *Z.*
crocata *Z.*
prolifera *Z.*
globulosa *Z.*
peucedanifolia *Pollich. Pal.*
pimpinelloides *Z.*

ŒNANTHÉ
fistuleux. F. ♆
à feuilles de persil. F. ♆
prolifère. Sicile. ♆
globuleux. F. ♂
à f. de peucedanum. Allem. ♆
à feuilles de boucage. F. ♄

CUMINUM
cyminum *Z.*

CUMIN
officinal. Orient. ☉ (méd.)

BUBON
macedonicum *Z.*
Galbanum *Z.*
gummiferum *Z.*

BUBON
de Macédoine. ♂
galbanum. Cap. Or. ♄ (méd.)
gommifère. Cap. Or. ♄

SISON
segetum *Z.*

SISON
des moissons. F. ♂

Amomum *L.*	*Amomum.* F. ♂
canadense *L.*	*de Canada.* ♄
Ammi *L.*	*Ammi.* orient. ☉
inundatum *L.*	*aquatique.* F. ☉
verticillatum *L.*	*verticillé.* F. ♄
Sium	*Berle*
angustifolium *Jacq. Austr.*	*à feuilles étroites.* F. ♆
latifolium *L.*	*à feuilles larges.* F. ♆
nodiflorum *L.*	*nodiflore.* F. ♄
repens *L. f.*	*rampante.* F. ♄
sisarum *L.*	*chervi.* F. ♄ (alim.)
Falcaria *L.*	*falciforme.* F. ♄
siculum *L.*	*de Sicile.* ♆
Angelica	*Angélique*
Archangelica *L.*	*de Bohême.* Alpes. ♂ (écon. méd.)
lucida *L.*	*luisante.* Am. S. ♂
aquilegifolia. Laserpitium aquilegifolium *Jacq. Austr.*	*à feuill. d'Ancolie.* Autriche. ♆
Ligusticum	*Livèche*
Levisticum L.	*officinale.* Alpes. ♄ (écon. méd.)
peloponense *L.*	*cicutaire.* carniole. ♆
pyrenæum *Gouan. Ill.* selinum seguieri *Willd. sp.*	*des Pyrénées.* F. ♄
apiifolium *Encycl.* cicutæfolium *Vill. Delph.*	*à feuilles de persil.* Alpes. ♄
austriacum *Jacq. Austr.*	*d'Autriche.* F. ♄
peregrinum *S. Veg.*	*à feuill. de céleri.* portugal. ♂
Heracleum	*Berce*
sphondylium *L.*	*des prés.* F. ♆ (écon. méd.)
longifolium *Jacq. Austr.*	*à feuilles longues.* F. ♄
alpinum *L.*	*des Alpes.* ♄
pumilum *Vill. Delph.*	*naine.* Alpes. ♆
laciniatum.	*laciniée.* sibérie. ♄
sibiricum *L. Mant.*	*de Sibérie.* ♄
amplifolium *Lapeyr. Fl.* pyrenaicum *Dec. Fl.*	*à grandes feuilles.* pyrénées. ♆
Laserpitium	*Laser*
latifolium *L.*	*à larges feuilles.* F. ♄
gallicum *L.*	*cunéiforme.* F. ♄
— crispum.	*— crépu.*
siler *L.*	*lancéolé.* F. ♆
triquetrum *Vent. H. cels.*	*triangulaire.* Asie. or. ♄

FERULA	*FÉRULE*
communis *L.*	*commune.* EUR. AUSTR. ♆
FERULAGO *L.*	*luisante.* BARBARIE. ♄
tingitana *L.*	*de Tanger.* ♄
nodiflora *L.*	*nodiflore.* ORIENT. ♄
sibirica.	
PEUCEDANUM SIBIRICUM *Wald. et Kitt. HUNG.*	*de Sibérie.* ♄
PEUCEDANUM	*PEUCÉDANUM*
officinale *L.*	*officinal.* F. ♄
italicum *L.*	*d'Italie.* ♆
gallicum.	
parisiense *DEC. FL.*	*des bois.* F. ♄
album.	
minus *ENCYCL.* (an *L.* ?)	*à fleurs blanches.* ♆
tenuifolium *ENCYCL.*	*à feuilles menues.* ♄
silaus *L.*	*des prés.* F. ♆
tauricum *MARSCH. CAUC.*	*de la Tauride.* ♆
alsaticum *L.*	*d'Alsace.* F. ♆
CACHRYS	*CACHRYS*
tomentosa *DESF. ATL.*	*cotonneux.* BARBARIE. OR. ♄
panacisfolia *VAHL, SYMB.*	
LIBANOTIS *L.*	*LIBANOTIS.* SICILE. OR. ♆
sicula *L.*	*de Sicile.* OR. ♄
CRITHMUM	*CRITHMUM*
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♄ (écon.)
ATHAMANTA	*ATHAMANTA*
LIBANOTIS *L.*	*LIBANOTIS.* ALLEM. ♄
condensata *L.*	*à fleurs serrées.* SIBÉRIE. ♆
sibirica *L. MANT.*	*de Sibérie.* ♄
cervaria *L.*	*à feuilles luisantes.* F. ♄
latifolia *VIVIANI FRAG.*	*à larges feuilles.* F. ♄
oreoselinum *L.*	*oréosélinum.* F. ♆
MATTHIOLI *JACQ. IC.*	*de Matthiole.* CARINTHIE. ♆
sicula *L.*	*de Sicile.* OR. ♄
cretensis *L.*	*de Crète.* ALPES. ♆
SELINUM	*SÉLINUM*
chabræi *JACQ. AUSTR.*	*de Chabréus.* F. ♄
sylvestre *DEC. FL.*	*tortueux.* F. ♆
ATHAMANTHA FLEXUOSA *H. PAR.*	
palustre *L.*	*des marais.* F. ♆
pyrenæum *GOUAN, ILL.*	*des Pyrénées.* ♆
seseli pyrenæum *L.*	
peregrinum *WILLD. ENUM.*	*étranger.* ♆
peucedanoides.	*à feuilles de PEUCÉDANUM.* ♆

austriacum *Jacq. Austr.*	*d'Autriche.* ♄
carvifolia *Jacq. Austr.*	*à feuilles de carvi.* F. ♄
Monnieri *L.*	*de le Monnier.* F. m. ☉
elegans *Balbis.*	*à feuilles menues.* ♄
latifolium *Marsch. cauc.*	*à larges feuilles.* caucase. ♆
decipiens *Willd. sp.*	*arbrisseau.* or. ♄
Conium	***Conium***
maculatum *L.*	*ciguë des jardins.* F. ♂ (vén.)
Bunium	***Bunium***
Bulbocastanum *L.*	*Terre-noix.* F. ♄
Ammi	***Ammi***
majus *L.*	*officinal.* F. ☉ (méd.)
Visnaga. / Daucus visnaga *L.*	*Bisnâgre.* F. ☉
Daucus	***Carotte***
meoides. / Ammi meoides *Pers. syn.* / Ammi anethifolium *Encycl.*	*à feuilles de Méum.* ♆
carota *L.*	*cultivée.* F. ♂ (alim. méd.)
crinitus *Desf. Atl.*	*chevelue.* Barbarie. or. ♆
Caucalis	***Caucalis***
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F. ☉
daucoides *L.*	*à feuilles de carotte.* F. ☉
latifolia *S. Veg.*	*à larges feuilles.* F. ☉
platicarpos *L.*	*à gros fruit.* F. ☉
humilis *Jacq. Hort.*	*à feuilles menues.* F. ☉
maritima *Cav. Ic.*	*maritime.* F. ☉
hispida.	*hérissée.* ☉
orientalis *Willd. sp.*	*d'Orient.* or. ♄
Anthriscus *Willd. sp.* / Tordylium anthriscus *L.*	*Anthriscus.* F. ☉
arvensis *Willd. sp.*	*des champs.* F. ☉
nodosa *Willd. sp.* / Tordylium nodosum *L.*	*nodiflore.* F. ☉
Tordylium	***Tordylium***
syriacum *L.*	*de Syrie.* ☉
officinale *L.*	*officinal.* F. m. ☉
apulum *L.*	*d'Italie.* ☉
maximum *L.*	*lancéolé.* F. m. ☉
Buplevrum.	***Buplèvre.***
1. *Herbacea.*	1. Tige herbacée.
rotundifolium *L.*	*à feuilles rondes.* F. ☉
longifolium *L.*	*à feuilles longues.* Alpes. ♄
stellatum *L*	*étoilé.* Alpes. ♆

petræum L.
ranunculoides L.
falcatum L.
semicompositum L.
odontites L.
junceum L.
tenuissimum L.
rigidum L.

des rochers. Alpes. ♄
renoncule. Alpes. ♄
falciforme. F. ♆
demi-composé. F. m. ☉
odontitès. F. m. ☉
jonciforme. F. ☉
filiforme. F. ☉
à feuilles dures. F. m. or. ♄

2. *Fruticosa.*

2. Tiges ligneuses.

spinosum L. *f.*
fruticosum L.
coriaceum *l'Her. stirp.*
gibraltaricum *Encycl.*
obliquum *Vahl, symb.*
arborescens *Jacq. ic.*

épineux. Esp. or. ♄
arbrisseau. F. m. ♄ (orn.)
coriace. Barbarie. or. ♄

ECHINOPHORA
tenuifolia L.

ECHINOPHORA
à petites feuilles. orient. ♆

ASTRANTIA
major L.
minor L.
caucasica *Fischer.*
heterophylla *Marsch. cauc.*

ASTRANTIA
à grandes fl. Alpes. ♄ (orn.)
à petites fleurs. Alpes. ♆
du Caucase. ♄
à feuilles variables. cauc. ♆

SANICULA
europæa L.
marylandica L.

SANICLE
d'Europe. F. ♄ (méd.)
de Maryland. ♆

ERYNGIUM
planum L.
aquaticum L.
dichotomum *Desf. Atl.*
pusillum L.
alpinum L.
asperifolium *Laroche, Eryng.*
oliverianum *Laroche, Eryng.*
spina-alba *Vill. Delph.*
campestre L.
dilatatum *Encycl.*
Bourgati *Gouan. Ill.*
maritimum L.
tenue *Desf. Atl.*
corniculatum *Encycl.*

ERYNGIUM
à feuilles planes. F. ♂
aquatique. Am. s. ♆
dichotome. Alger. ☉
petit. Barbarie. or. ♆
des Alpes. ♄ (orn.)
à feuilles rudes. ♄
d'olivier. orient. or. ♄
à épines blanches. Alpes. ♄
des champs. F. ♆ (méd.)
dilaté. Maroc. ♆
Bourgati. F. m. ♆
maritime. F. ♄
filiforme. Alger. ☉
cornu. Portugal. or. ♆

HYDROCOTYLE
vulgaris L.
sibthorpioides *Encycl.*

HYDROCOTYLE
Ecuelle-d'eau. F. ♆
à f. de sibthorpia. île de Fr. s. ch. ♆

spananthe *willd. sp.*
spananthe paniculata *jacq. ic.*

barbu. caracas. ☉

LAGOECIA
cuminoides *L.*

LAGOÉCIA
à feuilles de cumin. F. m. ☉

CLASSIS XIII.

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ.

(Stamina hypogyna.)

CLASSE XIII.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(Etamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

RANUNCULACEÆ.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

CLEMATIS.

1. *Scandentes.*

viorna *L.*
viticella *L.*
crispa *L.*
florida *Thunb. jap.*
orientalis *L.*
vitalba *L.*
virginiana *L.*
flammula *L.*
cirrhosa *L.*
triternata.
calicina *H. K.*
balearica *Encycl.*

2. *Erectæ.*

erecta *L.*
integrifolia *L.*

ATRAGENE
alpina *L.*
— flava.
indica.

THALICTRUM
saxatile *Vill. Delph.*

ORDRE I.

RENONCULACÉES.

I. Capsules monospermes, ne s'ouvrant pas.

CLÉMATITE.

1. Tiges sarmenteuses.

viorne. Am. s. ♄
bleue. Esp. ♄ (orn.)
crépue. Caroline. ♄
à grandes fl. Jap. or. ♄ (orn.)
d'Orient. ♄
brûlante. F. ♄ (vénén.)
de Virginie. ♄
odorante. F. m. ♄ (orn.)
à vrilles. Alger. ♄ (orn.)
triternée. ♄
à grand calice. Mahon. ♄

2. Tiges droites.

droite. F. m. ♃
à feuilles entières. Autr. ♆

ATRAGÉNE
des Alpes. ♄
—jaune.
des Indes. S. ch. ♄

PIGAMON
des rochers. Alpes. ♆

fœtidum L.
sibiricum L. ?
minus L.
majus *Jacq. Austr.*
nigricans *Jacq. Austr.*
angustifolium L.
crenatum.
flavum L.
angulosum.
glaucum.
speciosum *Encycl.*
rugosum.
elatum *Jacq. Hort.*
cinereum.
medium *Jacq. Hort.*
atropurpureum *Jacq. Hort.*
aquilegifolium L.

ANEMONE
hepatica L.
vernalis L.
pulsatilla L.
alpina L.
apiifolia *Willd. sp.*
coronaria L.
pavonina *Encycl.*
stellata *Encycl.*
hortensis L.
sylvestris L.
virginiana L.
dichotoma L.
trifolia L.
nemorosa L.
ranunculoides L.
narcissiflora L.
Thalictroides L.

ADONIS
æstivalis L.
autumnalis L.
vernalis L.

ANAMENIA
coriacea *vent. malm.*
Adonis capensis L.

RANUNCULUS.

1. *Foliis simplicibus.*

Flammula L.

fétide. F. ♆
de Sibérie. ♄
des bois. F. ♆
élevé. Autriche. ♄
noirâtre. Autriche. ♄
à feuilles étroites. F. ♆
crénelé. ♄
des prés. F. ♄
anguleux. ♄
glauque. ♆
ridé. ♄
élevé. Hongrie. ♄
cendré. ♄
moyen. Hongrie. ♆
à feuill. d'Ancolie. Alpes. ♄

ANÉMONE
hépatique. Eur. ♆ (orn.)
printanière. F. ♆
pulsatille. F. ♆
des Alpes. ♄
à feuilles de Persil. Alpes. ♆
des jardins. orient. ♄ (orn.)
œil-de-paon. orient. ♄ (orn.)
étoilée. F. m. ♄ (orn.)
sauvage. F. ♆
de Virginie. ♆
dichotome. canada. ♆
à trois feuilles. F. ♆
des bois. F. ♄
Renoncule. F. ♄
à fleurs de Narcisse. Alpes. ♄
à f. de Pigamon. Am. s. ♆

ADONIS
d'été. F. ☉
d'automne. F. ☉
printanier. Alpes. ♄

ANAMÉNIA
à feuilles coriaces. cap. or. ♆

RENONCULE.

1. Feuilles simples.

petite Douve. F. ♄

Lingua L.	*lancéolée.* F. ♆
gramineus L.	*à feuilles de Gramen.* F. ♌
nodiflorus L.	*nodiflore.* F. ♆
ophioglossoides *vill. delph.*	*à f. d'ophioglosse.* Alpes. ♆
pyrenæus L. *mant.*	*des Pyrénées.* ♆
amplexicaulis L.	*amplexicaule.* Alpes. ♌
parnassifolius L.	*à feuill. de Parnassia.* Alpes. ♌
Ficaria L.	*petite chélidoine.* F. ♆ (méd.)
Thora L.	*Thora.* Alpes. ♌ (vén.)

2. *Foliis dentatis et divisis.*

2. Feuilles dentées et découpées.

creticus L	*de Crète.* ♌ (orn.)
lacerus *Bellardi, App.*	*lacéréc.* Alpes. ♆
auricomus L.	*printanière.* F. ♆
sceleratus L.	*scélérate.* F. ♌ (vén.)
pensylvanicus L. *f.* / canadensis *Jacq. ic.*	*de Pensylvanie.* ♆
aconitifolius L.	*à feuilles d'Aconit.* Alpes. ♆
platanifolius L. *mant.*	*à feuilles de Platane.* Alpes. ♆
asiaticus L.	*d'Asie.* ♆
glacialis L.	*des glaciers.* Alpes. ♌
abortivus L.	*arbortive.* canada. ♆
nivalis L.	*des neiges.* Alpes. ♆
alpestris L.	*des Alpes.* ♆
hirsutus *curt. fl.* / pallidior *vill. delph.* / philonotis *Retz. obs.*	*velue.* F. ☉
tuberosus *Lapeyr. fl.*	*tubéreuse.* Pyrénées. ♌
bulbosus L.	*bulbeuse.* F. ♆
repens L.	*rampante.* F. ♆
acris L.	*âcre.* F. ♆
lanuginosus L.	*lanugineuse.* F. ♆
polyanthemos L.	*multiflore.* F. ♆
chærophyllos L.	*à feuilles de cerfeuil.* F. ♌
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
muricatus L.	*hérissée.* F. ☉
trilobus *Desf. Atl.*	*trilobée.* Alger. ☉
parviflorus L.	*à petites fleurs.* F. ☉
falcatus L.	*falciforme.* F. m. ☉
hederaceus L.	*à feuilles de lierre.* F. ♆
aquatilis L.	*aquatique.* F. ♌
— circinatus.	— *arrondie.*
peucedanifolius *Desf. Atl.* / fluviatilis *Willd. sp.*	*à feuill. de Peucédanum.* F. ♌
MYOSURUS	*MYOSURUS*
minimus L.	*queue-de-souris.* F. ☉

II. Capsulæ polyspermæ.

TROLLIUS
asiaticus L.
europæus L.

HELLEBORUS
hyemalis L.
niger L.
viridis L.
fœtidus L.
lividus H. K.

ISOPYRUM
thalictroides L.
fumarioides L.

NIGELLA
damascena L.
sativa L.
arvensis L.
hispanica L.
orientalis L.

GARIDELLA
nigellastrum L.

AQUILEGIA
vulgaris L.
alpina L.
viridiflora H. K.
canadensis L.

DELPHINIUM.

1. *Unicapsularia.*

consolida L.
ajacis L.

2. *Capsulæ* 3 *ad* 5.

ambiguum L.
peregrinum L.
grandiflorum L.
puniceum L. *f.*
revolutum.
elatum L.
— hirsutum.
staphisagria L.

ACONITUM.

1. *Corolla flava.*

lycoctonum L.

II. Capsules polyspermes.

TROLLIUS
d'Asie. ♄ (orn.)
d'Europe. Alpes. ♆

HELLÉBORE
d'hiver. Alpes. ♆
noir. Alpes. ♆ (orn.)
vert. F. ♆
pied-de-griffon. F. ♆ (méd.)
livide. Corse. ♄

ISOPYRUM
à feuilles de pigamon. F. ☉
à feuilles de fumeterre. F. ☉

NIGELLE
à involucres. F. m. ☉ (orn.)
cultivée. Orient. ☉
des champs. F. ☉
d'Espagne. ☉
d'Orient. ☉

GARIDELLE
de Provence. ☉

ANCOLIE
des jardins. F. ♄ (orn.)
des Alpes. ♄
à fleurs vertes. Sibérie. ♄
de Canada. ♄ (orn.)

DELPHINIUM.

1. Une capsule.

des moissons. F. ☉
d'Ajax. Suisse. ☉ (orn.)

2. 3 à 5 capsules.

de deux couleurs. Maroc. ☉
étranger. Barbarie. ☉
à grandes fleurs. Sibérie. ♆
ponceau. Sibérie. ♄
à feuilles recourbées. ♄
élevé. Sibérie. ♆ (orn.)
— *velu.*
staphisaigre. F. m. ♂ (vén. méd.)

ACONIT.

1. Corolle jaune.

tue-loup. Alpes. ♆ (vén.)

pyrenaicum L.
Anthora L.

2. *Corolla cærulea.*

Napellus L.
cammarum L.

Caltha
palustris L.

Pæonia
Moutan *Bot. Mag.*
mascula L. } corallina *Retz. obs.*
fœmina L. } officinalis *Retz. obs.*
villosa. } humilis *Retz. obs.*
lobata.
albiflora *Pallas*, *Ross.*
anomala L. *Mant.*
tenuifolia L.

Zanthorhiza
apiifolia *l'Her. Stirp.*

III. Germen 1; *bacca unilocularis, polysperma.*

Actæa
spicata L.
— alba.
— rubra.
racemosa L.

Podophyllum
peltatum L.

des Pyrénées. ♆ (vén.)
Anthora. Alpes. ♄

2. Corolle bleue.

Napel. Alpes. ♄ (vén.)
à grandes fleurs. F. Alpes. (vén.)

Caltha
des marais. F. ♆ (orn.)

Pivoine
en arbre. chine. or. ♄ (orn.)
mâle. suisse. ♆ (orn. méd.)
femelle. Alpes. ♆ (orn. méd.)
velue. esp. ♆ (orn.)
lobée. ♆
à fl. blanches. sibérie. ♄ (orn.)
laciniée. sibérie. ♆ (orn.)
à f. menues. sibérie. ♆ (orn.)

Zanthorhiza
à feuilles de persil. Am. s. ♄

III. Un seul ovaire; baie à une loge polysperme.

Actéa
des Alpes. ♄ (méd.)
— à fruit blanc.
— à fruit rouge.
à grappes. Am. s. ♆

Podophyllum
en bouclier. Am. s. ♆

ORDO II.

PAPAVERACEÆ.

I. Stamina indefinita; antheræ filamentis adnatæ.

Sanguinaria
canadensis L.

Argemone
mexicana L.

Papaver.

1. *Capsulis hispidis.*

hybridum L.

ORDRE II.

PAPAVÉRACÉES.

I. Etamines indéfinies; anthères attachées le long du bord des filets.

Sanguinaire
de Canada. ♄

Argémone
du Mexique. ☉

Pavot.

1. Capsules hérissées.

hybride. F. ☉.

Argemone L.
alpinum L.
nudicaule L.

2. Capsulis glabris.

rhœas L.
dubium L.
cambricum L.
orientale L.
somniferum L.
— nigrum.

CHELIDONIUM
glaucium L.
corniculatum L.
hybridum L.
majus L.
— quercifolium.

II. Stamina definita.

BOCCONIA
frutescens L.
cordata *Willd. sp.*

HYPECOUM
procumbens L.

FUMARIA
cucullaria L.
bulbosa L.
solida *Smith, Fl.*
nobilis *S. Veg.*
fungosa *H. K.*
sempervirens L.
aurea *Willd. Enum.*
lutea L. *Mant.*
vesicaria L.
parviflora *Encycl.*
officinalis L.
capreolata L.
claviculata L.
spicata L.

Argémone. F. ☉
des Alpes. ♆
à tiges nues. Alpes. ♄

2. Capsules glabres.

coquelicot. F. ☉ (méd.)
à long fruit. F. ☉
jaune. Alpes. ♆
d'Orient. ♆ (orn.)
des jardins. F. ☉ (orn. méd.)
— *à graines noires.*

CHÉLIDOINE
glauque. F. ♂
cornue. F. m. ☉
hybride. F. m. ☉
officinale. F. ♄ (méd.)
— *à feuilles de chêne.*

II. Etamines définies.

BOCCONIA
arbrisseau. Antilles. s. ch. ♄
à f. en cœur. chine? s. ch. ♄

HYPÉCOUM
tombant. F. ☉

FUMETERRE
capuchon. Am. s. ♄
bulbeuse. F. ♄ (orn.)
solide. F. ♆ (orn.)
odorante. sibérie. ♄
fongueuse. Am. s. ♆
toujours verte. Am. s. ☉
dorée. canada. ♂
jaune. barbarie. ♆
vésiculeuse. cap. ☉
à petites fleurs. F. ☉
officinale. F. ☉ (méd.)
à vrilles. F. m. ☉
claviculée. F. m. ☉
à épis. F. m. ☉

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. Siliquosæ.

RAPHANUS
sativus L.

ORDRE III.

CRUCIFÈRES.

I. Siliqueuses.

RAIFORT
cultivé. chine. ☉ (alim.)

— rotundus.	— *radis.*
— niger.	— *noir.*
Raphanistrum L.	*des moissons.* F. ☉
tenellus *Pallas, Itin.* / chorispermum tenellum *H.K.*	*délicat.* sibérie. ☉
Sinapis	***Moutarde***
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
alba L.	*blanche.* F. ☉
nigra L.	*noire.* F. ☉ (écon.)
incana L.	*incane.* F. ♂
pubescens L. *Mant.*	*pubescente.* sicile. or. ♆
pyrenaica L.	*des Pyrénées.* F. ♆
hispida *schousb. maroc.*	*hérissée.* Maroc. ☉
hastata.	*à feuilles hastées.* N. Holl. ☉
integrifolia *willd. hort.*	*à feuilles entières.* ☉
lævigata L.	*lisse.* Esp. ☉
juncea L.	*jonciforme.* chine. ☉
erucoides L.	*fausse* Roquette. F. ☉
Brassica	***Chou***
cheiranthus *Vill. Delph.*	*à fleur de cheiri.* Alpes. ♂
Eruca L.	Roquette. F. ☉
Erucastrum L.	*fausse* Roquette. F. ☉
Tournefortii *Gouan, Ill.*	*de Tournefort.* F. ☉
alpina L. *Mant.*	*des Alpes.* ♄
vesicaria L.	*vésiculeux.* Esp. ☉
oleracea L.	*commun.* F. ♂ (alim.)
— sylvestris.	— *sauvage.*
— sabellica.	— *frisé.*
— gongliodes.	— *rave.*
— botrytis.	— *fleur.*
— viridis.	— *vert.*
— capitata.	— *pommé.*
— rubra.	— *rouge.*
Rapa L.	*Turneps.* F. ♂ (alim.)
Napus L.	*navet.* F. ♂ (alim.)
asperifolia sylvestris *Encycl.*	*navette.* F. ☉ (écon.)
arvensis L. *Mant.*	*violet.* F. ♆
campestris L.	*des champs.* F. ☉
orientalis L.	*d'Orient.* F. ☉
Turritis	***Tourette***
glabra L.	*glabre.* F. ♂
hirsuta L. / Arabis hispida *Encycl.*	*velue.* F. ♂
hispida. / Arabis hispida L. *f.*	*hérissée.* Alpes. ♆
bellidifolia. / Arabis bellidifolia L. *Mant.*	*à f. de* Paquerette. Alpes. ♄

verna. Arabis alpina L.	*printanière.* Alpes. ♆
— minor.	*— à petites fleurs.*
saxatilis. Arabis saxatilis *All. ped.*	*des rochers.* Alpes. ☉
thaliana. Arabis thaliana L.	*paniculée.* F. ☉
pendula. Arabis pendula L.	*pendante.* Alpes. ♂
HESPERIS	*JULIENNE*
matronalis L.	*cultivée.* Alpes. ♂ (orn.)
tristis L.	*à fleurs brunes.* Autriche. ♂
lyrata *Encycl.*	*à feuilles en lyre.* Sibérie. ☉
africana L.	*d'Afrique.* F. m. ☉
laxa *Encycl.*	*à fleurs lâches.* Tartarie. ☉
verna L.	*printanière.* F. m. ☉
maritima. Cheiranthus maritimus L.	*de Mahon.* ☉ (orn.)
chia. Cheiranthus chius L.	*de Chio.* orient. ☉
linifolia. Cheiranthus linifolius *pers. syn.*	*à feuilles de lin.* Esp. or. ♅
HELIOPHILA	*HÉLIOPHILA*
pendula *willd. sp.*	*à fruit pendant.* cap. ☉
CHEIRANTHUS	*GIROFLÉE*
cheiri L.	*jaune.* F. ♂ (orn.)
mutabilis *l'Her. stirp.*	*changeante.* canaries. or. ♄
longifolius *vent. malm.*	*à long feuill.* canar. or. ♄
semperflorens *schousb. maroc.*	*de tous les mois.* Maroc. or. ♄
scoparius *willd. enum.*	*à balais.* canaries. or. ♄
fenestralis L.	*Fenestrelle.* ♂ (orn.)
sinuatus L.	*sinuée.* F. ☉
incanus L.	*incane.* Esp. ♅
annuus L.	*quarantain* Eur. austr. ☉ (orn.)
græcus. Hesperis æstiva *Encycl. var.* B.	*grecque.* orient. ☉ (orn.)
littoreus L.	*des rivages.* F. m. ♂
tristis L.	*brune.* F. m. or. ♆
cuspidatus *marsch. cauc.*	*à long style.* Caucase. ♂
parviflorus *willd. sp.*	*à petites fleurs.* Maroc. ☉
tricuspidatus L.	*à trois pointes.* F. m. ☉
ERYSIMUM	*ERYSIMUM*
officinale L.	*officinal.* F. ☉ (méd.)
barbarea L.	*à feuilles en lyre.* F. ♆
præcox *smith, fl.*	*printanier* F. ♂
alliaria L.	*alliaire.* F. ♂ (méd.)

repandum L. cheiranthus paniculatus Encycl.	*festonné.* F. ⊙
cheiranthoides L.	*à petites fleurs.* F. ⊙
hieracifolium L.	*à feuilles d'Épervière.* F. ♂
helveticum. cheiranthus helveticus Jacq. Hort.	*d'Helvétie.* ♄
sylvestre. cheiranthus sylvestris Encycl. cheiranthus erysimoides L.	*sauvage.* F. ♄
alpinum. cheiranthus alpinus L.	*des Alpes.* ♄
quadrangulum. cheiranthus quadrangulus Wer. stirp. cheiranthus cornutus Encycl.	*à long style.* sibérie. ♄

Sisymbrium.	Cresson.
1. *Siliquis declinatis, brevibus.*	1. Siliques courtes et abaissées.
nasturtium L.	*de fontaine.* F. ♆ (alim. méd.)
palustre Willd. sp. terrestre Smith, Fl.	*des marais.* F. ⊙
sylvestre L.	*sauvage.* F. ⊙
amphibium L.	*amphibie.* F. ♆
pyrenaicum L.	*des Pyrénées.* ♄
tanacetifolium L.	*à feuill. de Tanaisie.* Alpes. ♄
tenuifolium L.	*fausse Roquette.* F. ♆
erysimifolium. Allioni Pers. syn.	*à feuilles de Vélar.* F. ♂
2. *Siliquis sessilibus, axillaribus.*	2. Siliques sessiles, axillaires.
polycerastium L.	*à siliques nombreuses.* F. ⊙
supinum L.	*couché.* F. ⊙
bursifolium L.	*à feuilles de Tabouret.* F. ⊙
3. *Caule nudo.*	3. Tige nue.
murale L. Erucastrum Gouan, Ill.	*des murailles.* F. ⊙
vimineum L.	*grêle.* F. ⊙
arenosum L.	*des sables.* Alpes. ⊙
4. *Foliis pinnatis.*	4. Feuilles pennées.
nitidum Zea.	*à feuilles luisantes.* ⊙
sophia L.	*sophia.* F. ⊙
altissimum L.	*élevé.* F. ⊙
asperum L.	*à fruit rude.* F. ♆
irio L.	*Irio.* F. ⊙

columnæ *Jacq. Austr.*
Lœselii *L.*
obtusangulum *Willd. sp.*

5. Foliis integris.

strictissimum *L.*
junceum.
Erysimum junceum *Willd. sp.*

CARDAMINE.

1. Foliis simplicibus.

alpina *Willd. sp.*
bellidifolia *All. Ped.*
asarifolia *L.*

2. Foliis ternatis.

resedifolia *S. Veg.*
trifolia *L.*

3. Foliis pinnatis.

chelidonia *L.*
impatiens *L.*
hirsuta *L.*
parviflora *L.*
pratensis *L.*

DENTARIA
enneaphylla *L.*
pinnata *Encycl.*
heptaphyllos *Vill. Delph.*
pentaphyllos *L.*

II. Siliculosæ.

RICOTIA
ægyptiaca *L.*

LUNARIA
rediviva *L.*
annua *L.*

BISCUTELLA
auriculata *L.*
lævigata *L. Mant.*
apula *L. Mant.*
depressa *Willd. Enum.*
leiocarpa *Dec. Ann.*
obovata *Dec. Ann.*
raphanifolia *Desf. Atl.*
cichoriifolia *Dec. Ann.*

CLYPEOLA
jonthlaspi *L.*

de Colonna. F. ⊙
de Loesel. F. ⊙
à angles obtus. Alpes. ⊙

5. Feuilles entières.

ramassé. Alpes ⊙
jonciforme. Hongrie. ♂

CARDAMINÉ.

1. Feuilles simples.

des Alpes. ♆
à feuilles d'Asarum. Alpes. ♄

2. Feuilles ternées.

à feuilles de Réséda. Alpes. ♄
à feuilles ternées. F. ♆

3. Feuilles pennées.

à feuilles de chélidoine. F. ♄
élastique. F. ♂
velu. F. ⊙
à petites fleurs. F. ⊙
des prés. F. ♆

DENTAIRE
à neuf feuilles. Alpes. ⊙
pennée. Alpes. ♄
à cinq feuilles. Alpes. ♄

II. Siliculeuses.

RICOTIA
d'Egypte. ⊙

LUNAIRE
vivace. F. ♆ (orn.)
annuelle. F. ⊙ (orn.)

BISCUTELLE
auriculée. F. ⊙
à fruit lisse. F. ⊙
à fruit rude. F. ⊙
d'Egypte. ⊙
à petit fruit. F. ⊙
ovale renversé. F. ⊙
à feuilles de nai ort. F. ⊙
à f. de chicorée. Pyrénées. ♆

CLYPÉOLA
jonthlaspi. F. m. ⊙

maritima L. *Mant.* Alyssum maritimum *Willd. sp.*	*maritime.* F. ♂
alliacea. Peltaria alliacea L.	*à odeur d'Ail.* Autriche. ♆
ALYSSUM.	*ALYSSON.*
1. *Fruticulosa.*	1. Tige ligneuse.
spinosum L.	*épineux.* F. m. ♄
saxatile L.	*des rochers.* orient. ♄
alpestre L. *Mant.*	*des Alpes.* ♄
2. *Herbacea.*	2. Tige herbacée.
argenteum *Willd. sp.*	*argenté.* Alpes. ♆
incanum L.	*blanc.* F. ♂
montanum L.	*des montagnes.* Alpes. ♇
campestre L.	*des champs.* F. ☉
calicinum L.	*à petites fleurs.* F. ☉
clypeatum L.	*en bouclier.* Liban. or. ♂
3. *Siliculis inflatis.*	3. Silicules renflées.
deltoideum L.	*deltoïde.* syrie. or. ♆
sinuatum L.	*sinué.* Esp. ♂
utriculatum L. *Mant.*	*à utricules.* orient. ♇
DRABA.	*DRABA.*
1. *Caule nudo.*	1. Tige nue.
aizoides L. *Mant.*	*aizoïde.* Alpes. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
verna L.	*printanier.* F. ☉
pyrenaica L.	*des Pyrénées.* F. ♇
2. *Caule folioso.*	2. Tige feuillue.
muralis L.	*des murailles.* Alpes. ♆
hirta L.	*hérissé.* F. ♆
incana L.	*blanc.* Alpes. ♇
COCHLEARIA	*COCHLÉARIA*
officinalis L.	*officinal.* F. ♂ (méd.)
danica L.	*de Danemarck.* ♂
Armoracia L.	*cran de Bretagne.* F. ♆ (écon. méd.)
draba L.	*draba.* F. ♆
glastifolia L.	*à feuilles de pastel.* F. ♂
CORONOPUS	*CORONOPUS*
vulgaris. cochlearia coronopus L.	*commun.* F. ☉

SENEBIERA	*SENEBIÉRA*
pinnatifida *dec. soc. phil.*	*pinnatifide.* Asie. ♂
Lepidium didymum *L. mant.*	
IBERIS	*IBÉRIS*
semperflorens *L.*	*de tous les mois.* sicile. or. ♄ (orn.)
sempervirens *L.*	*toujours verte.* Alpes. ♄
saxatilis *L.*	*des rochers.* Alpes. ♄
gibraltarica *L.*	*de Gibraltar.* or. ♄
rotundifolia *L.*	*à feuilles rondes.* Alpes. ♅
amara *L.*	*amère.* F. ⊙ (orn.)
umbellata *L.*	*ombellifère.* Esp. ⊙ (orn.)
pinnata *L.*	*pennée.* F. m. ⊙
linifolia *L.*	*à feuilles de lin.* F. m. ♂
nudicaulis *L.*	*à tige nue.* F. ⊙
THLASPI	*THLASPI*
arvense *L.*	*à grandes siliques.* F. ⊙
campestre *L.*	*pubescent.* F. ♂
alliaceum *L.*	*alliacé.* F. ⊙
montanum *L.*	*de montagne.* Alpes. ♅
perfoliatum *L.*	*perfolié.* Alpes. ♂
alpestre *L.*	*des Alpes.* ⊙
hirtum *L.*	*velu.* F. m. ♂
ceratocarpon *L. f.*	*à fruit cornu.* sibérie. ⊙
BURSA-PASTORIS.	*BOURSE-À-BERGER.* F. ⊙
sativum.	
LEPIDIUM sativum *L.*	*cresson alénois.* ⊙ (écon.)
— latifolium.	*— à larges feuilles.*
— crispum.	*— crépu.*
nudicaule.	
LEPIDIUM nudicaule *L.*	*à tige nue.* F. ⊙
ruderale.	
LEPIDIUM ruderale *L.*	*sans pétales.* F. ⊙
LEPIDIUM	*LÉPIDIUM*
perfoliatum *L.*	*perfolié.* orient. ⊙
subulatum *L.*	*en aléne.* Esp. ♄
procumbens *L.*	*couché.* F. ⊙
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♅
petræum *L.*	*des rochers.* F. ⊙
latifolium *L.*	*passerage.* F. ♅
IBERIS *L.*	*IBÉRIS.* F. ♅
cardamines *L.*	*à feuilles lyrées.* Esp. ♂
vesicarium *L.*	*vésiculeux.* orient. ⊙
ANASTATICA	*ANASTATICA*
hierochuntica *L.*	*ROSE de Jériko.* orient. ⊙

VELLA	*VELLA*
pseudocytisus L.	*faux cytise.* orient. or. ♄
annua L.	*annuel.* barbarie. ☉
MYAGRUM	*CAMELINE*
perenne L.	*vivace.* F. ♅
orientale L.	*d'Orient.* ☉
rugosum L.	*ridée.* F. m. ☉
perfoliatum L.	*amplexicaule.* F. ☉
sativum L.	*cultivée.* F. ☉
paniculatum L.	*paniculée.* F. ☉
saxatile L.	*des rochers.* Alpes. ♄
BUNIAS	*BUNIAS*
spinosa L. *Mant.*	*épineux.* Égypte. ♂
erucago L.	*tétragône.* F. m. ☉
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* ☉
balearica L. *Mant.*	*de Mahon.* ☉
orientalis L.	*d'Orient.* ♅
syriaca *Willd. sp.* Anastatica syriaca L.	*de Syrie.* ☉
CAKILE	*CAKILÉ*
maritima. bunias cakile L.	*maritime.* F. ☉
CRAMBE	*CRAMBÉ*
maritima L.	*maritime.* F. ♅ (écon.)
tataria *Jacq. ic.*	*de Tartarie.* ♅
cordifolia *Fischer.*	*à feuilles en cœur.* Russie. ♄
hispanica L.	*d'Espagne.* ☉
filiformis *Jacq. ic.*	*filiforme.* ♄
ISATIS	*PASTEL*
tinctoria L.	*des teinturiers.* F. ♂ (arts.)
lusitanica L. ?	*de Portugal.* ☉

ORDO IV.

CAPPARIDEÆ.

ORDRE IV.

CAPRIERS.

CLEOME	*CLÉOMÉ*
gigantea L. *Mant.*	*gigantesque.* Guinée. s. ch. ♄
pentaphylla L.	*à cinq feuilles.* Inde. ☉
spinosa L.	*épineux.* Antilles. ☉
dodecandra L.	*à douze étamines.* Inde. ☉
icosandra L.	*à vingt étamines.* ceylan. ☉
arabica L. *Dec.*	*d'Arabie.* Égypte. ☉
viscosa L.	*visqueux.* ceylan. ☉
ornithopodioides L.	*pied-d'oiseau.* orient. ☉

CRATÆVA
fragrans *BOT. MAGAZ.*
capparoides *ANDR. REP.*

CAPPARIS
spinosa *L.*
longifolia *SWARTZ.*
saligna *WAHL, SYMB.*
glandulosa.
frondosa *L.*
cynophallophora *L.*
tenuisiliqua *JACQ. AM.*

RESEDA
luteola *L.*
glauca *L.*
sesamoides *L.*
alba *L.*
lutea *L.*
undata *L.*
mediterranea *L. MANT.*
phyteuma *L.*
odorata *L*
canescens *L.*

DROSERA
rotundifolia *L.*
longifolia *L.*

PARNASSIA
palustris *L.*

ORDO V.

SAPINDI.

CARDIOSPERMUM
halicacabum *L.*

PAULLINIA
pinnata *L.*

SERJANIA
triternata *willd. sp.*
paullinia triternata *L. mant.*

KOELREUTERIA
paullinioides *l'her. sert.*
kœlreuteria paniculata *encycl.*

SAPINDUS
saponaria *L.*

CRATÉVA
odorant. sierra-leona. s. ch. ♄

CAPRIER
épineux. f. m. ♄ (écon. orn.)
à long. feuill. antilles. s. ch. ♄
à f. de saule. antilles. s. ch. ♄
glanduleux. s. ch. ♄
feuillu. antilles. s. ch. ♄
à long fruit. antilles. s. ch. ♄
à fruit grêle. antilles. s. ch. ♄

RÉSÉDA
gaude. f. ♂ (teint.)
glauque. pyrénées. ♂
sésamoïde. f. ☉
blanc. esp. ☉
jaune. f. ♅
à trois styles. esp. ♅
de la Méditerranée. orient. ☉
à grand calice. f. ☉
odorant. Alger. ☉
velu. orient. or. ♅

ROSSOLIS
à feuilles rondes. f. ☉
à feuilles longues. f. ☉

PARNASSIA
des marais. f. ♄

ORDRE V.

SAVONNIERS.

CARDIOSPERME
pois-de-merveille. inde. ☉

PAULLINIA
à f. pennées. antilles. s. ch. ♄

SERJANIA
terné. antilles. s. ch. ♄

KOELREUTÉRIA
paniculé. chine. ♄

SAVONNIER
commun. inde. s. ch. ♄ (écon.)

rigida *vahl, symb.*	*à f. roides.* Antilles. s. ch. ♄
indica.	*des Indes.* s. ch. ♄
ALLOPHYLUS	*ALLOPHYLUS*
racemosus *swartz. prodr.* smidelia occidentalis *swartz. fl. ind.*	*à grappes.* Antilles. s. ch. ♄
EUPHORIA	*EUPHORIA*
Lit-chi. sapindus edulis *vahl, symb.* Dimocarpus Lit-chi *willd. sp.*	*Lit-chi.* Chine. s. ch. ♄ (alim.)
AMIROLA	*AMIROLA*
nitida *pers. syn.* Lagunea nitida *fl. per.*	*à f. luisantes.* Pérou. s. ch. ♄
CUPANIA	*CUPANIA*
glabra *swartz. prodr.*	*glabre.* Antilles. s. ch. ♄

ORDO VI.

ACERA.

ORDRE VI.

ÉRABLES.

ÆSCULUS	*ESCULUS*
Hippocastanum L.	*Marronnier d'Inde.* Asie. ♄ (orn.)
flava *H. K.*	*Pavia jaune.* Am. s. ♄ (orn.)
Pavia L.	*Pavia rouge.* Am. s. ♄ (orn.)
macrostachya *Mich. Fl.* parviflora *H. K.*	*à long. grappes.* Am. s. ♄ (orn.)
otiotensis *Mich. Arbr.*	*de l'Oio.* Am. s. ♄ (orn.)
ACER	*ERABLE*
Negundo L.	*à f. de Frêne.* Am. s. ♄ (orn.)
pensylvanicum L. striatum *Encycl.*	*jaspé.* Am. s. ♄ (orn.)
montanum *H. K.* spicatum *Encycl.*	*de montagne.* Am. s. ♄
tataricum L.	*de Tartarie.* ♄ (orn.)
rubrum L.	*rouge.* Am. s. ♄ (orn.)
eriocarpon *Mich. Fl.*	*à fr. cotonneux.* Am. s. ♄ (orn.)
saccharinum L.	*à sucre.* Am. s. ♄ (écon.)
Platanoides L.	*Plane.* F. ♄ (orn.)
— laciniosum.	*— lacinié.*
Pseudo-Platanus L.	*Sicomore.* F. ♄ (orn.)
campestre L.	*champêtre.* F. ♄
opalus *Willd. sp.*	*opale.* Alpes. ♄
opulifolium *Vill. Delph.*	*à feuilles d'obier.* Alpes. ♄
monspessulanum L.	*de Montpellier.* ♄ (orn.)
creticum L.	*de Crète.* ♄

HIPPOCRATEA
volubilis L.

HIPPOCRATÉA
sarmenteux. Antilles. s. ch. ♃

ORDO VII.

MALPIGHIACEÆ.

BANISTERIA
laurifolia L.
ciliata *encycl.*
tomentosa.
periplocæfolia.

GYROCARPOS
gyrocarpos Jacquini, *roxb. corom.*

TRIOPTERIS
jamaicensis L.?

MALPIGHIA
glabra L.
punicifolia L.
myrtifolia.
urens L.
nitida L.
macrophylla.
coccifera L.
aquifolia L.
glandulifera *jacq. ic.*

ERYTHROXYLUM
hypericifolium *encycl.*

ORDRE VII.

MALPIGHIACÉES.

BANISTÉRIA
à f. de Laurier. Ant. s. ch. ♄
cilié. Brésil. s. ch. ♄
cotonneux. Antilles. s. ch. ♄
à f. de Périploca. Ant. s. ch. ♄

GYROCARPOS
de Jacquin. Inde. s. ch. ♄

TRIOPTÉRIS
de la Jamaïque. s. ch. ♄

MALPIGHIA
glabre. Antilles. s. ch. ♄
à f. de Grenadier. Ant. s. ch. ♄
à f. de Myrte. Antilles. s. ch. ♄
brûlant. Antilles. s. ch. ♄
luisant. Antilles. s. ch. ♄
à grandes f. Antilles. s. ch. ♄
à f. de Kermès. Ant. s. ch. ♄
à f. de Houx. Antilles. s. ch. ♄
glanduleux. Antilles. s. ch. ♄

ERYTHROXYLUM
à f. d'Hypéricum. Île de Fr. s. ch. ♄

ORDO VIII.

HYPERICA.

ASCYRUM
hypericoides L.

HYPERICUM.

1. *Trigyna.*

ægyptiacum L.
scabrum L.
coris L.
nummularium L.
pulchrum L.
tomentosum L.

ORDRE VIII.

MILLEPERTUIS.

ASCYRUM
à f. de Millepertuis. Am. s. ♃

MILLEPERTUIS.

1. 3 styles.

d'Egypte. or. ♄
rude. orient. or. ♄
verticillé. Alpes. ♃
à f. de Nummulaire. Alpes. ♄
élégant. F. ♆
cotonneux. F. m. or. ♄

elodes *L.*
crispum *L. Mant.*
humifusum *L.*
montanum *L.*
hirsutum *L.*
perforatum *L.*
quadrangulare *L.*
delphinense *vill. Delph.*
dubium *smith, Fl.*
canariense *L.*
Androsæmum *L.*
hircinum *L.*
elatum *Encycl.*
prolificum *L. Mant.*

2. *Styli* 5.

richeri *vill. Delph.*
fimbriatum *Encycl.*
amplexicaule *Encycl.*
calicinum *L. Mant.*
chinense *Encycl.*
monogynum *L.*
balearicum *L.*

des marais. F. ♄
crépu. Alger. ☿
couché. F. ☉
de montagne. F. ♄
velu. F. ☿
officinal. F. ☿ (méd.)
tétragône. F. ☿
du Dauphiné. ♄
des Canaries. or. ♄
Androsème. F. ♄ (méd.)
fétide. orient. ♄
élevé. Am. s. ♄
prolifique. Am. s. ♄ (orn.)

2. 5 styles.

de Richer. Alpes. ☿
amplexicaule. ♄
à grand calice. orient. ♄ (orn.)
de Chine. or. ♄ (orn.)
de Mahon. or. ♄

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

Clusia
rosea *L.*
flava *L.*

Mammea
americana *L.*

ORDRE IX.

GUTTIERS.

Clusia
rose. Antilles. s. ch. ♄
jaune. Antilles. s. ch. ♄

Mammée
d'Amérique. Antilles. s. ch. ♄ (écon.)

ORDO X.

AURANTIA.

I. Fructus monospermus.

Balanites
ægyptiaca *Delile, Fl.*
xymenia ægyptiaca *L.*

Cookia
punctata *willd. sp.*

ORDRE X.

ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

Balanite
d'Egypte. s. ch. ♄

Cookia
ponctué. île de Fr. s. ch. ♄

II. Fructus polyspermus baccatus.

II. Une baie polysperme.

MURRAYA
exotica L. *Mant.*
chalcas paniculata L. *Mant.*
MARSANA buxifolia *Sonn. Itin.*

MURRAYA
Buis de Chine. s. ch. ♄

CITRUS
medica L.
— acida.
— cedra.
— tuberosa.
— balotina.
— LIMON.
— florentina.
AURANTIUM L.
— amarum.
— olyssiponense.
— violaceum.
— multiflorum.
— lunatum.
— bergamium.
decumana L.
sinensis.
triptera.
hystrix *Dec. Cat.*
emarginata.

CITRONNIER
commun. inde. or. ♄ (écon. méd.)
— *aigre.*
— *cédra.*
— *poncire.*
— *Balotin.*
— *Lime douce.*
— *de Florence.*
oranger. ASIE. or. ♄ (orn. méd. écon.)
— *amer.*
— *de Portugal.*
— *violet.*
— *Riche dépouille.*
— *turc.*
— *Bergamotte.*
Pampelmouse. inde. or. ♄ (orn.)
de Chine. or. ♄
à feuilles ternées. s. ch. ♄
hérissé. s. ch. ♄
échancré. s. ch. ♄

LIMONIA
trifoliata L.

LIMONIA
à f. ternées. inde. s. ch. ♄

III. Fructus polyspermus capsularis.

III. Une capsule polysperme.

TERNSTROMIA
elliptica *Swartz, Prodr.*
meridionalis L. *f.* ?

TERNSTROMIA
elliptique. ANTILLES. s. ch. ♄
d'Amérique. ANTILLES. s. ch. ♄

THEA
bohea L.

THÉ
bou. chine. or. ♄ (écon. méd.)

CAMELLIA
japonica L.

CAMELLIA
du Japon. or. ♄ (orn.)

ORDO XI.

MELIACEÆ.

I. Folia simplicia.

WINTERANIA
canella L. *f.*

AYTONIA
capensis L. *f.*

II. Folia composita.

PORTESIA
ovata *cav. diss.*
trichilia pallida *swartz, prodr.*

TRICHILIA
spondioides *swartz, prodr.*

MELIA
azedarach L.

SWIETENIA
mahogoni L.

CEDRELA
odorata L.

ORDRE XI.

AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA
cannelle blanche. Antill. s. ch. ♄ (méd.)

AYTONIA
du Cap. or. ♄

II. Feuilles composées.

PORTÉSIA
à feuilles ovales. Ant. s. ch. ♄

TRICHILIA
à f. de monbin. Ant. s. ch. ♄

MÉLIA
azédarac. Inde. or. ♄ (orn.)

SWIÉTÉNIA
mahogoni. Acajou à meubles. Antilles. s. ch. ♄ (arts.)

CÉDRÉLA
odorant. Acajou à planches. Antilles. s. ch. ♄ (arts.)

ORDO XII.

VITES.

CISSUS
orientalis *Lamk. Ill.*
acida L.
quadrangularis L. *Mant.*
sicyoides L.
quinquefolia.
vitis hederacea *Willd. sp.*
hedera quinquefolia L.
ampelopsis quinquefolia *Mich. Am.*
antarctica *Vent. ch. de pl.*
vitiginea L.

VITIS
vinifera L.

ORDRE XII.

VIGNES.

CISSUS
d'Orient. Perse. or. ♄
acide. Antilles. s. ch. ♄
quadrangulaire. Inde. s. ch. ♄
à f. dentées. Antilles. s. ch. ♄
vigne vierge. Am. s. ♄ (orn.)
antarctique. N. Holl. or. ♄
cotonneux. Inde. s. ch. ♄

VIGNE
cultivée. Asie. ♄ (écon. méd.)

laciniosa L. — *laciniée.* ♄ (écon.)
vulpina L. — *de renard.* Am. s. ♄
labrusca L. — *cotonneuse.* Am. s. ♄
cordifolia *Mich. Fl.* — *à feuilles en cœur.* Am. s. ♄
virginianâ. — *de Virginie.* ♄
arborea L.
Ampelopsis bipinnata *Mich. Fl.* — *à f. de persil.* Antilles. s. ch. ♄

ORDO XIII.

GERANIA.

ORDRE XIII.

GÉRANIUM.

Pelargonium — *Pélargonium*
fulgidum *Willd. sp.* — *couleur de feu.* cap. or. ♄ (orn.)
inquinans *Willd. sp.* — *écarlate.* cap. or. ♄ (orn.)
— roseum. — *rose.*
hybridum *Willd. sp.* — *hybride* cap. or. ♄
flabellatum. — *en éventail.* cap. or. ♄
zonale *Willd. sp.* — *à zônes.* cap. or. ♄ (orn.)
— variegatum. — *panaché.*
acetosum *Willd. sp.* — *acide.* cap. or. ♄
glaucum *Willd. sp.*
Geranium lanceolatum *cav. diss.* — *glauque.* cap. or. ♄
diversifolium *Willd. sp.* — *à feuilles var.* cap. or. ♄
canum.
tomentosum *Andr. Rep.* — *à feuill. blanches.* cap. or. ♄
peltatum *Willd. sp.* — *en bouclier.* cap. or. ♄
grandiflorum *Willd. sp.* — *à grandes fleurs.* cap. or. ♄
cortusæfolium *Willd. sp.* — *à f. de cortusa.* cap. or. ♄
melananthon *Willd. sp.* — *à fleurs brunes.* cap. or. ♅
sanguineum. — *sanguin* cap. or. ♄
pilosum *H. K.* — *velu.* cap. or. ♅
hirtum *Willd. sp.* — *hérissé.* cap. or. ♄
hamatum.
echinatum *Bot. Mag.* — *à crochets.* cap. or. ♄
tetragonum *Willd. sp.* — *tétragône.* cap. or. ♄
reniforme *Bot. Mag.* — *réniforme.* cap. or. ♄
papilionaceum *Willd. sp.* — *papilionacé.* cap. or. ♄
australe *Willd. sp.* — *austral.* N. Holl. or. ♄
vitifolium *Willd. sp.* — *à feuilles de vigne.* cap or. ♄
acerifolium *Willd. sp.* — *à feuilles d'Erable.* cap. or. ♄
penicillatum *Willd. H. Ber.* — *moucheté.* cap. or. ♄
beaufortianum. — *de Beaufort.* cap. or. ♄
cucullatum *Willd. sp.* — *capuchon.* cap. or. ♄
ribifolium *Willd. sp.* — *à feuill. de Ribés.* cap. or. ♄

tomentosum *Willd. sp.*	*drapé.* cap. or. ♄
rigidum *Willd. sp.*	*à feuilles dures.* cap. or. ♄
cordatum *Willd. sp.*	*à feuilles en cœur.* cap. or. ♄
blattarium *Willd. sp.*	*Blattaire.* cap. or. ♄
tricolor *Willd. sp.* geranium violarium *Jacq. ic.*	*tricolore.* cap. or. ♄ (orn.)
betulinum *Willd. sp.*	*à f. de Bouleau.* cap. or. ♄
formosissimum.	*élégant.* cap. or. ♄ (orn.)
capitatum *Willd. sp.*	*à fleurs en tête.* cap. or. ♄
jatrophæfolium *Dec. cat.*	*à f. de Jatropha.* cap. or. ♄
glutinosum *l'Her. Ger.* geranium viscosum *cav. Diss.*	*glutineux.* cap. or. ♄
quercifolium *Willd. sp.*	*à feuilles de chêne.* cap. or. ♄
terebinthinaceum. graveolens *l'Her. Ger.*	*térébinthinacé.* cap. or. ♄
Radula *Willd. sp.*	*Radula.* cap. or. ♄
scabrum *Willd. sp.*	*rude.* cap. or. ♄
tricuspidatum *l'Her. Ger.*	*à trois pointes.* cap. or. ♄
bicolor *Willd. sp.*	*bicolore.* cap. or. ♄
quinquevulnerum *Andr. Rep.*	*à cinq taches.* cap. or. ♄
carnosum *Willd. sp.*	*charnu.* cap. or. ♄
gibbosum *Willd. sp.*	*gibbeux.* cap. or. ♄
ceratophyllum *l'Her. Ger.*	*à feuilles cornues.* cap. or. ♄
exstipulatum *Willd. sp.*	*sans stipules.* cap. or. ♄
crispum *Willd. sp.*	*crépu.* cap. or. ♄
fragile *Willd. sp.*	*fragile.* cap. or. ♄
ternatum *Willd. sp.*	*trilobé.* cap. or. ♄
trifidum *Jacq. H. sch.* tripartitum *Willd. sp.*	*trifide.* cap. or. ♄
adulterinum *l'Her. Ger.*	*adultérin.* cap. or. ♄
incisum *Willd. sp.*	*incisé.* cap. or. ♄
suaveolens.	*suave.* cap. or. ♄
tabulare *Willd. sp.* Geranium elongatum *cav. Diss.*	*à longs pédoncules.* cap. or. ♃
alchimilloides *Willd. sp.*	*à f. d'Alchimille.* cap. or. ♄
odoratissimum *Willd. sp.*	*odorant.* cap. or. ♄
astragalifolium. pinnatum *H. K.*	*à f. d'Astragale.* cap. or. ♃
multicaule. Geranium multicaule *Jacq. ic.*	*à tiges nombreuses.* cap. or. ♆
coriandrifolium *Willd. sp.*	*à f. de coriandre.* cap. or. ♃
rapaceum *Willd. sp.* Geranium selinum *Andr. Rep.*	*Rave.* cap. or. ♃
myrrhifolium *Willd. sp.*	*à f. de Myrris.* cap. or. ♆
lacerum *Willd. sp.*	*lacéré.* cap. or. ♆
grossularioides *Willd. sp.*	*à f. de Groseillier.* cap. or. ♆
carneum *Willd. sp.*	*à petites fleurs.* cap. or. ♆

lobatum *willd. sp.*	*lobé.* cap. or. ♃
triste *willd. sp.*	*à fl. brunes.* cap. or. ♆ (orn.)
daucifolium. / flavum *willd. sp.*	*à f. de carotte.* cap. or. ♆
abrotanifolium *willd. sp.*	*à f. d'Aurone.* cap. or. ♄
tenuifolium *willd. sp.*	*à feuilles menues.* cap. or. ♄
ERODIUM	*ERODIUM*
alpinum *willd. sp.*	*des Alpes.* ♃
petræum *willd. sp.*	*des rochers.* Pyrénées. ♆
cicutarium *willd. sp.*	*cicutaire.* F. ♃
romanum *willd. sp.*	*romain.* F. ☉
moschatum *willd. sp.*	*musqué.* F. ☉
hirtum *willd. sp.*	*pubescent.* Egypte. or. ♃
laciniatum *willd. sp.*	*lacinié.* Alger. ☉
maritimum *willd. sp.*	*maritime.* F. ♃
pulverulentum *willd. sp.?*	*pulvérulent.* Esp. or. ♆
malacoides *willd. sp.*	*malacoïde.* F. m. ☉
glaucophyllum *willd. sp.*	*à f. glauques.* Égypte. or. ☉
ciconium *willd. sp.*	*Bec-de-cigogne.* F. ☉
gruinum *willd. sp.*	*Bec-de-grue.* F. ☉
geifolium. / hymenodes *willd. sp.* / geranium triphyllum *cav. diss.*	*à f. de géum.* Barbarie. or. ♆
pusillum. / geranium pusillum L.	*petit.* F. ☉
chamædryoides *willd. sp.* / geranium Reichardi *syst. veget.*	*à f. de chamédrys.* Corse. or. ♃
incarnatum *willd. sp.* / punctatum *cav. diss.*	*incarnat.* cap. or. ♄
GERANIUM	*GÉRANIUM*
pyrenaicum L. *Mant.*	*des Pyrénées.* ☉
tuberosum L.	*tubéreux.* Italie. ♃
macrorhizum L. *Mant.*	*à grosses racines.* Italie. ♆
anemonæfolium *l'Her. ger.* / geranium palmatum *cav. diss.*	*à f. d'Anémone.* Madère. or. ♄
phæum *s. veg.*	*brun.* Alpes. ♃
roseum *l'Her. Mss.*	*rose.* Alpes. ♃
reflexum L. *Mant.*	*réfléchi.* Alpes. ♆
lividum *l'Her. Ger.*	*livide.* Alpes ♆
nodosum L.	*noueux.* Alpes. ♃
striatum L.	*réticulé.* Italie. ♃ (orn.)
aconitifolium *l'Her. Ger.*	*à feuilles d'Aconit.* Alpes. ♃
sylvaticum L.	*des bois.* Alpes. ♆
maculatum L.	*maculé.* Am. s. ♆

pratense L.	*des prés.* F. ♆
varium *l'Her. Ger.*	*cendré.* Pyrénées. ♄
cineraceum *Lapeyr. Fl.*	
incanum L.	*incane.* cap. or. ♆
argenteum L.	*argenté.* F. m. ♆
robertianum L.	*Herbe-à-Robert.* F. ♂ (méd.)
lucidum L.	*luisant.* F. ☉
bohemicum L.	*de Bohême.* ☉
divaricatum *Willd. sp.*	*étalé.* Hongrie. ☉
carolinianum L.	*de Caroline.* ☉
lanuginosum *Jacq. H. sch.*	
molle L.	*velouté.* F. ☉
columbinum L.	*colombin.* F. ☉
dissectum L.	*découpé.* F. ☉
rotundifolium L.	*à feuilles rondes.* F. ☉
sibiricum L.	*de Sibérie.* ☉
sanguineum L.	*sanguin.* F. ♄
MONSONIA	*MONSONIA*
speciosa *S. Veg.*	*élégant.* cap. or. ♆
Genera Geraniis affinia.	Genres qui ont de l'affinité avec le Géranium.
TROPÆOLUM	*CAPUCINE*
majus L.	*cultivée.* Pérou. ☉ (orn. écon.)
— multiplex.	— *à fleurs doubles.* S. ch. ♄
minus L.	*à petites fleurs.* Pérou. ☉
IMPATIENS	*BALSAMINE*
Balsamina L.	*des jardins.* Inde. ☉ (orn.)
Noli-tangere L.	*des bois.* F. ☉
OXALIS.	*OXALIS.*
1. *Foliolis binatis.*	1. Folioles deux à deux.
crispa *Jacq. ox.*	*crépu.* cap. or. ♆
asinina *Jacq. ox.*	*cartilagineux.* cap. or. ♄
leporina *Jacq. ox.* ?	*pied-de-lièvre.* cap. or. ♆
2. *Foliolis ternatis; scapo unifloro.*	2. Folioles ternées; hampe à une fleur.
fabæfolia *Jacq. ox.*	*à feuilles de Féve.* cap. or. ♄
Acetosella L.	*des bois.* F. ♆
purpurea *Jacq. ox.*	*pourpre.* cap. or. ♆
— laxula.	— *lâche.*
breviscapa *Jacq. ox.*	*à hampe courte.* cap. or. ♄
speciosa *Jacq. ox.*	*à grandes fleurs.* cap. or. ♄
— sigillata.	— *sigillé.*
— rigidula.	— *hérissé.*

3. *Foliolis ternatis, rariùs quaternis; scapo multifloro.*

compressa *Jacq. Fragm.*
tetraphylla *cav. ic.*
violacea L.
maculata.
cernua *Jacq. ox.*
quinquepunctata.

4. *Caulescentes; foliis ternatis; pedunculis unifloris.*

versicolor *Jacq. ox.*
— gracilis.
elongata *Jacq. ox.*
rubella *Jacq. ox.*
polyphylla *Jacq. ox.*
multiflora *Jacq. ox.*
rosacea *Jacq. ox.*
incarnata L.

5 *Foliolis ternatis; pedunculis multifloris.*

corniculata L.
stricta L.

6. *Foliis digitatis.*

pectinata *Jacq. ox.*
flava *Jacq. ox.*
flabellifolia *Jacq. ox.*
digitata.

3. Folioles ternées, rarement quaternées; hampes à plusieurs fleurs.

comprimé. cap. or. ♆
à quatre folioles. Mexique. ♆
violet. Am. s. ♄
tacheté. cap. or. ♆
penché. cap. or. ♄.
à cinq glandes. cap. or. ♆

4. Une tige; folioles ternées; pédoncules à une fleur.

bigarré. cap. or. ♄
— *grêle.*
allongé. cap. or. ♆
rouge. cap. or. ♆
à feuilles nombr. cap. or. ♆
à plusieurs fleurs. cap. or. ♄
rosacé. cap. or. ♆
incarnat. cap. or. ♄

5. Folioles ternées; pédoncules à plusieurs fleurs.

cornu. F. ♆
ramassé. F. ♆

6. Feuilles digitées.

pectiné. cap. or. ♄
jaune. cap. or. ♆
éventail. cap. or. ♆
digité. cap. or. ♄

ORDO XIV.

MALVACEÆ.

I. Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus multicapsularis, capsulæ capitatæ.

PALAVIA
malvifolia *cav. diss.*
MALOPE parviflora *l'her. stirp.*

MALOPE
malacoides L.
trifida *cav. diss.*

KITAIBELIA
vitifolia *willd. sp.*

ORDRE XIV.

MALVACÉES.

I. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; plusieurs capsules réunies en tête.

PALAVIA
à feuilles de Mauve. Pérou. ☉

MALOPE
à feuilles ovales. Alger. or. ♂
à trois lobes. Afr. s. ☉

KITAIBELIA
à feuilles de vigne. Hongr. ♄

II. Stamina in tubum corolliferum connata ; fructus multicapsularis ; capsulæ in orbem dispositæ aut in unam coalitæ.

II. Étamines réunies en un tube adhérent à la corolle ; plusieurs capsules disposées circulairement, ou réunies en une seule.

MALVA.

1. *Foliis indivisis.*

spicata L.
polystachya *cav. Diss.*
scoparia *cav. et l'Her.*
scabra *cav. Diss.*
americana L.
angustifolia *cav. Diss.*

2. *Foliis angulatis.*

asperrima *Jacq. H. Sch.*
miniata *cav. Ic.*
fragrans *cav. Diss.*
capensis *cav. Diss.*
virgata *cav. Diss.*
abutiloides L.
vitifolia *cav. Ic.*
umbellata *cav. Ic.*
peruviana L.
limensis L.
caroliniana L.
sherardiana L.
parviflora L.
verticillata L.
mareotica *Delile, Ægyp.*
rotundifolia L.
sylvestris L.
crispa L.
Alcea L.
moschata L.
ægyptia L.

MAUVE.

1. Feuilles entières.

à épis. Am. m. s. ch. ♄
à plus. épis. Pérou. s. ch. ♄
à balais. Pérou. s. ch. ♄
rude. Pérou. s. ch. ♄
d'Amérique. Antilles. ☉
à feuill. étroit. Mexiq. s. ch. ♄

2. Feuilles anguleuses.

râpeuse. cap. or. ♄
rouge. s. ch. ♄
odorante. cap. or. ♄
du Cap. or. ♄
effilée. cap. or. ♄
à f. d'Abutilon. Ant. s. ch. ♄
à f. de vigne. Mexique. or. ♄
ombellifère. Mexique. s. ch. ♄
du Pérou. ☉
de Lima. ☉
de Caroline. ☉
de Sherard. Italie. or. ♂
à petites fleurs. Barbarie. ☉
verticillée. Chine. ☉
maréotique. Égypte.
à feuilles rondes. F. ♃ (méd.)
sauvage. F. ♂ (méd.)
crépue. orient. ☉
Alcée. F. ♃
musquée. F. ♃
d'Egypte. ☉

LAVATERA.

1. *Caule fruticoso.*

arborea L.
micans L.
olbia L.
pseudo-olbia.
unguiculata.
triloba L.
lusitanica L.
maritima *Gouan, Ill.*
acerifolia *Dec. cat.*
phœnicea *vent. Malm.*

LAVATÉRA.

1. Tige ligneuse.

arbre. Italie. or. ♄
brillant. Esp. or. ♄
olbia. F. m. or. ♄
faux olbia. or. ♄
onguiculé. or. ♄
à trois lobes. F. m. or. ♄
de Portugal. or. ♄
maritime. F. m. or. ♄
à f. d'Erable. Canaries. or. ♄
à fl. pourpres. Canaries. or. ♄

2. *Caule herbaceo.*

punctata *All. Auct.*
cretica L.
thuringiaca L.
trimestris L.

ALTHÆA et ALCEA
rosea *Willd. sp.*
— sinensis.
ficifolia *Willd. sp.*
officinalis L.
narbonensis *cav. Diss.*
cannabina L.
Ludwigii L. *Mant.*
hirsuta L.

MALACHRA
capitata L.
alceæfolia *Jacq. ic.*
triloba.

PAVONIA
urens *cav. Diss.*
cuneifolia *cav. Diss.* } nibiscus prærnorsus L. *f.*
spinifex *cav. Diss.* } Hibiscus spinifex L.
— aristata.
zeylanica *Willd. sp.* } Hibiscus zeylanicus L.
parviflora.
columella *Jacq. H. sch.*

URENA
lobata L.
sinuata L.

NAPÆA
scabra L. } sida dioica *cav. Diss.*
levis L. } sida napæa *cav. Diss.*

SIDA
spinosa L.
frutescens *cav. Diss.*
carpinifolia L. *f.*
rhombifolia L.
alnifolia L.
unilocularis *l'Her. stirp.*

2. Tige herbacée.

ponctué. NICE. ⊙
de Crète. ⊙
de Thuringe. ⊙
à opercule. F. m. ⊙ (orn.)

ALTHÉA
rose trémière. chine. ♂ (orn.)
— de Chine.
à f. de figuier. sibér. ♂ (orn.)
officinal. F. ♄ (méd.)
de Narbonne. ♆
à feuilles de chanvre. F. m. ♆
de Ludwig. sicile. ⊙
velu. F. ⊙

MALACHRA
à fleurs en tête. Antilles. ⊙
à feuilles d'Alcéa. caracas. ⊙
à trois lobes. ⊙

PAVONIA
piquant. île de FR. s. ch. ♄
cunéiforme. cap. or. ♄
épineux. Antilles. s. ch. ♄
— à longues arêtes.
de Ceylan. ⊙
à petites fleurs. s. ch. ♄
de Bourbon. s. ch. ♄

URENA
à f. lobées. chine. s. ch. ♄
à f. sinuées. Antilles. s. ch. ♄

NAPÉA
rude. Am. s. ♆
lisse. Am. s. ♄

SIDA
épineux. Antilles. ⊙
arbrisseau. s. ch. ♄
à f. de charme. canar. or. ♄
rhomboïdal. inde. s. ch. ♄
à feuilles d'Aune. inde. ⊙
à une loge. île de FR. ⊙

retusa L. — *émoussé.* inde. ⊙
viscosa L. — *visqueux.* Antilles. s. ch. ♄
angustifolia *cav. diss.* — *à f. étroit.* île de bourb. s. ch. ♄
umbellata L. — *ombellifère.* Antilles. ⊙
triquetra L. — *triangulaire.* Antilles. s. ch. ♄
virgata *cav. ic.* — *effilé.* Pérou. s. ch. ⊙
periplocifolia L. — *à f. de périploca.* Ant. s. ch. ♄
nutans *l'her. stirp.* — *à fl. penchées.* Pérou. s. ch. ♄
fragrans *l'her. stirp.* — *odorant.* Antilles. s. ch. ♄
ricinoides *l'her. stirp.* / palmata *cav. diss.* — *à feuilles de ricin.* Pérou. ⊙
nudiflora *l'her. stirp.* / stellata *cav. diss.* — *à fleurs nues.* Antilles. s. ch. ♄
crassifolia *l'her. stirp.* — *à f. épaisses.* Antilles. s. ch. ♄
glauca *cav. ic.* — *glauque.* sénégal. s. ch. ♄
tricuspis. — *à trois pointes.* s. ch. ♄
mollissima *cav. diss.* — *velouté.* Pérou. s. ch. ♄
arborea L. *f.* / peruviana *cav. diss.* — *arbre.* Pérou. s. ch. ♄
reflexa *cav. diss.* / retrorsa *l'her. stirp.* — *réfléchi,* Pérou. s. ch. ♄
tiliæfolia. — *à f. de tilleul.* Ant. s. ch. ♄
gigantea *Jacq. h. sch.* — *gigantesque.* Antilles. s. ch. ♄
palmata *cav. diss.* / jatrophoides *l'her. stirp.* — *à feuilles palmées.* Pérou. ⊙
Abutilon L. — *Abutilon.* suisse. ⊙
indica L. — *des Indes.* s. ch. ♄
occidentalis L. — *d'Occident.* Antilles. ⊙
asiatica L. — *d'Asie.* inde. ⊙
hirta *cav. diss.* / pilosa *l'her. stirp.* — *hérissé.* inde. ⊙
mollis *ortega, dec.* — *à f. molles.* Pérou. s. ch. ♄
mauritiana *l'her. stirp.* — *de l'Ile de France.* s. ch. ♄
triloba *Jacq. h. sch.* — *à trois lobes.* cap. or. ♄
hastata *willd. sp.* / Anoda hastata *cav. diss.* — *hasté.* Mexique. ⊙
cristata. / Anoda cristata *cav. diss.* — *à crête.* Mexique. ⊙
parviflora. / Anoda parviflora *cav. diss.* — *à petites fleurs.* Mexique. ⊙

III. Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus simplex, multilocularis.

III. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; une capsule à plusieurs loges.

Hibiscus — *Hibiscus*

solandra *l'her. stirp.* / solandra lobata *syst. veget.* — *à trois lobes.* île de bourb. ⊙
palustris L. — *des marais.* Am. s. ♆ (orn.)

moscheutos L.	*moscheutos.* Am. s. ☄ (orn.)
speciosus *H. K.*	*à fl. pourpres.* Am. s. ☄ (orn.)
pentacarpos L.	*à cinq fruits.* Italie. ☿
militaris *cav. diss.*	*à f. hastées.* Louisiane. or. ☿
populneus L.	*à f. de peuplier.* Inde. s. ch. ♄
tiliaceus L.	*à f. de tilleul.* Inde. s. ch. ♄
mutabilis L.	*à fl. changeantes.* Inde. s. ch. ♄
rosa-sinensis L.	*rose de Chine.* s. ch. ♄ (orn.)
phœniceus L. *f.*	*rose.* Inde. s. ch. ♄
syriacus L.	*Mauve en arbre.* orient. ♄ (orn.)
scaber *Encycl.*	
ficulneus *cav. diss.* (non L.)	*à feuill. rudes.* ceylan. s. ch. ♄
diversifolius *willd. sp.*	
Manihot L.	*à grandes fleurs.* Inde. s. ch. ♄
heterophyllus *vent. malm.*	*à feuill. var.* N. Holl. s. ch. ♄
cannabinus L.	*à feuilles de chanvre.* Inde. ☉
digitatus *cav. diss.*	*digité.* Mexique. s. ch. ♄
Abelmoschus L.	*Abelmosc.* Inde. s. ch. ♄
esculentus L.	*comestible.* Inde. ☉ (alim.)
sabdariffa L.	*oseille de Guinée.* Inde. ☉
tubulosus *cav. diss.*	*tubulé.* Inde. ☉
vitifolius L. *mant.*	*à f. de vigne.* Inde. s. ch. ♄
pedunculatus L. *f.*	*à longs pédoncules.* cap. or. ♄
Trionum L.	*vésiculeux.* Italie. ☉
MALVAVISCUS	*MALVAVISCUS*
arboreus *cav. diss.*	
Achania Malvaviscus *H. K.*	*en arbre.* Antilles. s. ch. ♄
Hibiscus Malvaviscus L.	
LAGUNEA	*LAGUNÉA*
squamea *vent. malm.*	
Hibiscus patersonius *andr. rep.*	*écailleux.* N. Holl. or. ♄
GOSSYPIUM	*COTONNIER*
herbaceum L.	*de Malte.* orient. or. ♄ (orn.)
arboreum L.	*en arbre.* Inde. s. ch. ♄
hirsutum L.	*velu.* Antilles. s. ch. ♄
vitifolium *Encycl.*	*à f. de vigne.* Inde. s. ch. ♄
purpureum.	*pourpre.* Antilles. s. ch. ♄

IV. Stamina basi in urceolum sessilem connata; omnia fertilia, definita aut indefinita.

IV. Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.

MELOCHIA	*MÉLOCHIA*
pyramidata L.	*pyramidal.* Brésil. s. ch. ☄
corchorifolia L.	*à feuilles de corète.* Inde. ☉
ovata.	
Brotera ovata *cav. ic.*	*à f. ovales.* N. Esp. s. ch. ☿
tomentosa L.	*cotonneux.* Antilles. s. ch. ♄

STUARTIA
malacodendrum L.
pentagyna *l'Her. stirp*

GORDONIA
lasianthus *l'Her. stirp.*
pubescens *l'Her. stirp.*

BOMBAX
ceiba L.

ADANSONIA
baobab L.

STUARTIA
monostyle. caroline. or. ♄
à cinq styles. virginie. or. ♄

GORDONIA
à f. glabres. caroline. or. ♄
pubescent. caroline. or. ♄

BOMBAX
ceiba. inde. s. ch. ♄

ADANSONIA
digité, pain-de-singe. afr. s. ch. ♄

V. Stamina basi in urceolum sessilem connata; sterilia fertilibus intermixta, definita aut indefinita.

V. Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.

PENTAPETES
phœnicea L.

ABROMA
fastuosa *Jacq. Hort.*
ambroma augusta L. *f.*

GUAZUMA
ulmifolia.
theobroma guazuma L.
bubroma guazuma *Willd. sp.*

DOMBEYA
ferruginea *Cav. Diss.*
acutangula *Cav. Diss.*

BYTTNERIA
ovata *Encycl.*

PENTAPÈTES
écarlate. inde. ☉

ABROMA
à larges feuilles. inde. s. ch. ♄

GUAZUMA
à f. d'orme. antilles. s. ch. ♄

DOMBEYA
ferrugineux. île de F. s. ch. ♄
à angles aigus. île de F. s. ch. ♄

BYTTNÉRIA
à feuill. ovales. pérou. s. ch. ♄

VI. Stamina basi in urceolum germini arctè circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumquè definita et fertilia.

VI. Étamines ordinairement définies et fertiles; filets réunis à la base autour de l'ovaire en un godet porté sur un pédicelle.

AYENIA
pusilla L.

HELICTERES
althæifolia *Encycl.*

STERCULIA
monosperma *Vent. Malm.*
platanifolia L. *f.*
fœtida L.

AYÉNIA
petit. antilles. s. ch. ♂

HELICTÈRES
à f. d'Althéa. antilles. s. ch. ♄

STERCULIA
monosperme. inde. s. ch. ♄
à f. de Platane. chine. or. ♄
fétide. inde. s. ch. ♄

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILLICIUM
floridanum *L. Mant.*
parviflorum *Vent. H. cels.*

MAGNOLIA
grandiflora *L.*
glauca *L.*
acuminata *L.*
tripetala *L.* }
umbrella *Encycl.* }
macrophylla *Mich. Fl.*
auriculata *Mich. Fl.*
yulan.
purpurea *Bot. Mag.* }
obovata *Willd. sp.* }
discolor *Vent. Malm.* }
pumila *Andr. Rep.*

LIRIODENDRUM
tulipifera *L.*

Genera Magnoliis affinia.

DILLENIA
scandens *Willd. sp.*
volubilis *Vent. Malm.* }
speciosa *Bot. Mag.* }
Hibbertia volubilis *Andr. Rep.* }

ORDO XVI.

ANNONÆ.

JAMBOLIFERA
pedunculata *L. ?*

ANNONA
squamosa *L.*

cherimolia *Encycl.* }
tripetala *H. K.* }
glabra *L.*
triloba *L.*
orchidocarpon arietinum *Mich. Fl.* }

ORDRE XV.

MAGNOLIERS.

BADIANE
de la Floride. or. ♄ (écon.)
à petites fleurs. Floride. or. ♄

MAGNOLIA
à grandes fl. Flor. or. ♄ (orn.)
glauque. virginie. ♄ (orn.)
à f. aiguës. Am. s. ♄ (orn.)
ombrelle. Am. s. ♄ (orn.)
à grandes f. Am. s. ♄ (orn.)
auriculé. Am. s. s. ch. ♄ (orn.)
yulan. chine. or. ♄ (orn.)
pourpre. chine. or. ♄ (orn.)
nain. chine. or. ♄ (orn.)

TULIPIER
de Virginie. ♄ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Magnoliers.

DILLÉNIA
sarmenteux. N. Holl. or. ♄

ORDRE XVI.

ANNONES.

JAMBOLIFÉRA
pédonculé. Inde. s. ch. ♄

ANNONE
écailleuse, pomme-cannelle. Ind. s. ch. ♄
chérimolia. Pérou. s. ch. ♄ (alim.)
glabre. caroline. s. ch. ♄
à trois lobes, Assiminier. Am. s. ♄

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS
pareira *L.*

MENISPERMUM
canadense *L.*
virginicum *L.*
carolinum *L.*

SCHISANDRA
coccinea *Mich. fl.*

ORDRE XVII.

MÉNISPERMES.

CISSAMPÉLOS
pareira-brava. Antilles. s. ch. ♄ (méd.)

MÉNISPERME
de Canada. ♄
de Virginie. ♄
de Caroline. ♄

SCHISANDRA
écarlate. Am. s. ♄

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS
vulgaris *L.*
— rubra.
— violacea.
— canadensis.
cretica *L.*
sibirica *Willd. sp.*
sinensis.

NANDINA
domestica *Bot. magaz.*

EPIMEDIUM
alpinum *L.*

HAMAMELIS
virginiana *L.*

ORDRE XVIII.

VINETTIERS.

BERBÉRIS
epine-vinette. F. ♄ (écon. méd.)
— à fruit rouge.
— à fruit violet.
— de Canada.
de Crête. ♄
de Sibérie. ♄
de Chine. ♄

NANDINA
de Chine. s. ch. ♄

EPIMÉDIUM
des Alpes. ♄

HAMAMÉLIS
de Virginie. ♄

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. Stamina basi monadelpha definita.

WALTHERIA
americana *L.*
arborescens *cav. diss.*
indica *Jacq. ic.*

HERMANNIA
denudata *L. f.*
hyssopifolia *L.*

ORDRE XIX.

TILIACÉES.

I. Étamines définies, réunies à la base.

WALTHÉRIA
d'Amérique. Antilles. s. ch. ♄

HERMANNIA
lisse. cap. or. ♄
à f. d'hysope. cap. or. ♄

lavandulæfolia L.	*à f. de lavande.* cap. or. ♄
althæifolia L.	*à f. d'Althéa.* cap. or. ♄
cuneifolia *Jacq. h. sch.*	*cunéiforme.* cap. or. ♄
alnifolia L.	*à feuilles d'Aune.* cap. or. ♄
micans *schrad. sert.*	*à feuill. brillantes.* cap. or. ♄
latifolia *Jacq. h. sch.*	
rotundifolia *Jacq. ic.*	*à feuilles rondes.* cap. or. ♄
disticha *willd. sp.*	
angularis *Jacq. h. sch.*	*anguleux.* cap. or. ♄
trifoliata L.	*trifolié.* cap. or. ♄
pulverata *Andr. rep.*	*pulvérulent.* cap. or. ♄
scabra *Jacq. h. sch.*	*rude.* cap. or. ♄
multiflora *Jacq. h. sch.*	*à fleurs nombr.* cap. or. ♄
MAHERNIA	*MAHERNIA*
pinnata *s. veg.*	*à feuilles pennées.* cap. or. ♄
glabrata L. *f.*	*glabre.* cap. or. ♄
verticillata L. *Mant.*	*verticillé.* cap. or. ♄
II. Stamina distincta, plerumquè indefinita; fructus multilocularis.	II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies; fruit à plusieurs loges.
CORCHORUS	*CORCHORUS*
hirsutus L.	*velu.* Antilles. s. ch. ♄
siliquosus L.	*siliqueux.* Antilles. s. ch. ♄
tridens L. *Mant.*	*à trois dents.* inde. ⊙
trilocularis L.	*à trois loges.* inde. ⊙
olitorius L.	*cultivé.* Afr. s. ⊙
hirtus L.	*hérissé.* Antilles. ⊙
æstuans L. *Mant.*	*à six pointes.* Antilles. ⊙
HELIOCARPUS	*HÉLIOCARPUS*
americanus L.	*d'Amérique.* Antilles. s. ch. ♄
TRIUMFETTA	*TRIUMFETTA*
lappula L.	*hérissé.* Antilles. s. ch. ♄
FLACURTIA	*FLACURTIA*
ramontchi *l'her. stirp.*	*ramontchi.* inde. s. ch. ♄
GREWIA	*GRÉWIA*
nitida *Juss. Ann.*	*à feuilles luis.* chine. s. ch. ♄
occidentalis L.	*d'Occident.* cap. or. ♄
carpinifolia *Juss. ann.*	*à f. de charme.* Guin. s. ch. ♄
asiatica L. *Mant.*	*d'Asie.* s. ch. ♄
TILIA	*TILLEUL*
sylvestris.	*sauvage.* F. ♄ (orn. méd.)
microphylla *vent. inst.*	
platiphyllos *vent. inst.*	*de Hollande.* F. ♄ (orn. méd.)
— villosa.	— *velu.*
pubescens *vent. inst.*	*pubescent.* Am. s. ♄ (orn.)

americana *L.*
glabra *Vent. Inst.*
canadensis *Mich. Fl.*

d'Amérique. ♄ (orn.)

argentea.
rotundifolia *Vent. Inst.*
alba *Willd. Sp.*

argenté. Hongrie. ♄ (orn.)

Bixa
orellana *L.*

Rocou
cultivé. Antilles. s. ch. ♄ (arts.)

ORDO XX.

CISTI.

Cistus.

1. *Corolla alba aut flavescens.*

populifolius *L.*
laurifolius *L.*
ladaniferus *L.*
— maculatus.
monspeliensis *L.*
salvifolius *L.*

2. *Corolla rosea.*

symphytifolius *Encycl.*
vaginatus *H. K.*
purpureus *Encycl.*
villosus *S. Veg.*
complicatus *Encycl.*
incanus *L.*
albidus *L.*
crispus *L.*
creticus *L.*

Helianthemum (Cistus *Lin.*).

1. *Exstipulata fruticosa.*

umbellatum *L.*
halimifolium *L.*
ocymoides *Encycl.*
alyssoides *Encycl.*
lævipes *L.*
Fumana *L.*
marifolium *L.*

2. *Stipulata fruticosa.*

squamatum *L.*
Lippii *L. Mant.*

ORDRE XX.

CISTES.

Ciste.

1. Corolle blanche ou jaune.

à f. de Peuplier. Esp. or. ♄
à f. de Laurier. F. m. or. ♄
ladanifère. Alger. or. ♄
— *maculé.*
de Montpellier. or. ♄
à f. de Sauge. F. m. or. ♄

2. Corolle rose.

à f. de Consoude. canar. or. ♄
pourpre. orient. or. ♄
velu. Esp. or. ♄
plissé. orient. or. ♄
incane. orient. or. ♄
cotonneux. F. m. or. ♄
crépu. F. m. or. ♄
de Crète. or. ♄ (méd.)

Helianthème.

1. Tiges ligneuses ; point de stipules.

ombellifère. F. ♄
à f. d'Halime. F. m. or. ♄
à f. de Basilic. Esp. or. ♄
à feuilles d'Alysson. F. ♄
glauque. F. m. or. ♄
Fumana. F. ♄
à feuilles de Marum. F. ♄

2. Tiges ligneuses ; feuilles accompagnées de stipules.

écailleux. Esp. or. ♄
de Lippi. Égypte. or. ♄

lavandulæfolium *encycl.*
syriacum *Jacq. ic.*
serpyllifolium *L.*
thymifolium *L.*
pilosum *L.*
vulgare.
— latifolium.
mutabile *Jacq. ic.*

à f. de Lavande. F. m. or. ♄
à feuilles de serpolet. F. ♄
à f. de Thym. F. m. or. ♄
velu. F. ♄
commun. F. ♄
— *à larges feuilles.*
à fl. changeantes. F. m. ♄

3. *Exstipulata herbacea.*

guttatum *L.*

3. Tiges herbacées; point de stipules.

maculé. F. ⊙

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium *L.*
salicifolium *L.*
niloticum *L. Mant.*
ægyptiacum *L.*

4. Tiges herbacées; feuilles accompagnées de stipules.

à feuilles de Lédum. F. m. ⊙
à feuilles de Saule. F. m. ⊙
du Nil. ⊙
d'Égypte. ⊙

Genera Cistis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les Cistes.

Fructus trivalvis; valvis seminiferis; stamina definita.

3 valves séminifères; étamines définies.

IONIDIUM.

polygalæfolium *vent. Malm.*
viola verticillata *ortega, dec.*

IONIDIUM

à f. de Polygala. N. Esp. or. ♅

VIOLA.

VIOLETTE.

1. *Acaules.*

1. Tige nulle.

hirta *L.*
palustris *L.*
odorata *L.*
palmata *L.*

velue. F. ♅
des marais. F. ♅
odorante. F. ♅ (orn.)
palmée. Virginie. ♅

2. *Caulescentes; stipulis indivisis.*

canina *L.*
mirabilis *L.*
striata *H. K.*
canadensis *L.*
montana *L.*
biflora *L.*
arborescens *L.*

2. Une tige; stipules entières.

de chien. F. ♅
sans corolle. F. ♅
striée. Am. s. ♅
de Canada. ♅
de montagne. Alpes. ♅
à deux fleurs. Alpes. ♅
arbrisseau. Esp. or. ♄

3. *Stipulis pinnatifidis.*

3. Stipules pinnatifides.

tricolor *L.*
— hortensis.
rhotomagensis.
grandiflora *L. Mant.*
calcarata *L.*
cornuta *L.*

tricolor. F. ⊙ (orn.)
— *des jardins.*
de Rouen. F. ♅
à grandes fl. Pyrén. ♅ (orn.)
à long éperon. Alpes. ♅
cornue. Pyrénées. ♅

ORDO XXI.

RUTACEÆ.

I. Folia stipulacea, sæpiùs opposita.

TRIBULUS
terrestris *L.*
cistoides *L.*

FAGONIA
cretica *L.*

ZYGOPHYLLUM
fabago *L.*
morgsana *L.*
album *L.*

GUAIACUM
sanctum *L.*

LARREA
nitida *cav. ic.*

PORLIERA
hygrometra *Fl. peruv.*

BORONIA
pinnata *smith, soc. Lin.*

CORREA
alba *L.*
virens *smith, exot. bot.*

CROVEA
saligna *smith, soc. Lin.*

RUTA
sylvestris.
legitima *Jacq. ic.*
montana *H. K.*
graveolens *L.*
chalepensis *L. Mant.?*
linifolia *L.*
pinnata *L. f.*

PEGANUM
harmala *L.*

DICTAMNUS
albus *L.*

ORDRE XXI.

RUTACÉES.

I. Feuilles ordinairement opposées ; accompagnées de stipules.

TRIBULUS
hérissé. F. ⊙
à fleurs de ciste. Antilles. ⊙

FAGONIA
de Crète. Or. ♂

FABAGELLE
commune. orient. ♄
membraneuse. cap. or. ♄
à fleurs blanches. Barb. or. ♄

GAIAC
commun. Ant. s. ch. ♄ (méd. arts.)

LARRÉA
à f. luis. Buénos-ayres. s. ch. ♄

PORLIÉRA
hygrométrique. Pérou. s. ch. ♄

BORONIA
à f. pennées. N. Holl. or. ♄

CORRÉA
à fl. blanches. N. Holl. or. ♄
à fl. vertes. N. Holl. or. ♄

CROVÉA
à f. de saule. N. Holl. or. ♄

RUE
sauvage. Barbarie. or. ♄
puante. F. ♄ (méd.)
ciliée. orient. or. ♄
à feuilles de Lin. Esp. or. ♆
à f. pennées. Canaries. or. ♄

PÉGANUM
harmala. Barbarie. ♆

FRAXINELLE
cultivée. F. m. ♆ (orn.)

Genera Rutaceis affinia.

MELIANTHUS
major L.
minor L.
comosus *Vahl, symb.*

DIOSMA
rubra L.
purpurea.
virgata *Encycl.*
deflexa.
ciliata L.
prolifera.
BUCCO prolifera *Wendl.*
hirsuta L.
uniflora L.
glandulifolia uniflora *Wendl. sert.*
acuminata.
BUCCO acuminata *Wendl.*

Genres qui ont de l'affinité avec les Rutacées.

MÉLIANTHUS
à larges feuilles. cap. or. ♄
à feuilles étroites. cap. or. ♄
velu. cap. or. ♄

DIOSMA
rouge. cap. or. ♄
pourpre. cap. or. ♄
effilé. cap. or. ♄
à feuill. abaissées. cap. or. ♄
cilié. cap. or. ♄
prolifère. cap. or. ♄
velu. cap. or. ♄
à une fleur. cap. or. ♄
acuminé. cap. or. ♄

ORDO XXII.

CARYOPHYLLEÆ.

I. Calix partitus; stamina 3; *stylus* 1 *aut* 3.

ORTEGIA
hispanica L.

HOLOSTEUM
umbellatum L.

POLYCARPON
tetraphyllum L.

MOLLUGO
verticillata L.

MINUARTIA
campestris L.
dichotoma L.

POLYCARPEA
teneriffæ *Encycl.*
MOLLIA diffusa *Willd. H. Ber.*

QUERIA
canadensis L.

ORDRE XXII.

CARYOPHYLLÉES.

I. Calice partagé; 3 étamines; 1-3 styles.

ORTÉGIA
d'Espagne. ☉

HOLOSTÉUM
ombellifère. F. ☉

POLYCARPON
à quatre feuilles. F. ☉

MOLLUGO
verticillé. AM. S. ☉

MINUARTIA
des champs. ESP. ☉
dichotome. ESP. ☉

POLYCARPÉA
de Ténériffe. ☉

QUÉRIA
de Canada. ☉

VI. Calix partitus; stamina 4; *styli* 2-4.

BUFONIA
tenuifolia *L.*

SAGINA
procumbens *L.*
erecta *L.*

III. Calix partitus; stamina 5 *ad* 8; *styli* 2 *ad* 4.

ALSINE
media *L.*
segetalis *L.*
mucronata *L.*

PHARNACEUM
cerviana *L.*

MOEHRINGIA
muscosa *L.*

ELATINE
hydropiper *L.*
alsinastrum *L.*

IV. Calix partitus; stamina 10; *styli* 3 *aut* 5.

SPERGULA
nodosa *L.*
arvensis *L.*
pentandra *L.*
saginoides *L.*

CERASTIUM.

1. *Capsulis oblongis.*

perfoliatum *L.*
vulgatum *smith, Fl.* }
viscosum *curt. Fl.* }
semidecandrum *curtis, Fl.*
viscosum *smith, Fl.* }
vulgatum *curtis, Fl.* }
dichotomum *L.*
arvense *L.*
alpinum *L.*

2. *Capsulis subrotundis.*

tomentosum *Encycl.* }
repens *willd. Enum.* (an *L.*?) }
latifolium *L.*
aquaticum *L.*

II. Calice partagé; 4 étamines; 2-4 styles.

BUFONIA
à feuilles menues. F. ⊙

SAGINA
couché. F. ⊙
droit. F. ⊙

III. Calice partagé; 5-8 étamines; 2-4 styles.

ALSINÉ
des oiseaux. F. ⊙
des moissons. F. ⊙
pointu. F. ⊙

PHARNACÉUM
filiforme. Esp. ⊙

MOÉHRINGIA
touffu. Alpes. ♄

ELATINÉ
à feuilles de serpolet. F. ⊙
verticillé. F. ⊙

IV. Calice partagé; 10 étamines; 3 ou 5 styles.

ESPARGOUTTE
noueuse. F. ♆
des champs. F. ⊙
à cinq étamines. F. ⊙
à feuilles de sagina. F. ♆

CÉRASTIUM.

1. Capsules oblongues.

perfolié. orient. ⊙
aggloméré. F. ⊙
à cinq étamines. F. ⊙
commun. F. ♆
dichotome. Esp. ⊙
des champs. F. ♄
des Alpes. F. ♄

2. Capsules arrondies.

cotonneux. F. ♄
à larges feuilles. Alpes. ♄
aquatique. F. ♆

CHERLERIA	*CHERLÉRIA*
sedoides L.	*sédoïde.* Alpes. ♄
ARENARIA	*ARÉNARIA*
peploides L.	*à feuilles de péplis.* F. ♆
tetraquetra L.	*tétragône.* F. m. ♄
biflora L. *mant.*	*à deux fleurs.* Alpes. ♄
trinervia L.	*à trois nervures.* F. ☉
ciliata L.	*cilié.* Alpes. ♄
serpyllifolia L.	*à feuilles de serpolet.* F. ☉
balearica *l'her. stirp.*	*de Mahon.* ♆
montana L.	*de montagne.* F. ♆
rubra L.	*rouge.* F. ☉
media L.	*membraneux.* F. ☉
dianthoides *smith, ic.?*	*à fleurs d'œillet.* orient. ♆
cucubaloides *smith, ic.*	*à fleurs de béhen.* orient. ♄
saxatilis L.	*des rochers.* F. ♄
striata L.	*strié.* F. ♆
verna L. *mant.*	*printanier.* F. ♆
tenuifolia L.	*à feuilles menues.* F. ☉
fasciculata *jacq. ic.*	*fasciculé.* F. ☉
triflora L. *mant.*	*à trois fleurs.* F. ♆
STELLARIA	*STELLULAIRE*
nemorum L.	*des bois.* F. ♆
HOLOSTEA L.	*des haies.* F. ♆
graminea L.	*à feuilles de GRAMEN.* F. ♄
uliginosa *curt. fl.*) ALSINE *willd. sp.*)	*des marais* F. ☉
V. Calix tubulosus; stamina 10 ; *styli* 2-5.	V. Calice en tube; 10 étamines; 2-5 styles.
GYPSOPHILA	*GYPSOPHILA*
repens L.	*rampant.* Alpes. ♆
prostrata L.	*couché.* Alpes. ♆
viscosa *S. Veg.*	*visqueux.* orient. ☉
paniculata L.	*paniculé.* sibérie. ♆
— grandiflora.	*— à grandes fleurs.*
glomerata *Marsch. cauc.*	*aggloméré.* caucase. ♆
altissima L.	*élevé.* sibérie. ♆
struthium L.	*struthium.* esp. or. ♄
fastigiata *encycl.* (an *lin.?*)	*corymbifère.* Alpes. ♆
perfoliata L.	*perfolié.* esp. ♄
muralis L.	*des murailles.* F. ♂
saxifraga L.	*caliculé.* F. ♆
SAPONARIA	*SAPONAIRE*
officinalis L.	*officinale.* F. ♆ (méd.)
vaccaria L.	*anguleuse.* F. ☉
ocymoides L.	*à feuilles de basilic.* F. ♄
lutea L.	*jaune.* Alpes. ♆

orientalis L. — *d'Orient.* ⊙
porrigens *Jacq. hort.* — *à longs pédoncules.* orient. ⊙

DIANTHUS. — *OEILLET.*

1. *Flores aggregati.* — 1. Fleurs aggrégées.

barbatus L. — *de poète.* F. ♂
carthusianorum L. — *à trois nervures.* F. ♆
armeria L. — *velu.* F. ⊙
prolifer L. — *prolifère.* F. ⊙
atrorubens *All. ped.* — *brun-pourpre.* Alpes. ♂
ferrugineus L. *Mant.* — *rouillé.* Italie. ♂
collinus *Wald. et Kitt. hung.* — *des collines.* Hongrie. ♄
aggregatus *Encycl. suppl.* — *à fleurs serrées.* ♄
capitatus *Wald. et Kitt. hung.* — *à fleurs en tête.* Hongrie. ♆

2. *Flores solitarii plures in eodem caule.* — 2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.

corymbosus *Encycl. suppl.* — *corymbifère.* ♆ (orn.)
caryophyllus L. — *des jardins.* F. ♄ (orn.)
— ruber. — *— ratafiat.*
moschatus *Mayer.* } — *mignardise.* ♄ (orn.)
plumarius *Dec. Fl.* }
monspessulanus *Dec. Fl.* — *de Montpellier.* ♆ (orn.)
superbus L. — *superbe.* Alpes. ♄ (orn.)
chinensis L. — *de Chine.* ⊙ (orn.)
deltoides L. — *deltoïde.* F. ♄
attenuatus *Smith, soc. Lin.* }
longiflorus *Encycl.* } — *à long calice.* F. m. ♆
leptopetalus *Marsch. cauc.* — *à pétales linéaires.* caucase. ♄
bicolor *Wald. et Kitt. hung.* — *bicolor.* Hongrie. ♆
squarrosus *Marsch. cauc.* — *rude.* caucase. ♆
arenarius L. — *des sables.* F. ♆
dubius *Dec. cat.* — *douteux.* ♆
biflorus *Delongch. Journ. de Bot.* — *biflore.* F. ♄
ochroleucus *Pers. syn.* — *jaune-pâle.* orient. ♆
rhutenicus *Encycl. suppl.* — *de Russie.* ♄
caucasicus *Marsch. cauc.* — *du Caucase.* ♆
serotinus *Wald. et Kitt. hung.* — *tardif.* Hongrie. ♆

3. *Caule subunifloro, herbaceo.* — 3. Tige herbacée, à une fleur.

alpinus L. — *des Alpes.* ♆

4. *Caule fruticoso.* — 4. Tige ligneuse.

rigidus *Marsch. cauc.* — *à feuilles roides.* caucase. ♄
involucratus *Encycl. suppl.* — *à involucre.* or. ♄
arboreus L. — *à f. épaisses.* orient. or. ♄

SILENE.	*SILÉNÉ.*
1. *Floribus solitariis, lateralibus.*	1. Fleurs solitaires, latérales.
lusitanica L.	*de Portugal.* ⊙
quinque vulnera L.	*à cinq taches* F. ⊙
gallica L.	*sans dents.* F. ⊙
hispida *Desf. Atl.*	*hérissé.* Barbarie. ⊙
tridentata *Desf. Atl.*	*à trois dents.* Barbarie. ⊙
nocturna L.	*nocturne.* F. m. ⊙
sericea *All. Ped.*	*soyeux.* F. m. ⊙
2. *Floribus lateralibus, confertis.*	2. Fleurs latérales, ramassées.
arenaria *Desf. Atl.*	*des sables.* Barbarie. ⊙
Gypsophila	*à feuilles de Gypsophila.* ♄
tricuspidata.	*à trois pointes.* ⊙
nutans L.	*à fleurs penchées.* F. ♆
paradoxa L.	*odorant.* Italie. ♄
ocymoides.	*à feuilles de Basilic.* ♆
suffruticosa.	*sous-arbrisseau.* ♄
fruticosa L.	*arbrisseau.* Sicile. or. ♄
longiflora *Willd. sp.*	*à longues fleurs.* Hongrie. ♄
buplevroides L.	*à f. de Buplèvre.* orient. ♆
gigantea L.	*gigantesque.* Afr. or. ♂
viridiflora L.	*à fleurs vertes.* Alpes. ♂
chlorantha *Willd. sp.*	*verdâtre.* Carinthie. ♄
3. *Floribus ex dichotomia caulis.*	3. Fleurs dans la bifurcation des tiges.
sedoides *Desf. Atl.*	*à feuilles de sédum.* Barbar. ⊙
conoidea L.	*à gros fruit.* F. ⊙
conica L.	*conique.* F. ⊙
Behen L.	*faux Behen.* orient. ⊙
dichotoma *Wald. et Kitt. Hung.*	*dichotome* Hongrie. ⊙
pendula L.	*à fleurs pendantes.* Crète. ⊙
bellidifolia *Jacq. Hort.*	*à feuilles de Paquerette.* ⊙
noctiflora L.	*noctiflore.* Suisse. ⊙
maritima *Willd. sp.*	*maritime.* F. ♄
antirrhina L.	*à feuilles linéaires.* Am. s. ⊙
inaperta L.	*fermé.* Eur. austr. ⊙
polyphylla L.	*à feuilles nombreuses.* All. ⊙
portensis L.	*paniculé.* Portugal. ⊙
apetala *Willd. sp.*	*apétale.* ⊙
cretica L.	*de Crète.* ⊙
glauca *Zea.*	*glauque.* ⊙
muscipula L.	*gobe-mouche.* F. m. ⊙
rubella L. ?	*incarnat.* orient. ⊙
ornata *H. K.*	*à fleurs pourpres.* Cap. or. ♂
bipartita *Desf. Atl.* / hispanica *Jacq. Fragm.*	*à fleurs roses.* Alger. ⊙ (orn.)
stricta L.	*à fleurs serrées.* F. m. ⊙

4. *Floribus terminalibus.*

chlorælolia *smith, ic.*
picta *pers. syn.*
flavescens *wald. et kitt. hung.*
Armeria L.
Atocion *jacq. hort.* }
orchidea L. *f.* }
rupestris L.
quadridentata *dec. fl.* }
alpestris *jacq. austr.* }
saxifraga L.
vallesia L.
acaulis L.

Cucubalus
stellatus L.
bacciferus L.
Behen L.
— alpinus.
— angustifolius.
roseus.
fabarius L.
tataricus L.
sibiricus L.
multiflorus *willd. sp.*
cæspitosus.
viscosus L.
catholicus L.
fimbriatus *marsch. cauc.*
otites L.
volgensis *willd. enum. suppl.*

Lychnis
grandiflora *jacq. ic.* }
coronata *thunb. jap.* }
chalcedonica L.

Flos-cuculi L.
viscaria L.
alpina L.
dioica L.
— rubra.

Githago
segetum. }
Agrostemma githago L. }

Agrostemma
coronaria L.

4. Fleurs terminales.

à f. de chlora. orient. or. ♆
à réseau. F. m. ♄
à fleurs jaunes. Hongrie. ♆
à bouquets. F. ☉ (orn.)

Atocion. orient. ☉

des rochers. Alpes. ♂

à quatre dents. Alpes. ♆

saxifrage. Alpes. ♄
du Valais. ♆
sans tige. Alpes. ♄

Béhen
étoilé. Am. s. ♆
baccifère. F. ♆
commun. F. ♄
— des Alpes.
— à feuilles étroites.
— à fleurs roses.
dichotome. sicile. or. ♄
de Tartarie. ♆
de Sibérie. ♆
à fleurs nombr. Hongrie. ♄
touffu. ♄
visqueux. Italie. ♂
de Rome. F. ♆
lacinié. caucase. ♆
dioïque. F. ♄
du Volga. ♄

Lychnis
à grandes fl. Jap. or. ♆ (orn.)
croix-de-Jérusalem. Russie. ♆ (orn.)
des prés. F. ♆
visqueux. F. ♄
des Alpes. ♆
dioïque. F. ♆
— rouge.

Githago
Nielle-des-blés. F. ☉

Agrostemma
coquelourde. F. ♂ (orn.)

flos-jovis *L.*
cœli-rosa *L.*
parviflora *cav. ic.*

VI. Calix tubulosus ; stamina pauciora quam 10 ; *styli* 2-3.

VELEZIA
rigida *L.*

Genera Caryophylleis affinia.

FRANKENIA
levis *L.*
pulverulenta *L.*
hirsuta *L.*
virens.

LINUM.

1. *Floribus cæruleis, albis aut rubentibus.*

usitatissimum *L.*
perenne *L.*
narbonense *L.*
austriacum *L.*
hirsutum *L.*
tenuifolium *L.*
alpinum *Jacq. Austr.*
catharticum *L.*
radiola *L.*

2. *Floribus luteis.*

gallicum *L.*
strictum *L.*
suffruticosum *L.*
africanum *L.*
trigynum *Bot. Magaz.*
quadrifolium *L.*
maritimum *L.*
campanulatum *L.*

rose. Alpes. ♄ (orn.)
maritime. F. ☉. (orn.)
à petites fleurs. ESP. ☉

VI. Calice en tube ; moins de 10 étamines ; 2-3 styles.

VÉLÉZIA
à feuilles roides. ESP. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les Caryophyllées.

FRANKÉNIA
lisse. F. ♄
pulvérulent. F. ☉
velu. orient. ♆
verdâtre. ♄

LIN.

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

cultivé. ☉ (écon. méd.)
vivace. sibérie. ♄ (écon.)
de Narbonne. ♄
d'Autriche. ♄
velu. Autriche. ♆
à feuilles menues. F. ♆
des Alpes. ♆
cathartique. F. ☉ (méd.)
radiola. F. ☉

2. Fleurs jaunes.

à petites fleurs. F. ☉
rude. F. m. ♂
sous-arbrisseau. ESP. or. ♄
d'Afrique. cap. or. ♄
à trois styles. inde. or. ♄
à f. quaternées. cap. or. ♄
maritime. F. ♄
campanulé. F. m. or. ♆

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ.

(*Stamina perigyna.*)

ORDO I.

SEMPERVIVÆ.

TILLÆA
muscosa *L.*

BULLIARDA
vaillantii *Dec. Fl.*
TILLÆA aquatica *L.*
TILLÆA vaillantii *Willd. Sp.*

CRASSULA.

1. *Herbaceæ.*

glomerata *L. Mant.*
ciliata *L.*
calicina.
acutifolia *Encycl.*
rubens *L. f.*
sedum rubens *L.*
orbicularis *L.*
lycopodioides *Encycl.*
muscosa *L.*

2. *Fruticosæ.*

coccinea *L.*
scabra *L.*
perfoliata *L.*
perfossa *Encycl.*
tetragona *L.*
obvallata *L. Mant.*
cultrata *L.*
falcata *H. K.*
rochea falcata *Dec. Pl. Gr.*
portulacea *Encycl.*
obliqua *H. K.*
lucida *Encycl.*
spathulata *Thunb. Prodr.*

CLASSE XIV.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(Étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

JOUBARBES.

TILLÉA
nain. F. ☉

BULLIARDA

de Vaillant. F. ☉

CRASSULE.

1. Tiges herbacées.

agglomérée. cap. ☉
ciliée. cap. or. ♄
à grand calice. N. Holl. or. ♄
à feuilles aiguës. cap. or. ♆
rouge. F. ☉
orbiculaire. cap. or. ♆
Lycopode. cap. or. ♆

2. Tiges ligneuses.

écarlate. cap. or. ♄ (orn.)
rude. cap. or. ♄
perfoliée. cap. or. ♄
enfilée. cap. or. ♄
tétragône. cap. or. ♄
à feuilles en scie. cap. or. ♄
en serpe. cap. or. ♄
falciforme. cap. or. ♄ (orn.)
à f. de pourpier. cap. or. ♄
luisante. cap. or. ♄

cordata L. *f.*	*en cœur.* cap. or. ♄
lactea *H. K.*	*blanche.* cap. or. ♄
cotyledon *Jacq. Miscell.*	*cotylédon.* cap. or. ♄
COTYLEDON	*COTYLÉDON*
coccinea *cav. ic.*	*safrané.* s. ch. ♄
orbiculata L.	*orbiculaire.* cap. or. ♄
hemisphærica L.	*hémisphérique.* cap. or. ♄
ungulata *Encycl.*	*ongulé.* cap. or. ♄
tuberculosa *Encycl.*	*tuberculeux.* cap. or. ♄
hispida *Encycl.* / viscosa *Vahl, symb.*	*hispide.* barbarie. ⊙
hispanica L.	*d'Espagne.* ⊙
umbilicus L.	*Nombril-de-Vénus.* F. ♄
lusitanica *Encycl.* / lutea *H. K.*	*corymbifère.* angleterre. ♄
KALANCOE	*KALANCOÉ*
laciniata *Dec. Pl. Gr.* / cotyledon laciniata L.	*lacinié.* inde. s. ch ♄
spathulata *Dec. Pl. Gr.*	*en spatule.* chine. s. ch. ♄
ægyptiaca *Dec. Pl. Gr.*	*d'Egypte.* s. ch. ♄
crenata. / verrea crenata *Andr. Rep.* / cotyledon crenata *Vent. Malm.*	*crénelé.* cap. or. ♄
SEDUM.	*SÉDUM.*
1. *Planifolia.*	1. Feuilles aplaties.
rhodiola. / rhodiola rosea L.	*odorant.* Alpes. ♆
telephium L.	*orpin.* F, ♄ (méd.)
— purpureum.	*— pourpre.*
— maximum.	*— à larges feuilles.*
anacampseros L.	*anacampséros.* F. ♄
— longifolium.	*— à feuilles longues.*
aizoon L.	*Aïzoon.* sibérie. ♆
stellatum L.	*étoilé.* F. ⊙
hybridum L.	*hybride.* tartarie. ♆
populifolium L. *f.*	*à f. de peuplier.* sibérie. ♄
cepæa L.	*cépéa.* F. ⊙
2. *Teretifolia.*	2. Feuilles cylindriques.
dasyphyllum L.	*à feuilles courtes.* Alpes. ♆
reflexum L.	*penché.* F. ♄
virens *H. K.*	*verdoyant.* portugal. ♄
rupestre L.	*des rochers.* F. ♆
altissimum *Encycl.* / sempervivum sedifolium *Jacq. Hort.*	*élevé.* eur. ♆

hispanicum L.
album L.
sexfidum *Marsch. cauc.*
glaucum *Wald. et Kitt. Hung.*
saxatile *Dec. syn.*
acre L.
sexangulare L.
anglicum *H. K.*
villosum L.
nudum *H. K.*
cruciatum.
monregalense *Balbis.*

d'Espagne. or. ♆
blanc. F. ☉
à six divisions. caucase. ♄
glauque. Hongrie. ♂
des rochers. Pyrénées. ☉
vermiculaire. F. ♆
hexagône F. ♆
d'Angleterre. ♄
velu. F. ☉
à tiges nues. canaries. or. ♄
à feuilles en croix. Alpes. ♄

SEMPERVIVUM
arboreum L.
canariense L.
glutinosum *H. K.*
tortuosum *H. K.*
villosum *H. K.*
Aizoides *Encycl.*
tectorum L.
globiferum L.
hirtum L.
montanum L.
arachnoideum L.
monanthos *H. K.*

JOUBARBE
en arbre. Barbarie. or. ♄
des Canaries. or. ♄
glutineuse. canaries. or. ♄
tortueuse. canaries. or. ♄
velue. canaries. or. ♄
Aïzoïde. canaries. or. ♄
des toits. F. ♄ (méd.)
à globules. F. ♆
hérissée. Alpes. ♆
de montagne. Alpes. ♆
arachnoïde. Alpes. ♄
à une fleur. canaries. or. ♆

PENTHORUM
sedoides L.

PENTHORUM
à grappes. Am. s. ♄

ORDO II.

SAXIFRAGEÆ.

I. Fructus superus; capsularis birostris.

HEUCHERA
americana L

SAXIFRAGA.

1. *Foliis integris; caule subnudo.*

longifolia *Lapeyr. Fl.*
pyramidalis *Lapeyr. Fl.*
cotyledon L.
pensylvanica L.
stellaris L.
umbrosa L.
hirsuta L.

ORDRE II.

SAXIFRAGÉES.

I. Ovaire supère; une capsule à deux pointes.

HEUCHÉRA
d'Amérique. Am. s. ♆

SAXIFRAGE.

1. Feuilles entières; tige presque nue.

à longues f. Pyrén. ♄ (orn.)
pyramidale. Pyrén. ♄ (orn.)
cotylédon. Alpes. ♆
de Pensylvanie. ♆
étoilée. Alpes. ♆
ombreuse. Alpes. ♆
velue. Alpes. ♄

geum L.
cuneifolia L.
crassifolia L.
sarmentosa L. f.

céum. Alpes. ♆
cunéiforme. Alpes. ♄
à f. épaisses. sibérie. ♆ (orn.)
sarmenteuse. japon. ♆

2. *Foliis integris; caule folioso.*

2. Feuilles entières; tige feuillue.

rotundifolia L.
oppositifolia L.
aizoides *willd. sp.*
autumnalis *Fl. Dan.* (non L.)
aspera L.

à feuilles rondes. Alpes. ♆
à feuilles opposées. Alpes. ♄
Aïzoïde. Alpes. ♆
rude. Alpes. ♄

3. *Foliis lobatis.*

3. Feuilles lobées.

granulata L.
geranioides L.
Tridactylites L.
cespitosa L.
hypnoides L.
furcata *Lapeyr. Fl. ?*
palmata *smith*, *Fl.*
decipiens *Ehrart.*

grenue. F. ♆
à f. de Géranium. pyrénées. ♄
à trois pointes. F. ☉
touffue. Alpes. ♆
hypnoïde. Alpes. ♄
fourchue. pyrénées. ♄
palmée. Alpes. ♄

Tiarella
cordifolia L.
biternata *vent. Malm.*

Tiarelle
à feuilles en cœur. Am. s. ♄
biternée. Am. s. ♆

Mitella
diphylla L.
nuda L.

Mitella
bifoliée. Am. s. ♄
à tige nue. Asie. ♆

II. Fructus inferus; capsularis aut baccatus.

II. Ovaire infère; une capsule ou une baie.

Chrysosplenium
oppositifolium L.
alternifolium L.

Doine
à feuilles opposées. F. ♄
à feuilles alternes. F. ♄

Adoxa
moschatellina L.

Adoxa
moschatelle. F. ♆

Hydrangea
arborescens L.
nivea *Mich. Fl.*
radiata *willd. sp.*
quercifolia *H. K.*

Hydrangéa
en arbre. Am. s. ♄
cotonneux. Am. s. ♄
à feuilles de chêne. Am. s. ♄

Hortensia
opulifolia *Encycl.*
Hydrangea hortensis *willd. sp.*

Hortensia
à f. d'obier. chine. ♄ (orn.)

Callicoma
serrata *Andr. Rep.*

Callicoma
à feuilles en scie. or. ♄

ORDO III.

CACTI.

I. Petala et stamina definita.

RIBES.

1. *Inermia.*

rubrum *L.*
— album.
petræum *Jacq. ic.*
nigrum *L.*
prostratum *l'Her. stirp.*
glandulosum *H. K.*
pensylvanicum *Encycl.*
floridum *l'Her. stirp.*
alpinum *L.*

2. *Aculeata.*

cynosbati *L.*
diacanthum *L. f.*
orientale.
GROSSULARIA *L.*
UVA-CRISPA *L.*
— rubra.

II. Petala et stamina indefinita.

CACTUS.

1. *Opuntiæ caule plano.*

opuntia *L.*
— FICUS INDICA.
— TUNA.
— nana.
— inermis.
cochinillifer *L.*
curassavicus *L.*
brasiliensis *Willd. Enum. suppl.*
spinosissimus *Encycl.*
speciosus *Bonpland*, *Malm.* (non *Willd.*)
PHYLLANTHUS *L.*
PERESKIA *L.*

2. *Echinato melocacti, subrotundi.*

mamillaris *L.*
pseudomamillaris.

ORDRE III.

CIERGES.

I. Pétales et étamines définis.

GROSEILLIER.

1. Tiges sans épines.

commun. F. ♄ (écon. méd.)
— *blanc.*
des rochers. Alpes. ♄
cassis. F. ♄ (écon.)
couché. AM. S. ♄
de Pensylvanie. ♄
des Alpes. ♄

2. Tiges épineuses.

cynosbati. AM. S. ♄
à deux épines. RUSSIE. ♄
du Liban. ♄
épineux. F. ♄ (écon.)
à maquereau. F. ♄ (écon.)
— *rouge.*

II. Pétales et étamines indéfinis.

CIERGE.

1. Opuntias à tige aplatie.

opuntia. AFR. S. S. CH. ♄ (écon.)
— *figuier-d'inde.*
— *tuna.*
— *petit.*
— *sans épines.*
à cochenille. AM. M. S. CH. ♄
de Curaçao. S. CH. ♄
du Brésil. S. CH. ♄
très-épineux. S. CH. ♄
rose. AM. M. S. CH. ♄
scolopendre. AM. M. S. CH. ♄
péreskia AM. M. S. CH. ♄

2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamillaire. ANTILLES. S. CH. ♄
mamelonné. S. CH. ♄

stellatus *Willd. Enum. suppl.*
coronatus *Willd. Enum. suppl.*
Melocactus L.

étoilé. Am. m. s. ch. ♄
couronné s. ch. ♄
Mélocacte. Antilles. s. ch. ♄

3. *Erecti, cylindrici.*

3. Tiges droites, cylindriques.

cylindricus *Encycl.*
serpentinus *Willd. Enum. suppl.*
heptagonus L.
tetragonus L.
peruvianus L.
monstrosus.
abnormis *Willd. Enum. suppl.*
Royeni L.
multangularis *Willd. Enum. suppl.*

cylindrique. Pérou. s. ch. ♄
sarmenteux. s. ch. ♄
heptagône. Am. m. s. ch. ♄
tétragône. Am. m. s. ch. ♄
du Pérou. s. ch. ♄
monstrueux. s. ch. ♄
de Royen. Am. m. s. ch. ♄
multangulaire. s. ch. ♄

4. *Repentes.*

4. Tiges rampantes.

grandiflorus L.
flagelliformis L.
parasiticus *Dec. Pl. Gr.*
pendulus *Willd. sp.*
funalis.
speciosissimus.
speciosus *Willd. Enum. suppl.*
triangularis L.
proteiformis.
triqueter (non *Willd.*)

à grandes fl. Antilles. s. ch. ♄
serpentin. Am. m. s. ch. ♄
parasite. Antilles. s. ch. ♄
à tiges grêles. s. ch. ♄
éclatant. s. ch. ♄
triangulaire. s. ch. ♄
protéiforme. s. ch. ♄
à trois angles. s. ch. ♄

ORDO IV.

PORTULACEÆ.

I. Fructus unilocularis.

ORDRE IV.

PORTULACÉES.

I. Fruit à une loge.

Portulaca
pilosa L.
oleracea L.

Pourpier
velu. Antilles. ☉
cultivé. F. ☉ (écon.)

Talinum
Anacampséros *Willd. sp.*
Portulaca Anacampseros L.
patens *Willd. sp.*
reflexum *Cav. Ic.*
trichotomum.
fruticosum *Willd. sp.*
Portulaca paniculata L.

Talinum
Anacampséros. cap. or. ♄
paniculé. Am. m. s. ch. ♄
à fl. jaunes. Am. m. s. ch. ♄
trichotome. s. ch. ♄
ligneux. Am. m. s. ch. ♄

Turnera
cistoides L.

Turnéra
à fl. de ciste. Antilles. s. ch. ♄

Montia
fontana *L.*

Tamarix
gallica *L.*
germanica *L.*

Telephium
imperati *L.*

Corrigiola
littoralis *L.*

Scleranthus
annuus *L.*
perennis *L.*

Trianthema
monogyna *L. mant.*

Claytonia
virginica *L.*
cubensis *bonpl. equin.*
perfoliata *willd. enum.*

Portulacaria
afra *jacq.*
claytonia portulacaria *L. mant.*

Montia
aquatique. F. ☉

Tamarix
de France. ♄ (orn.)
d'Allemagne. ♄ (orn.)

Télephium
d'Impérati. F. ♅

Corrigiola
des sables. F. ☉

Sclérantius
annuel. F. ☉
vivace. F. ♆

Trianthéma
monogyne. Antilles. ☉

Claytonia
de Virginie. ♆
de Cuba. ☉

Portulacaria
d'Afrique. cap. or. ♄

ORDO V.

FICOIDEÆ.

Reaumuria
vermiculata *L.*

Nitraria
schoberi *L.*
tridentata *desf. atl.*

Sesuvium
portulacastrum *L.*
revolutifolium *willd. enum.*

Aizoon
canariense *L.*
hispanicum *L.*

Glinus
lotoides *L.*

Mesembryanthemum.
1. *Foliis planis.*
cristallinum *L.*

ORDRE V.

FICOÏDES.

Réaumuria
à feuill. de sédum. barb. or. ♄

Nitraria
à feuilles entières. Russie. ♄
à trois dents. barbarie. or. ♄

Sésuvium
à f. de pourpier. inde. s. ch. ♂
à f. roulées. cuba. s. ch. ♂

Aïzoon
des Canaries. ☉
d'Espagne. ☉

Glinus
lotoïde. Esp. ☉

Ficoïde.
1. Feuilles planes.
cristalline. Madère. ☉

linguiforme *L.*	*linguiforme.* cap. or. ♄
tortuosum *L.*	*tortueux.* cap. or. ♄
expansum *L.*	*ouvert.* cap. or. ♄
pinnatifidum *L. f.*	*pinnatifide.* cap. ☉
cordifolium *L. f.*	*en cœur.* cap. or. ♄
cuneifolium *Jacq. ic.*	*cunéiforme.* cap. ☉
limpidum *H. K.*	
helianthoides *H. K.*	*à fleur de soleil.* cap. ☉
2. *Foliis subtus convexis.*	2. Feuilles convexes en-dessous.
ciliatum *H. K.*	*cilié.* cap. or. ♄
geniculiflorum *L.*	*géniculiflore.* cap. or. ♄
noctiflorum *L.*	*de nuit.* cap. or. ♄
pallens *H. K.*	*pâle.* cap. or. ♄
bicolorum *L.*	*écarlate.* cap. or. ♄
coccineum *Dec. Pl. Gr.*	
tuberosum *L.*	*tubéreux.* cap. or. ♄
tenuifolium *L.*	*à feuilles menues.* cap. or. ♄
violaceum *Dec. Pl. Gr.*	*violet.* cap. or. ♄
stipulaceum *L.*	*à stipules.* cap. or. ♄
corniculatum *L.*	*cornu.* cap. or. ♄
loreum *L.*	*courroie.* cap. or. ♄
veruculatum *L.*	*à feuilles lisses.* cap. or. ♄
echinatum *H. K.*	*hérissé.* cap. or. ♄
viridiflorum *H. K.*	*à fleurs vertes.* cap. or. ♄
splendens *L.*	*luisant.* cap. or. ♄
villosum *L.*	*velu.* cap. or. ♄
micans *L.*	*argenté.* cap. or. ♄
rostratum *L.*	*bec-de-grue.* cap. or. ♄
caninum *Dec. Pl. Gr.*	*gueule-de-chien.* cap. or. ♄
felinum *Dec. Pl. Gr.*	*gueule-de-chat.* cap. or. ♄
tigrinum *Haw.*	*gueule-de-tigre.* cap. or. ♄
testiculare *Jacq. Fragm.*	*bilobé.* cap. or. ♄
3. *Foliis teretibus.*	3. Feuilles cylindriques.
nodiflorum *L.*	*nodiflore.* Barbarie. or. ♄
brachiatum *H. K.*	*étalé.* cap. or. ♄
hispidum *L.*	*hispide.* cap. or. ♄
striatum *Dec. Pl. Gr.*	*strié.* cap. or. ♄
barbatum *L.*	*barbu.* cap. or. ♄
stellatum *Dec. Pl. Gr.*	*étoilé.* cap. or. ♄
calamiforme *L.*	*doigt-d'enfant.* cap. or. ♄
4. *Foliis triquetris.*	4. Feuilles triangulaires.
falcatum *L.*	*falciforme.* cap. or. ♄
reptans *H. K.*	*rampant.* cap. or. ♄
spinosum *L.*	*épineux.* cap. or. ♄
glomeratum *L.*	*aggloméré.* cap. or. ♄

glaucum *L.*
spectabile *willd. sp.*
aureum *willd. sp.*
serratum *L.*
scabrum *L.*
uncinatum *L.*
— minus.
pugioniforme *L.*
filamentosum *L.*
acinaciforme *L.*
lacerum *H. K.*
deltoides *L.*
albidum *L.*
bellidiflorum *L.*
dolabriforme *L.*

glauque. cap. or. ♄
à grandes fleurs. cap. or. ♄
doré. cap. or. ♄
denté. cap. or. ♄
rude. cap. or. ♄
à crochet. cap. or. ♄
—petit.
en poignard. cap. or. ♄
filamenteux. cap. or. ♄
en sabre. cap. or. ♄
lacéré. cap. or. ♄
deltoïde. cap. or. ♄
blanc. cap. or. ♆
à fl. de paquerette. cap. or. ♆
en doloire. cap. or. ♄

TETRAGONIA
decumbens *Dec. Pl. Gr.*
echinata *H. K.*
expansa *Syst. Veget.*
cristallina *l'Her. Stirp.*

TÉTRAGONIA
tombant. cap. or. ♄
hérissé. cap. or. ☉
étalé. N. zél. ☉
cristallin. Pérou. ☉

ORDO VI.

ONAGRÆ.

I. Styli plures.

MYRIOPHYLLUM
spicatum *L.*
verticillatum *L.*

PROSERPINACA
palustris *L.*

CERCODIA
erecta *Murr. Gœtt.*
Ludwigia cercodia *Jacq. Ic.*
Halogaris cercodia *H. K.*
Tetragonia ivæfolia *L. f.*

ORDRE VI.

ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU
à épis. F. ♅
verticillé. F. ♆

PROSERPINACA
des marais. Am. S. ♅

CERCODIA
à tige droite. N. zél. or. ♄

II. Stylus 1 ; *fructus capsularis* ; *stamina petalis numero æqualia aut pauciora.*

TRAPA
natans *L.*

LOPEZIA
racemosa *Cav. Ic.*
hirsuta *Jacq. coll. suppl.*
miniata *Dec. Cat.*

II. Un style ; une capsule ; étamines en nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE
flottante. F. ♆ (alim.)

LOPÉZIA
à grappes. Mexique. ☉ (orn.)
velu. Mexique. ☉
arbrisseau. Mexique. S. ch. ♄ (orn.)

CIRCÆA
lutetiana L.
alpina L.

LUDWIGIA
macrocarpa *Mich. Fl.*
alternifolia L.

III. Stylus 1 ; *fructus capsularis* ; *stamina petalorum dupla.*

JUSSIÆA
erecta L.

OENOTHERA.

1. *Capsulis teretibus.*

biennis L.
grandiflora *Willd. sp.*
parviflora L.
muricata *S. Veg.*
longiflora *Jacq. Hort.*
mollissima L.
odorata *Jacq. Ic.*
nocturna *Jacq. Ic.*
albicans *Encycl.*
sinuata *S. Veg.*

2. *Capsulis angulatis.*

tetraptera *Cav. Ic.*
purpurea *Bot. Mag.*
rosea *Willd. sp.*
pumila L.

GAURA
biennis L.
fruticosa *Jacq. Ic.*
mutabilis *Cav. Ic.*

tripetala *Cav. Ic.*
undulata

EPILOBIUM
angustifolium *Encycl.*
angustissimum *H. K.*
spicatum *Encycl.*
angustifolium *H. K.*
hirsutum *Willd. sp.*
pubescens *Roth. Germ.*
montanum L.
palustre L.

CIRCÉE
des bois. F. ♆
des Alpes. ♆

LUDWIGIA
à gros fruit. virginie. ♆

III. Un style ; une capsule ; étamines en nombre double des pétales.

JUSSIÉA
à tige droite. Antilles. ☉

OENOTHÉRA

1. Capsules cylindriques.

commun. F. ♂
à grandes fleurs. Am. S. ♂
à petites fleurs. Am. S. ♂
tuberculeux. Am. S. ♂
à long. fl. Buenos-Ayres. S. ch. ♂
velouté. Buenos-Ayres. S. ch. ♂
odorant. Magellan. ♂
noctiflore. cap. ☉
sinué. Am. S. or. ♂

2. Capsules anguleuses.

à quatre ailes. N. Esp. S. ch. ♄
pourpre. Am. S. ☉
rose. Pérou. or. ♄
nain. Am. S. ♄

GAURA
bisannuel. Am. S. ♂
arbrisseau. Antilles. S. ch. ♄
à fleurs changeantes. Mexiq. S. ch. ♄
à trois pétales. or. ♆
ondulé. ♄

EPILOBIUM
à feuilles étroites. F. ♆
à grappes. F. ♄ (orn.)
velu. F. ♆
pubescent. F. ♄
de montagne. F. ♆
des marais. F. ♄

tetragonum L.
Dodonæi *vill. delph.*
alpinum L.

FUCHSIA
magellanica *encycl.*
coccinea *H. K.*
lycioides *Andr. rep.*

MENTZELIA
hispida *willd. sp.*
aspera *cav. ic.* (non *Lin.*)

tétragône. F. ♄
de Dodoens. F. ♆
des Alpes. ♆

FUCHSIA
écarlate. chili. or. ♄ (orn.)
à f. de Lycium. Ant. s. ch. ♄

MENTZÉLIA
hérissé. mexique. s. ch. ♄

ORDO VII.

MYRTI.

MELALEUCA
thymifolia *smith, soc. L.*
coronata *Andr. rep.*
gnidiæfolia *vent. malm.*
hypericifolia *smith, soc. L.*
myrtifolia *vent. malm.*
squarrosa *smith, soc. L.*
armillaris *H. K.*
ericæfolia *vent. malm.*
styphelioides *smith, soc. L.*
diosmæfolia *Andr. rep.*
gibbosa *Labill. N. holl.*
linarifolia *smith, soc. L.*
metrosyderos hyssopifolia *cav. ic.*
neriifolia *Andr. rep.*

LEPTOSPERMUM
scoparium *smith, soc. L.*
ambiguum *smith, soc. L.*
myrtifolium.
Thea *willd. sp.*
flavescens *H. K.*
melaleuca thea *sert. hann.*
pubescens *willd. sp.*
juniperinum *smith, soc. L.*
lanigerum *smith, soc. L.*

FABRICIA
lævigata *smith, soc. L.*

METROSIDEROS
saligna *smith, soc. L.*

ORDRE VII.

MYRTES.

MÉLALEUCA
à f. de Thym. N. holl. or. ♄
à f. d'Hypéricum. N. holl. or. ♄ (orn.)
à f. de Myrte. N. holl. or. ♄
armillaire. N. holl. or. ♄
à f. de styphélia. N. holl. or. ♄
à f. de Diosma. N. holl. or. ♄
gibbeux. N. holl. or. ♄
à f. d'Hysope. N. holl. or. ♄
à f. de Nérium. N. holl. or. ♄

LEPTOSPERMUM
de la N. Zélande. or. ♄
à long. étamines. N. holl. or. ♄
à f. de Myrte. N. holl. or. ♄
Théa. N. holl. or. ♄
pubescent. N. holl. or. ♄
à f. de Genévrier. N. holl. or. ♄
laineux. N. holl. or. ♄

FABRICIA
lisse. N. holl. or. ♄

MÉTROSIDÉROS
à f. de saule. N. holl. or. ♄

lophanta *vent. h. cels.*
lanceolata *smith, soc. l.*
glandulosa.
corifolia *vent. malm.*
pinifolia *wendl. collect.*
linearis *smith, soc. l.*
melaleuca linearis *sert. hann.*
floribunda *vent. malm.*

lancéolé. n. holl. or. ♄ (orn.)
glanduleux. n. holl. or. ♄
à f. de coris. n. holl. or. ♄
à f. de pin. n. holl. or. ♄
à feuill. étroites. n. holl. or. ♄
à fleurs nombr. n. holl. or. ♄

EUCALYPTUS
robusta *smith, soc. l. ?*
oppositifolia.
obliqua *l'hert. sert.*
amygdalina *bill. n. holl.*
piperita *h. k.*
discolor.

EUCALYPTUS
gigantesque. n. holl. or. ♄
à f. opposées. n. holl. or. ♄
oblique. n. holl. or. ♄
à f. d'Amandier. n. holl. or. ♄
poivré. n. holl. or. ♄
de deux couleurs. n. holl. or. ♄

PSIDIUM
pyriferum *l.*
montanum *swartz. prodr.*

GOYAVIER
poire. inde. or. ♄
de montagne. ant. s. ch. ♄

MYRTUS
communis *l.*
— bœtica.
— romana.
— tarentina.
— belgica.
— mucronata.
pimenta *l.*
tomentosa *h. k.*
horizontalis *vent. malm.*

MYRTE
commun. f. or. ♄ (orn. méd.)
— d'Andalousie.
— romain.
— de Tarente.
— moyen.
— pointu.
pimento, tout-épice. antilles. s. ch. ♄ (écon.)
cotonneux. chine. s. ch. ♄
horizontal. ant. m. s. ch. ♄

EUGENIA
uniflora *l.*
jambos *l.*
malaccensis *l.*
baruensis *jacq. ic.*

EUGÉNIA
à une fleur. brésil. s. ch. ♄
Jamrose. inde. s. ch. ♄
de Malaca. inde. s. ch. ♄
de Baru. s. ch. ♄

CALYPTRANTHES
zuzygium *swartz. prodr.*
myrtus zuzygium *l.*

CALYPTRANTÈS
zuzygium. antilles. s. ch. ♄

DECUMARIA
barbara *l.*

DÉCUMARIA
sarmenteux. caroline. ♄

PUNICA
granatum *l.*
— nanum.
— flavum.

GRENADIER
cultivé. tunis. or. ♄ (écon.)
— nain.
— jaune.

PHILADELPHUS
coronarius L.
— nanus.
inodorus L.

SERINGAT
odorant. F. ♄ (orn.)
— *nain.*
inodore. caroline. ♄ (orn.)

ORDO VIII.

MELASTOMÆ.

BLAKEA
trinervia L.

MELASTOMA
elæagnoides *swartz. prodr.*
cymosa *willd. sp.*

ORDRE VIII.

MÉLASTOMES.

BLAKÉA
à trois nervures. Ant. s. ch. ♄

MÉLASTOME
à f. d'éléagnus. Ant. s. ch. ♄
corymbifère. Ant. s. ch. ♆

ORDO IX.

SALICARIÆ.

LAGERSTROEMIA
indica L.

LAWSONIA
inermis L. }
spinosa L. }

LYTHRUM
salicaria L.
virgatum L.
hyssopifolia L.

CUPHEA
viscosissima *jacq. hort.* }
Lythrum cuphea L. *f.* }

ISNARDIA
palustris L.

GLAUX
maritima L.

PEPLIS
portula L.

ORDRE IX.

SALICAIRES.

LAGERSTROÉMIA
des Indes. or. ♄ (orn.)

LAWSONIA
d'Orient. or. ♄ (orn. teint.)

SALICAIRE
commune. F. ♃ (orn.)
effilée. Autriche. ♃ (orn.)
à feuilles d'hysope. F. ☉

CUPHÉA
visqueux. Brésil. ☉

ISNARDIA
des marais. F. ♆

GLAUX
maritime. F. ♆

PÉPLIS
aquatique. F. ☉

ORDO X.

ROSACEÆ.

I. Germen simplex inferum; polystylum; pomum calycino limbo umbilicatum, multiloculare.

MALUS
communis.

ORDRE X.

ROSACÉES.

I. Un seul ovaire infère; plusieurs styles; une pomme à plusieurs loges, terminée par un ombilic couronné par le calice.

POMMIER
commun. F. ♄ (écon.)

— sylvestris.	— *sauvage.*
— prasomila.	— *de reinette.*
— paradisiaca.	— *de paradis.*
— castanea.	— *de châtaignier.*
— apiosa.	— *d'apis.*
coronaria. / pyrus coronaria *H. K.*	*odorant.* Am. s. ♄
sempervirens. / pyrus angustifolia *H. K.*	*toujours vert.* Am. s. ♄
hybrida. / pyrus hybrida *Willd. sp.*	*hybride.* ♄
baccata. / pyrus baccata *L. Mant.*	*baccifère.* sibérie. ♄
spectabilis. / pyrus spectabilis *H. K.*	*à bouquets.* chine. ♄ (orn.)
japonica *Andr. Rep.*	*du Japon.* ♄
PYRUS	*POIRIER*
communis *L.*	*commun.* F. ♄ (écon.)
— pyraster.	— *sauvageon.*
— pompeiana.	— *BON-chrétien.*
— rufescens.	— *de rousselet.*
— liquescens.	— *de beuré.*
polveria *L. Mant.*	*cotonneux.* F. ♄
sinai *Thouin, Ann.*	*du mont Sinaï.* ♄
salicifolia *L. f.*	*à feuilles de saule.* sibérie. ♄
CYDONIA	*COIGNASSIER*
vulgaris.	*commun.* F. ♄ (écon.)
— lusitanica.	— *de Portugal.*
sinensis *Thouin, Ann.*	*de Chine.* ♄
CRATÆGUS	*ALISIER*
torminalis *L.*	*des bois.* F. ♄ (écon.)
latifolia *Encycl.*	*à larges feuilles.* F. ♄
Aria *L.*	*Allouchier.* F. ♄
— longifolia.	— *à feuilles longues.*
chamæmespilus. / humilis *Encycl.*	*nain.* Alpes. ♄
arbutifolia *Encycl.*	*à f. d'Arbousier.* Am. s. ♄
glabra *H. K.*	*glabre.* chine. or. ♄
pyrifolia *Encycl.*	*à f. de POIRIER.* Am. s. ♄
spicata *Encycl.*	*à épis.* Am. s. ♄
racemosa *Encycl.*	*à grappes.* Am. s. ♄
Amelanchier. / rotundifolia *Encycl.*	*Amelanchier.* F. ♄
SORBUS	*SORBIER*
aucuparia *L.*	*des oiseleurs.* F. ♄ (orn.)
americana.	*d'Amérique.* Am. s. ♄ (orn.)

domestica L.	*cormier.* F. ♄ (écon.)
hybrida L.	*de Laponie.* ♄ (orn.)
Mespilus	*Néflier*
oxyacantha.	*Aubépine.* F. ♄ (orn.)
— plena.	*— double.* (orn.)
— rubra.	*— rose.* (orn.)
monogyna *Jacq. Austr.*	*monogyne.* F. ♄
Azarolus.	*Azerole.* F. ♄ (écon.)
— aronia.	*— d'Orient.*
sanguinea.	*sanguin.* Am. S. ♄
spathulata *Mich. Fl.*	*en spatule.* Am. S. ♄
tanacetifolia *Encycl.*	*à f. de Tanaisie.* orient. ♄
tomentosa L.	*cotonneux, Pinchaw.* Am. S. ♄
corallina. } acerifolia *Encycl.* }	*Petit-corail.* Am. S. ♄
coccinea.	*écarlate.* Am. S. ♄
pyrifolia. } cornifolia *Encycl.* }	*à f. de Poirier.* Am. S. ♄
linearis.	*à feuilles étroites.* Am. S. ♄
prunifolia *Encycl.*	*à f. de Prunier.* Am. S. ♄
crus-galli *Encycl.*	*Pied-de-coq.* Am. S. ♄
Pyracantha L.	*Buisson-ardent.* F. ♄ (orn.)
cotoneaster L.	*cotoneaster.* F. ♄
germanica L.	*cultivé.* F. ♄
japonica *Thunb. Jap.*	*du Japon.* ♄ (écon.)

II. Germina indefinita, calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla.

II. Ovaires indéfinis renfermés dans un calice étranglé à son sommet, surmontés chacun d'un style.

Rosa.

Rosier.

1. *Fructibus subglobosis.*

1. Fruits presque ronds.

berberifolia *Pall. Act. Petr.*	*à une feuille.* perse. or. ♄
Eglanteria L. } lutea *H. K.* }	*Églantier.* Allem. ♄ (orn.)
— punicea.	*— ponceau.* (orn.)
sulphurea *H. K.*	*jaune.* orient. ♄ (orn.)
spinosissima L.	*hérissé.* F. ♄
scotica.	*d'Ecosse.* ♄
cinnamomea L.	*cannelle.* Alpes. ♄
arvensis L. *Mant.*	*des champs.* ♄
carolina L.	*de Caroline.* ♄
parviflora *Willd. sp.*	*à petites fleurs.* Am. S. ♄
lucida *Willd. sp.*	*luisant.* Am. S. ♄
villosa L.	*velu.* F. ♄
sinica.	*de Chine.* ♄
kamtchatica *Vent. ch. de* P.	*du Kamtchatka.* ♄

2. *Fructibus ovatis.*

remensis.
burgundiaca.
damascena *willd. sp.*
centifolia *L.*
— unguiculata.
muscosa *H. K.*
maxima.
semperflorens (non *willd.*) }
sempervirens *H. K.* }
turbinata *H. K.* }
francofurtensis. }
gallica *L.*
bracteata *vent. H. cels.*
alba *L.*
collina *Jacq. Austr.*
rubiginosa *L. Mant.*
canina *L.*
glauca. }
rubrifolia *vill. Delph.* }
alpina *L.*
pendulina *L.*
moschata *H. K.*
diversifolia *vent. H. cels.* }
semperflorens *Jacq. H. sch.* }
sempervirens *L.*

III. Germina plura definita (rariùs unum), calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla; semina totidem.

POTERIUM
sanguisorba *L.*
polygamum *Willd. sp.*
hybridum *L.*
ancistroides *Desf. Atl.*
caudatum *H. K.*
spinosum *L.*

SANGUISORBA.
officinalis *L.*
media *L.*
canadensis *L.*

ANCISTRUM
ascendens *Vahl, sp.*
repens *vent. H. cels.*

WALDSTEINIA
geoides *willd. sp.*

2. Fruits ovales.

de Champagne. ♄ (orn.)
de Bourgogne. ♄ (orn.)
de Damas. ♄ (orn.)
à cent feuilles. (orn.)
— *onguiculé.*
mousseux. ♄ (orn.)
de Hollande. ♄ (orn.)
de tous les mois. ♄ (orn.)
à gros calice. ♄ (orn.)
de Provins. EUR. ♄ (orn. méd.)
de Macartney. CHINE. ♄ (orn.)
blanc. EUR. ♄ (orn.)
des collines. F. ♄
odorant. F. ♄
de chien. F. ♄
glauque. Alpes. ♄
des Alpes. ♄
à fruit pendant. ♄
musqué. BARBAR. ♄ (orn. écon.)
du Bengale. ♄ (orn.)
toujours vert. ALLEM. ♄

III. Ovaires en nombre défini (rarement un seul), surmontés chacun d'un style, renfermés dans un calice étranglé au sommet; autant de graines.

PIMPRENELLE
des jardins. F. ♆ (écon. méd.)
polygame. HONGRIE. ♆
hybride. F. m. ♄
à f. d'Ancistrum. ALGER. or. ♄
à grappes. MADÈRE. or. ♄
épineuse. ORIENT. or. ♄

SANGUISORBE
officinale. F. ♄ (écon.)
moyenne. AM. S. ♄
de Canada. ♆

ANCISTRUM
à tige montante. MAGELLAN. ♆
rampant. PÉROU. or. ♄

WALDSTEINIA
à f. de géum. HONGRIE. ♄

AGRIMONIA	*AIGREMOINE*
eupatoria L.	*officinale.* F. ♆ (méd.)
— alba.	*— à fleurs blanches.*
— odorata.	*— odorante.*
repens L.	*rampante.* orient. ♄
agrimonioides L.	*à feuilles ternées.* italie. ♆
CLIFFORTIA	*CLIFFORTIA*
ilicifolia L.	*à feuill. de houx.* cap. or. ♄
tridentata *Willd. sp.*	*à trois dents.* cap. or. ♄
ruscifolia L.	*à f. de fragon.* cap. or. ♄
ALCHEMILLA	*ALCHÉMILLE*
vulgaris L.	*commune.* F. ♆ (méd.)
hybrida L.	*hybride.* Alpes. ♄
alpina L.	*satinée.* Alpes. ♆
pentaphyllea L.	*à cinq feuilles.* Alpes. ♆
aphanes. / aphanes arvensis L.	*perche-pierre.* F. ☉
SIBBALDIA	*SIBBALDIA*
procumbens L.	*couché.* Alpes. ♄

IV. Germina indefinita supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla; semina totidem nuda aut rariùs baccata.

IV. Ovaires supères et indéfinis, attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style; autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLA	*TORMENTILLE*
erecta L.	*droite.* F. ♆
reptans L.	*rampante.* F. ♆
POTENTILLA.	*POTENTILLE.*
1. *Foliis pinnatis.*	1. Feuilles pennées.
fruticosa L.	*arbrisseau.* sibérie. ♄
anserina L.	*argentine.* F. ♄
multifida L.	*laciniée.* F. ♆
supina L.	*couchée.* F. ☉
bifurca L.	*bifurquée.* sibérie. ♆
rupestris L.	*des rochers.* Alpes. ♆
pensylvanica L. *Mant.*	*de Pensylvanie.* ♄
2. *Foliis digitatis.*	2. Feuilles digitées.
recta L.	*droite.* Alpes. ♄
laciniosa *Wald. et Kitt. Hung.*	*laciniée.* Hongrie. ♄
pedata *Nester, Pot.*	*en pédale.* ♄
obscura *Marsch. cauc.*	*obscure.* caucase. ♄
canescens *Besser, Fl.* / ascendens *Vill. Delph.* / recta *Jacq. Austr.*	*blanchâtre.* F. ♆

hirta L.	*hérissée.* F. m. ♃
argentea L.	*argentée.* F. ♃
verna L.	*printanière.* F. ♃
alchimilloides *Lapeyr. Fl.*	*à f. d'Alchimille.* Pyrénées. ♆
aurea L.	*dorée.* Alpes. ♆
intermedia L.	*moyenne.* Alpes. ♆
incisa *Nester, Pot.*	*incisée.* ♃
alba L.	*blanche.* Alpes. ♆
lupinoides *Willd. sp.*, valderia *Vill. Delph.*	*à feuilles de Lupin.* Alpes. ♆
caulescens L.	*montante.* F. ♃

3. *Foliis ternatis.*

3. Feuilles ternées.

grandiflora L.	*à grandes fleurs.* Alpes. ♆
monspeliensis L.	*de Montpellier.* ♆
norvegica L.	*de Norvège.* ♆
parviflora.	*à petites fleurs.* F. ♃
Fragaria sterilis *Willd. sp.*	
emarginata.	*échancrée.* F. ♆
vaillantii *Nester, Pot.*	

Fragaria	*Fraisier*
vesca L.	*des bois.* F. ♃ (écon. méd.)
— monophylla *Willd. sp.*	— *à une feuille.*
— eflagellis.	— *sans coulans.*
— semperflorens.	— *de tous les mois.*
— moschata.	— *capiton.*
— nigra.	— *noir.*
— viridis.	— *vert.*
— virginiana *Willd. sp.*	— *de Virginie.*
— chiloensis *Willd. sp.*	— *du Chili.*
— ananassa.	— *ananas.*
Comarum	*Comarum*
palustre L.	*des marais.* F. ♃
Geum	*Benoite*
urbanum L.	*officinale.* F. ♃ (méd.)
virginianum L.	*de Virginie.* ♃
album *Willd. Enum.*, canadense *Jacq. Hort.*	*à fleurs blanches.* Am. S. ♆
canadense *Murr. Goett.*, strictum *Willd. sp.*, alepicum *Jacq. Ic.*	*de Canada.* ♃
rivale L.	*des ruisseaux.* Alpes. ♆
nutans *Encycl.*	*penchée.* F. ♃
pyrenaicum *Willd. sp.*	*des Pyrénées.* ♃
montanum L.	*de montagne.* Alpes. ♃
reptans L.	*rampante.* Alpes. ♆

DRYAS
octopetala L.

RUBUS.

1. *Fruticosi.*

idæus L.
occidentalis L.
villosus H. K.
vulpinus.
fruticosus L.
— inermis.
laciniatus *Willd.* H. Ber.
rosæfolius *Smith*, IC.
cæsius L.
— crispus.
odoratus L.

2. *Herbacei.*

saxatilis L.
arcticus L.
chamæmorus L.

V. Germina plura supera definita; capsulæ totidem mono aut polyspermæ.

SPIRÆA.

1. *Herbaceæ.*

filipendula L.
aruncus L.
ulmaria L.
lobata *S. veg.*
trifoliata L.

2. *Fruticosæ.*

sorbifolia L.
salicifolia L.
lævigata L.
tomentosa L.
hypericifolia L.
crenata L.
chamædrifolia L.
opulifolia L.

VI. Germen 1 monostylum; nux mono aut disperma, nuda vel drupacea.

PRUNUS.

1. *Cerasi. Nucleo subrotundo.*

caroliniana H. K.

DRYAS
à huit pétales. Alpes. ♆

RONCE.

1. Tiges ligneuses.

framboisier. F. ♄ (écon.)
d'Occident. Am. s. ♄ (écon.)
velue. Am. s. ♄
des haies. F. ♄ (écon. méd.)
— *sans épines.*
laciniée. ♄
à f. pennées. île de F. s. ch. ♄
à fruit bleu. F. ♄ (écon.)
— *crépue.*
odorante. Am. s. ♄

2. Tiges herbacées.

des rochers. F. ♃
du Nord. suède. ♆ (écon.)
des marais. suède. ♃ (écon.)

V. Ovaires supères en nombre défini; autant de capsules renfermant une ou plusieurs graines.

SPIRÉA.

1. Tige herbacée.

filipendule. F. ♆ (orn.)
à grappes. F. ♆ (orn.)
ulmaire. F. ♃
à feuilles lobées. Am. s. ♃
à trois folioles. Am. s. ♆ (orn.)

2. Tiges ligneuses.

à f. de sorbier. sibér. ♄ (orn.)
à f. de saule. sibér. ♄ (orn.)
à feuilles lisses. sibérie. ♄
cotonneux. Am. s. ♄ (orn.)
à f. d'hypericum. F. ♄ (orn.)
à feuilles crénelées. sibérie. ♄
à f. de chamédrys. sibér. ♄
à f. d'obier. Am. s. ♄ (orn.)

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style; une noix nue ou recouverte d'une pulpe, renfermant 1-2 graines.

PRUNIER.

1. Cerisiers. Noyau presque rond.

de Caroline. or. ♄

Laurocerasus L.	*Laurier-cerise.* F. ♄ (orn. vén.)
lusitanica L.	*Azarero.* Portugal. ♄ (orn.)
Padus L.	*à grappes.* F. ♄ (orn.)
— rubra.	*— à fruit rouge.*
virginiana L.	*de Virginie.* ♄ (orn.)
serotina *Willd. sp.*	*tardif.* virginie. ♄
pumila L. *Mant.*	*Nagouminier.* Am. s. ♄
chamæcerasus *Jacq. ic.*	*Chamécerasus.* Autr. ♄
Mahaleb L.	*Mahaleb.* F. ♄ (orn.)
semperflorens *Willd. sp.* / serotina *Roth. cat.*	*de la Toussaint.* ♄
cerasus L.	*cerisier.* F. ♄ (écon.)
— nana.	*— nain.*
— ruberrima.	*— de Montmorenci.*
— suavissima.	*— royal* ou *chéridue.*
— juliana.	*— Guignier à fruit noir.*
avium L.	*Merisier.* F. ♄ (écon.)
— sylvestris.	*— des bois à fruit rouge.*
— nigra.	*— à fruit noir.*
— bigarella.	*— Bigarotier.*
persicifolia.	*à feuilles de Pêcher.* ♄
2. *Pruni. Nucleo ovato, subcompresso.*	2. Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.
spinosa L.	*épineux* ou *prunellier.* F. ♄
sinensis. / Amygdalus pumila L.	*de Chine.* ♄ (orn.)
prostrata *Bill. Dec.*	*couché.* orient. ♄
insititia L.	*sauvage.* F. ♄
brigantiaca *Vill. Delph.*	*de Briançon.* ♄
domestica L.	*cultivé.* F. (écon.)
— cerea.	*— de Sainte-Catherine.*
— cereola.	*— de mirabelle.*
— damascena.	*— de Damas.*
— hungarica.	*— de Damas noir.*
— claudiana.	*— de reine Claude.*
Myrobalana. / cerasifera *Willd. sp.*	*de myrobolan.* Am. s. ♄ (écon.)
hiemalis *Mich. Fl.*	*d'hiver.* Am. s. ♄
3. *Armeniacæ. Nucleo orbiculari, compresso.*	3. Abricotiers. Noyau orbiculaire, comprimé.
Armeniaca L.	*Abricotier.* orient. ♄ (écon.)
— dulcis.	*— Alberge.*
— nigra.	*— à fruit noir.*
— macrocarpa.	*— Pêche.*
Amygdalus	*Amandier*
persica L.	*Pêcher.* perse. ♄ (écon.)

communis *L.*
— plena.
— amara.
nana *L.*
georgica.
orientalis *H. K.* }
argentea *Encycl.* }

cultivé. Asie. ♄ (écon.)
— *double.* (orn.)
— *amer.* (vénén.)
nain. sibérie. ♄ (orn.)
de Géorgie. ♄

satiné. perse. ♄

CALYCANTHUS
floridus *L.*
lævigatus *willd. enum.* }
ferax *mich. fl.* }
præcox *L.*

CALYCANTHUS
de Virginie. ♄ (orn.)
à feuilles lisses. Am. s. ♄
du Japon. ♄ (orn.)

BLACKWELLIA
axillaris *Lamk, Ill.*

BLACKWELLIA
axillaire. Ile de F. s. ch. ♄

HOMALIUM
racemosum *Jacq. Am.*

HOMALIUM
à grappes. Antilles. s. ch. ♄

ORDO XI.

LEGUMINOSÆ.

I. Corolla regularis, quandoque nulla; stamina distincta.

ORDRE XI.

LÉGUMINEUSES.

I. Corolle régulière, quelquefois nulle; étamines distinctes.

ACACIA.

1. *Foliis simplicibus.*

verticillata *willd. sp.*
juniperina *willd. sp.*
linifolia *willd. sp.*
floribunda *willd. sp.*
sophoræ *Bill. N. Holl.?*
obliqua *Wendl. obs.* }
falcata *willd. sp.* }
dodonæifolia *Pers. syn.*
longifolia *willd. sp.*
suaveolens *willd. sp.*
stricta *willd. sp.*
latifolia. }
melanoxylon *H. K.* }
paradoxa *Dec. cat.*
armata *H. K.*

ACACIE.

1. Feuilles simples.

verticillée. N. Holl. or. ♄
à f. de Genévrier. N Holl. or. ♄
à f. de Lin. N. Holl. or. ♄
à fl. nombr. N. Holl. or. ♄
sophora. N. Holl. or. ♄
oblique. N. Holl. or. ♄
à f. de Dodonée. N. Holl. or. ♄
à long. feuill. N. Holl. or. ♄
triangulaire. N. Holl. or. ♄
ramassée. N. Holl. or. ♄
à larges feuill. N. Holl. or. ♄
ondulée. s. ch. ♄
épineuse. N. Holl. or. ♄

2. *Foliis conjugatis simulque pinnatis.*

pulchella *H. K.*
strombulifera *Willd. sp.*
coronillæfolia.
furcata.

2. Feuilles conjuguées et pennées.

élégante. N. Holl. or. ♄
tire-bouchon. Pérou. s. ch. ♄
à feuilles de coronille. s. ch. ♄
bifurquée. s. ch. ♄

3. *Foliis duplicato-pinnatis.*

a. *Aculeatæ aculeis sparsis.*

sarmentosa.
uncinella.
trinervia.
ceratonia *willd. sp.*
rhodacantha.

b. *Spinosæ; spinis axillaribus.*

juliflora *willd. sp.*
guayaquilensis.
mauroceana.
senegal *willd. sp.*
nilotica.
vera *willd. sp.*
indica.
farnesiana *willd. sp.*
eburnea *willd. sp.*
cornigera *willd. sp.*

c. *Inermes.*

muricata *willd. sp.*
portoricensis *willd. sp.*
leucocephala.
mimosa leucocephala *Encycl.*
lophantha *willd. sp.*
arborea *willd. sp.*
mimosa filicifolia *Encycl.*
tetragona *willd. sp.*
julibrisin *willd. sp.*
decurrens *willd. sp.*
peregrina *willd sp.*
angustifolia *Encycl.*
Lebbek *willd. sp.*
trichodes *willd. sp.*
scandens *willd. sp.*
botrycephala.
discolor *willd. sp.*
lentiscifolia.

angustisiliqua.
Desmantus virgatus *willd. sp.*
pubescens.
Mimosa pubescens *vent. Malm.*
glandulosa *willd. sp.*
punctata.
Desmantus punctatus *willd. sp.*

3. Feuilles deux fois pennées.

a. Aiguillons épars.

sarmenteuse. s. ch. ♄
à crochets. s. ch. ♄
à trois nervures. s. ch. ♄
à f. de caroubier. Ant. s. ch. ♄
à épines de rosier. s. ch. ♄

b. Epineuses; épines axillaires.

à chatons. Jamaïque. s. ch. ♄
de Guayaquil. s. ch. ♄
de Maroc. s. ch. ♄
Sénégal. Afr. s. ch. ♄
du Nil. s. ch. ♄
de l'Inde. s. ch. ♄
de Farnèse. s. ch. ♄
à épines blanches. s. ch. ♄
à grosses épines. s. ch. ♄

c. Tiges sans épines.

tuberculeuse. Antilles. s. ch. ♄
de Porto-Rico. s. ch. ♄
à tête blanche. Ant. s. ch. ♄
en panache. N. Holl. or. ♄
en arbre. Antilles. s. ch. ♄
tétragône. caracas. s. ch. ♄
arbre de soie. ♄ (orn.)
décurrente. N. Holl. or. ♄
à f. étroites. Antilles. s. ch. ♄
Lebbek. Inde. s. ch. ♄
barbue. Pérou. s. ch. ♄
grimpante. Inde. s. ch. ♄
à grappes. N. Holl. or. ♄
à feuill. de Lentisque. Mexiq. s. ch. ♄
à gousses étroites. Ant. s. ch. ♄
pubescente. s. ch. ♄
glanduleuse. Am. s. or. ♄
ponctuée. Antilles. s. ch. ♄

lycopodioides.
lacustris.
DESMANTUS lacustris *willd. sp.*

à f. de lycopode. s. ch. ♄
aquatique. MEXIQUE. s. ch. ♃

MIMOSA
sensitiva *L.*
pudica *L.*
asperata *L.*

SENSITIVE
sensible. BRÉSIL. s. ch. ♄
commune. ANTILLES. ☉
rude. ANTILLES. s. ch. ♄

SCHRANKIA
uncinata *willd. sp.*
MIMOSA horridula *mich. fl.*

SCHRANKIA
hérissé. AM. S. OR. ♄

INGA
vera *willd. sp.*
MIMOSA inga *L.*
punctata *willd. sp.*
MIMOSA fagifolia *jacq. am.?*
unguis-cati *willd. sp.*
fœtida *willd. sp.*
MIMOSA fœtida *jacq. fragm.*

INGA
ailé. ANTILLES. s. ch. ♄
ponctué. ANTILLES. s. ch. ♄
ongle-de-chat. ANT. S. CH. ♄
fétide. MEXIQUE. s. ch. ♄

GLEDITSIA
triacanthos *L.*
—lævis.
monosperma *H. K.*
caroliniensis *encycl.*
sinensis *encycl.*
ferox.
caspica.

FÉVIER
à trois pointes. AM. S. ♄ (orn.)
—sans épines.
monosperme. AM. S. ♄
de Chine. ♄
à grosses épines. CHINE. ♄
de la mer Caspienne. ♄

GYMNOCLADUS
canadensis *encycl.*
GUILANDINA dioica *L.*

GYMNOCLADUS
de Canada. ♄ (orn.)

CERATONIA
siliqua *L.*

CAROUBIER
commun. F. M. ♄ (écon.)

TAMARINDUS
indica *L.*

TAMARINIER
des Indes. S. CH. ♄ (méd.)

PARKINSONIA
aculeata *L.*

PARKINSONIA
épineux. ANTILLES. S. CH. ♄

SCHOTIA
speciosa *jacq. ic.*
GUAIACUM afrum *L.*

SCHOTIA
écarlate. CAP. OR. ♄

CASSIA
thora *L.*
bicapsularis *L.*
viminea *L.*

CASSE
à fruit grêle. ANTILLES. ☉
à deux loges. ANT. S. CH. ♄
sarmenteuse. ANT. S. CH. ♄

alata L.	*ailée.* Antilles. s. ch. ♄
corymbosa *Encycl.*	*corymbifère.* brésil. or. ♄
falcata L. ?	*falciforme.* Antilles. ☉
occidentalis L.	*puante.* Ant. s. ch. ♄ (méd.)
stipulacea H. K.	*à grand. stipules.* chili. s. ch. ♄
fistula L.	*des boutiques.* inde. s. ch. ♄
latifolia.	*à larges feuill.* Ant. s. ch. ♄
atomaria *Willd. sp.* ?	
grandiflora.	*à grandes fl.* Mexiq. s. ch. ♄
corymbosa *Ortega, Dec.*	
biflora L.	*à deux fleurs.* Ant. s. ch. ♄
tomentosa L. *f.*	*cotonneuse.* chili. s. ch. ♄
brasiliana *Encycl.*	*du Brésil.* s. ch. ♄
hirsuta L.	*velue.* Antilles. s. ch. ♄
glandulosa L.	*glanduleuse.* Antilles. ☉
chamæcrista L.	*chamæcrista.* Antilles. ☉
marylandica L.	*de Maryland.* ♄
SPANDONCEA	*SPANDONCÉA*
tamarindifolia *Desf. Dec. Phil.*	*à f. de tamarin.* Afr. s. ch. ♄
cadia purpurea *Forsk. Ægypt.*	
HOFFMANSEGGIA	*HOFFMANSEGGIA*
falcaria *Cav. Ic.*	*falciforme.* pérou. ♄
larrea glauca *Ortega, Dec.*	
MORINGA	*MORINGA*
nux-ben.	*noix-de-ben.* indes. s. ch. ♄ (écon. méd.)
guilandina moringa L.	
hyperanthera moringa *Vahl, symb.*	
HÆMATOXYLUM	*CAMPÊCHE*
campechianum L.	*commun.* Ant. s. ch. ♄ (teint.)
ADENANTHERA	*ADÉNANTHÉRA*
pavonina L.	*glabre.* inde. s. ch. ♄
POINCIANA	*POINCILLADE*
pulcherrima L.	*élégante.* inde. s. ch. ♄ (orn.)
cæsalpinia pulcherrima *Swartz. obs.*	
CÆSALPINIA	*CÉSALPINIA*
sappan L.	*sappan.* inde. s. ch. ♄ (arts.)
bahamensis *Encycl.*	*de Bahama.* s. ch. ♄
vesicaria *Encycl.*	*vésiculeux.* Antilles. s. ch. ♄
paniculata.	*paniculé.* s. ch. ♄
GUILANDINA	*QUENIQUIER*
bonduc L.	*bonduc.* inde. s. ch. ♄
bonducella.	*sarmenteux.* inde. s. ch. ♄

HYMÉNÆA	*HYMÉNÉA*
courbaril L.	*courbaril.* cayenne. s. ch. ♄
BAUHINIA	*BAUHINIA*
divaricata *Encycl.* (non *Lin.*)	*divergent.* s. ch. ♄
porrecta *H. K.*	*allongé.* Antilles. s. ch. ♄
tomentosa *Encycl.*	*cotonneux.* Inde. s. ch. ♄
aculeata L.	*épineux.* Antilles. s. ch. ♄
rufescens *Encycl.*	*à petites f.* île de F. s. ch. ♄
II. Corolla papilionacea; stamina distincta; legumen uniloculare bivalve.	II. Corolle papilionacée; étamines distinctes; gousse bivalve à une loge.
CERCIS	*GAINIER*
siliquastrum L.	*de Judée.* orient. ♄ (orn.)
canadensis L.	*de Canada.* ♄ (orn.)
ANAGYRIS	*ANAGYRIS*
fœtida L.	*fétide.* F. m. or. ♄
SOPHORA	*SOPHORA*
alopecuroides L.	*queue-de-renard.* orient. ♄
flavescens *H. K.*	*jaune.* sibérie. ♆
occidentalis *Swartz.*	*d'Occident.* Antilles. s. ch. ♄
japonica L. *Mant.*	*du Japon.* ♄ (orn.)
microphylla *H. K.*	*à petites f.* N. Holl. or. ♄
tetraptera *H. K.*	*à quatre ailes.* N. zél. or. ♄
PODALYRIA	*PODALYRIA*
capensis *Willd. sp.* sophora capensis L. *Mant.*	*du Cap.* or. ♄
aurea *Willd. sp.* virgilia aurea *Encycl.* robinia subdecandra *l'Her. stirp.*	*à fl. jaune.* Abyssinie. s. ch. ♄
genistoides *Willd. sp.* sophora genistoides L.	*génistoïde.* cap. or. ♄
australis *Willd. sp.* sophora australis *S. veg.*	*de Caroline.* ♄
tinctoria *Willd. sp.* sophora tinctoria L.	*des teinturiers.* Am. s. ♆ (teint.)
alba *Willd. sp.* sophora alba *S. veg.*	*à fleurs blanches.* caroline. ♆
lupinoides *Willd. sp.* sophora lupinoides L.	*à f. de Lupin.* Kamtchatka. ♆
cuneifolia *Vent. H. cels.*	*cunéiforme.* cap. or. ♄
biflora *Encycl.*	*à deux fleurs.* cap. or. ♄
styracifolia *Bot. Magaz.*	*à f. de styrax.* cap or. ♄
VIRGILIA	*VIRGILIA*
lutea *Mich. Arbr.*	*à bois jaune.* Am. s. ♄.

Chorizema	*Chorizéma*
nana *H. K.*	*nain.* N. holl. or. ♄
Viminaria	*Viminaria*
denudata *H. K.*	*dénudé.* N. holl. or. ♄
Daviesia denudata *vent. choix de Pl.*	
Sphærolobium	*Sphérolobium*
vimineum *H. K.*	*à tige grêle.* N. holl. or. ♄
Oxylobium	*Oxylobium*
cordifolium *Andr. Rep.*	*à f. en cœur.* N. holl. or. ♄
Eutaxia	*Eutaxia*
myrtifolia *H. K.*	*à f. de myrte.* N. holl. or. ♄
Dilwinia obovata *Bill. N. holl.*	
Callistachys	*Callistachys*
lanceolata *vent. malm.*	*lancéolé.* N. holl. or. ♄
elliptica *vent. malm.*	*elliptique.* N. holl. or. ♄
III. Corolla papilionacea ; stamina 10 *mona aut diadelpha ; legumen uniloculare, bivalve.*	III. Corolle papilionacée ; 10 étamines monadelphes ou diadelphes ; gousse bivalve, à une loge.
Ulex	*Ajonc*
europæus *L.*	*marin.* F. ♄ (écon.)
minor *Rhot. cat.*	*petit.* F. ♄
nanus *Smith, Fl.*	
Platylobium	*Platylobium*
formosum *Smith, N. holl. spec.*	*élégant.* N. holl. or. ♄
scolopendrium *Andr. Rep.*	*ailé.* N. holl. or. ♄
Bossiæa scolopendrium *H. K.*	
Borbonia	*Borbonia*
crenata *L.*	*crénelé.* cap. or. ♄
Genista.	*Genet.*
1. *Spinosæ.*	1. Tiges épineuses.
anglica *L.*	*d'Angleterre.* F. ♄
germanica *L.*	*d'Allemagne.* F. ♄
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ♄
2. *Inermes.*	2. Tiges sans épines.
pilosa *L.*	*tuberculeux.* F. ♄
sagittalis *L.*	*ailé.* F. ♄
tinctoria *L.*	*des teinturiers.* F. ♄
sibirica *L. mant.*	*de Sibérie.* ♄
canariensis *L.*	*des Canaries.* or. ♄

candicans L.
juncea.
spartium junceum L.

blanchâtre. F. m. or. ♄
jonciforme. F. m. ♄ (orn. écon.)

SPARTIUM.

1. *Inermia.*

sphærocarpon L.
monospermum L.
cinereum *Willd. sp.*
genista scoparia *Vill. Delph.*
album *Desf. Atl.*
multiflorum *l'Her. Stirp.*
genista alba *Encycl.*
multicaule.
genista multicaulis *Encycl.*
purgans L.
scoparium L.
triquetrum.
genista triquetra *Willd. sp.*
nubigenum *H. K.*
fragrans *Encycl.*
patens *S. Veg.*
cytisus pendulinus L. *f.*
virgatum *H. K.*
parviflorum *Vent. H. Cels.*
radiatum L.
umbellatum *Desf. Atl.*
linifolium *Desf. Atl.*
genista linifolia L.

SPARTIUM.

1. Tige sans épines.

à fruit rond. Barbarie. or. ♄
monosperme. F. m. or. ♄
cendré. F. ♄
à fleurs blanches. Alger. or. ♄
à tiges nombr. Mahon. or. ♄
purgatif. F. ♄
à balais. F. ♄ (écon.)
triangulaire. Esp. or. ♄
odorant. Canaries. or. ♄
étalé. F. m. or. ♄
effilé. F. m. or. ♄
à petites fleurs. Orient. or. ♄
à rayons. Italie. or. ♄
ombellifère. Alger. or. ♄
à feuilles de Lin. Alger. or. ♄

2. *Spinosa.*

horridum *Vahl, Symb.*
aspalatoides *Desf. Atl.*
ferox *Desf. Atl.*
scorpius L.
spinosum L.
lanigerum *Desf. Atl.*
creticum.
aspalatus cretica L. ?

2. Tige épineuse.

hérissé. F. ♄
Aspalat. Alger. or. ♄
à grosses épines. Alger. or. ♄
scorpius. F. m. or. ♄
épineux. F. m. or. ♄
laineux. Alger. or. ♄
de Crète. or. ♄

CYTISUS

sessilifolius L.
nigricans L.
Laburnum L.
— latifolium.
cajan L.
hirsutus L.

CYTISE

à f. sessiles. Esp. ♄ (orn.)
noirci. F. ♄ (orn.)
faux Ébénier. F. ♄ (orn.)
— à larges feuilles.
cajan ou *Pois d'Angole.* Ant. s. ch. ♄
velu. F. m. ♄

anagyrius *l'her. stirp.*
austriacus *L.*
divaricatus *l'her. stirp.* }
spartium complicatum *L.* }
leucanthus *willd. ?*
proliferus *L. f.*
foliolosus *l'her. stirp.*
triflorus *l'her. stirp.*
biflorus *l'her. stirp.*
supinus *S. veg.*
argenteus *L.*
volgaricus *L. f.* }
pinnatus *Pallas, Koss.* }

anagyris. esp. or. ♄
d'Autriche. ♄

étalé. f. ♄

à fleurs blanches. hongrie. ♄
prolifère. canaries. or. ♄
feuillu. canaries. or. ♄
à fleurs ternées. f. m. or. ♄
à deux fleurs. hongrie. ♄
couché. f. ♄
argenté. f. ♄

du Volga. ♄

CROTALARIA.

1. *Foliis ternatis.*

arborescens *Encycl.* }
incanescens *L. f.* }
incana *L.*
purpurascens *Encycl.*
purpurea *Vent. Malm.*

CROTALAIRE.

1. Feuilles ternées.

en arbre. île de f. s. ch. ♄ (orn.)

blanche. Antilles. ☉
rougeâtre. île de f. ☉
pourpre. cap. or. ♄

2. *Foliis simplicibus.*

sagittalis *L.*
juncea *L.*
semperflorens *Vent. H. Cels.*
retusa *L.*
benghalensis *Encycl.*
verrucosa *L.* }
angulosa *Encycl.* }
cœrulea *Jacq. Ic.* }
styracifolia.

2. Feuilles simples.

sagittée. brésil. ☉
jonciforme. inde. ☉
toujours fleurie. inde. s. ch. ♄
émoussée. inde. s. ch. ☉
du Bengale. ☉

tuberculeuse. inde. ☉

à feuilles de styrax. s. ch. ♂

GOODIA
lotifolia *Bot. Mag.*

GOODIA
à f. de Lotier. n. holl. or. ♄

RAFNIA
retusa *Vent. Malm.* }
Templetonia retusa *H. K.* }

RAFNIA
émoussé. n. holl. or. ♄

LUPINUS
varius *L.*
angustifolius *L.*
luteus *L.*

LUPIN
bigarré. f. m. ☉ (orn.)
à feuilles étroites. f. ☉
jaune. Alger. ☉ (orn.)

ONONIS.

1. *Flores purpurei aut albi.*

antiquorum *L.*
spinosa *L.*
arvensis *S. veg.* }
hircina *Willd. sp.* }

ONONIS.

1. Fleurs rouges ou blanches.

Arrête-bœuf. f. ♃ (méd.)
épineux. f. ♆

des champs. f. ♆

altissima *Encycl.*	*élevé.* Allem. ♄
mitissima *L.*	*à fleurs serrées.* F. m. ♄
cenisia *L. Mant.*	*du mont Cénis.* ♆
alopecuroides *L.*	*queue-de-renard.* Esp. ☉
cherleri *L.*	*de Cherler.* F. m. ♄
rotundifolia *L.*	*à feuilles rondes.* Alpes. ♆
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* Alpes. ♄ (orn.)
tridentata *L.*	*à trois dents.* Esp. or. ♄
hirta.	*hérissé.* orient. or. ♆
2. *Flores lutei.*	2. Fleurs jaunes.
viscosa *L.*	*visqueux.* F. m. ☉
natrix *L.*	*Natrix.* F. ♆
parviflora *Encycl.*	*à petites fleurs.* F. ♂
minutissima *Jacq.* (non *L.*)	
columnæ *All. Ped.*	
subocculta *Vill. Delph.*	
ARACHIS	*ARACHIS*
hypogea *L.*	*pistache-de-terre.* Antilles. ☉ (écon.)
EBENUS	*EBENUS*
cretica *L.*	*de Crète.* or. ♄
ANTHYLLIS.	*ANTHYLLIS.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tiges ligneuses.
barba-jovis *L.*	*satiné.* orient. or. ♄
cytisoides *L.*	*à fleurs de cytise.* F. m. or. ♄
hermanniæ *L.*	*d'Orient.* or. ♄
erinacea *L.*	*épineux.* Esp. or. ♄
2. *Herbaceæ.*	2. Tiges herbacées.
cornicina *L.*	*cornu.* Esp. ☉
montana *L.*	*de montagne.* F. ♄
tetraphylla *L.*	*à quatre feuilles.* F. m. ☉
vulneraria *L.*	*vulnéraire.* F. ♆
— purpurascens.	— *pourpre.*
DALEA	*DALÉA*
violacea.	
petalostemum violaceum *Mich. Fl.*	*violet.* Am. s. or. ♄
candida.	
petalostemum candidum *Mich. Fl.*	*blanc.* Am. s. or. ♆
Linnæi *Mich. Fl.*	*de Linné,* Am. s. ♆
PSORALEA	*PSORALÉA*
pinnata *L.*	*à feuilles pennées.* cap. or. ♄

odoratissima *Jacq. h. sch.*	*odorant.* cap. or. ♄
verrucosa *Willd. sp.* / angustifolia *Jacq. h. sch.*	*tuberculeux.* cap. or. ♄
aphylla *L. Mant.*	*sans feuilles.* cap. or. ♄
bituminosa *L.*	*bitumineux.* f. m. or. ♄
palestina *Gouan, Ill.*	*de Palestine.* or. ♄
pubescens *Pers. syn.*	*pubescent.* or. ♄
glandulosa *L.*	*glanduleux.* pérou. or. ♄
americana *L.*	*d'Amérique.* s. ch. ♄
bracteata *L. Mant.*	*à grandes bractées.* cap. or. ♄
corylifolia *L.*	*à feuill. de Noisetier.* inde. ☉
Melilotus	*Mélilot*
cœrulea.	*bleu.* bohême. ☉ (écon.)
indica.	*des Indes.* ☉
— minor.	*—petit.*
officinalis.	*officinal.* f. ♆ (méd. écon.)
alba.	*blanc.* sibérie. ♂ (écon.)
dentata. / trifolium dentatum *Wald. et Kitt.*	*denté.* hongrie. ☉
polonica.	*de Pologne.* ☉
italica.	*d'Italie.* ☉
cretica.	*de Crète.* ☉
messanensis.	*de Messine.* ☉
sulcata *Desf. Atl.*	*sillonné.* alger. ☉
ornithopodioides. / trigonella ornithopodioides *Dec. Fl.*	*pied-d'oiseau.* f. ☉
Trifolium.	*Trèfle.*
1. *Lotoidea, Leguminibus tectis, polyspermis.*	1. Lotoïdes. Gousses polyspermes, recouvertes par le calice.
lupinaster *L.*	*à feuilles de Lupin.* sibérie. ♃
strictum *L.*	*serré.* f. ☉
angulatum *Wald. et Kitt. hung.*	*anguleux.* hongrie. ☉
vaillantii *Encycl.*	*de Vaillant.* f. ♃
michelianum *Savi, Itin.*	*de Micheli.* italie. ♆
repens *L.*	*rampant.* f. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* ♃
involucratum *Willd. sp.*	*à involucre.* ♆
2. *Lagopoidea. Calicibus villosis.*	2. Lagopodes. Calices velus.
subterraneum *L.*	*souterrain.* f. ☉
cherleri *L.*	*de Cherler.* f. m. ☉
lappaceum *L.*	*Bardane.* f. ☉
rubens *L.*	*rouge.* f. ♃ (écon.)
pratense *L.*	*des prés.* f. ♆ (écon.)
diffusum *Wald. et Kitt. Hung.*	*étalé.* hongrie. ♂

bracteatum *willd. Enum.*	*à grandes bractées.* Maroc. ⊙
alpestre L.	*à deux têtes.* Alpes. ♄
flexuosum *Jacq. Fl. Austr.* / medium *willd. sp.*	*tortueux.* Alpes. ♄
pictum *Roth. cat.*	*tacheté.* ⊙
pannonicum L. *Mant.*	*de Hongrie.* ♆
ochroleucum *S. Veg.*	*jaunâtre.* F. ♆
pallidum *Wald. et Kitt. Hung.*	*pâle.* Hongrie. ⊙
squarrosum L.	*hérissé.* F. ⊙
incarnatum L.	*incarnat.* F. ⊙
— pallidum.	—*pâle.*
angustifolium L.	*à feuilles étroites.* F. ⊙
arvense L.	*des champs.* F. ⊙
gracile *Thuil. Fl.*	*grêle.* F. ⊙
ligusticum *Savi Itin.*	*d'Italie.* ⊙
maritimum *willd. sp.*	*maritime.* Angleterre. ⊙
stellatum L.	*étoilé.* F. m. ⊙
clypeatum L.	*bouclier.* orient. ⊙
alexandrinum L.	*d'Alexandrie.* ⊙
scabrum L.	*rude.* F. ⊙
glomeratum L.	*aggloméré.* F. ⊙
parviflorum *willd. sp.*	*à petites fleurs.* Hongrie. ⊙
striatum L.	*strié.* F. ⊙
suffocatum L. *Mant.*	*nain.* F. m. ⊙
albidum *willd. sp.*	*blanc.* ⊙
3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.*	3. Vésiculeux. Calices renflés.
spumosum L.	*écumeux.* F. ⊙
tomentosum L.	*cotonneux.* F. ⊙
fragiferum L.	*Fraise.* F. ♆
resupinatum L.	*renversé.* F. ⊙
4. *Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.*	4. Lupulins. Étendard de la corolle abaissé.
montanum L.	*de montagne.* F. ♆
agrarium *willd. sp.* / aureum *Pollich. Palat.*	*agraire.* F. ⊙
spadiceum L.	*brun.* F. ⊙
procumbens *Smith, Fl.*	*tombant.* F. ⊙
filiforme *Smith, Fl.*	*filiforme.* F. ⊙
MEDICAGO.	*LUSERNE.*
1. *Leguminibus lunatis.*	1. Gousses falciformes.
arborea L.	*en arbre.* orient. or. ♄
radiata L.	*radiée.* Italie. ⊙
circinata L.	*pennée.* Italie. ⊙
sativa L.	*cultivée.* ♆ (écon.)
falcata L.	*falciforme.* F. ♆
lupulina L.	*des prés.* F. ♂

2. *Leguminibus cochleatis.*

prostrata L. *f.*
glutinosa *Marsch. cauc.*
marina L.
orbicularis L.
tornata L.
— minor.
elegans *willd. sp.*
tuberculata *willd. sp.*
aculeata *willd. sp.*
rigidula L.
intertexta L.
globulifera.
tribuloides *Encycl.*
murex *willd. sp.*
ciliaris L.
maculata *willd. sp.*
arabica L.
distans.
coronata L.
denticulata *willd. sp.*
apiculata *willd. sp.*
minima L.
laciniata L.

TRIGONELLA.

1. *Flores in pedicello communi.*

platycarpos L.
hybrida *Dec. Fl.*
corniculata L.
cancellata.
prostrata.
hamosa L.
laciniata L.

2. *Flores sessiles.*

monspeliaca L.
spinosa L.
polycerata L.
FŒNUM-GRÆCUM L.

LOTUS

edulis L.
siliquosus L.
tetragonolobus L.
conjugatus L.
peregrinus L.
oligoceratos *Encycl.*

2. Gousses en limaçon.

couchée. HONGRIE. ♄
glutineuse. CAUCASE. ♆
maritime. F. M. OR. ♄
orbiculaire. F. ☉
Barillet. F. ☉
—*petit Barillet.*
élégante. SICILE. ☉
tuberculeuse. F. M. ☉
à aiguillons. ☉
rude. ☉
entrelacée. F. M. ☉
à globules. ☉
à grosses pointes. BARBARIE. ☉
Murex. ☉
ciliée. F. M. ☉
tachée. F. ☉
distante. ☉
couronnée. ☉
denticulée. F. M. ☉
à petites pointes. ☉
velue. F. ☉
laciniée. F. ☉

TRIGONELLE.

1. Fleurs portées sur un pédicelle commun.

à gousses larges. SIBÉRIE. ☉
hybride. F. M. ♆
cornue. F. ☉
pied-d'oiseau. ☉
couchée. ORIENT. ☉
laciniée. ÉGYPTE. ☉

2. Fleurs sessiles.

de Montpellier. ☉
épineuse. CRÈTE. ☉
à gousses longues. F. M. ☉
Fenu-grec. F. M. ☉ (méd.)

LOTIER

comestible. ORIENT. ☉
à grosses gousses. F. ♆
à quatre ailes. ORIENT. ☉
conjugué. F. ☉
étranger. BARBARIE. ☉

diffusus *willd. sp.*	*étalé.* F. ⊙
hispidus *dec. cat.*	*hérissé.* F. m. ⊙
arabicus L. *mant.*	*d'Arabie.* or. ♄
coimbrensis *willd. sp.*	*de Coïmbre.* ⊙
creticus L.	*argenté.* orient. or. ♄
jacobæus L.	*à fleurs brunes.* Afr. or. ♄
ornithopodioides L.	*comprimé.* Esp. ⊙
corniculatus L.	*Pied-d'oiseau.* F. ♆
— major.	— *élevé.*
— angustifolius.	— *à feuilles étroites.*
varians *Desvaux, Journ.*	*à fleurs chang.* orient. or. ♄
hirsutus L.	*velu.* F. m. or. ♄
rectus L.	*à tige droite.* F. m. ♄
Dorycnium L.	*Dorycnium.* F. m. or. ♄
Dorycnium monspeliense *Willd. sp.*	
fruticulosus.	*sous-arbrisseau.* or. ♄

Dolichos	*Dolic*
Lablab L.	*Lablab.* Égypt. ⊙ (orn.)
— albus.	— *à fleurs blanches.*
sinensis L.	*de Chine.* ⊙
sesquipedalis L.	*à longues gousses.* Antilles. ⊙
unguiculatus L.	*onguiculé.* Antilles. ⊙
luteolus *Jacq. hort.*	*jaunâtre.* Antilles. ⊙
articulatus *Encycl.*	*articulé.* Antilles. s. ch. ♆
minimus L.	*nain.* Antilles. s. ch. ♆
lignosus L.	*ligneux.* inde. s. ch. ♄ (orn.)
urens L.	*brûlant.* Antilles. s. ch. ♄
ensiformis L.	*Pois-sabre.* Ant. s. ch. ♄
acinaciformis *Jacq. ic.*	
gladiatus *Jacq. ic.*	*à grandes gousses.* Ant. s. ch. ♄
soja L.	*Soja.* Japon. ⊙
biflorus L.	*à deux fleurs.* inde. ⊙

Phaseolus	*Haricot*
vulgaris L.	*commun.* inde. ⊙ (écon.)
coccineus *Encycl.*	*écarlate.* Antilles. ⊙
multiflorus *willd. sp.*	
lunatus L.	*arqué.* inde. ⊙ (écon.)
vexillatus L.	*à grand étendard.* Antilles. ⊙
caracalla L.	*caracolle.* inde. s. ch. ♄ (orn.)
paniculatus *mich. fl.*	*paniculé.* Am. s. ♆
radiatus *Encycl.*	*à rayons.* ceylan. ⊙
semierectus L. *mant.*	*pourpre.* Antilles. ⊙
nanus L.	*nain.* inde. ⊙
stipularis *Encycl.*	*à grandes stipules.* inde. ⊙
sphærospermus L.	*à graines rondes.* inde. ⊙

ERYTHRINA	*ERYTHRINA*
herbacea L.	*herbacé.* caroline. or. ♆
corallodendrum L.	*Arbre de corail.* ant. s. ch. ♄
abyssinica *Encycl.*	*d'Abyssinie.* s. ch. ♄
aculeatissima.	*très-épineux.* s. ch. ♄
crista-galli *Willd. sp.* / laurifolia *Jacq. obs.*	*crête-de-coq.* brésil. s. ch. ♄
CLITORIA	*CLITORIA*
ternatea L.	*de Ternate.* inde. s. ch. ♂
— alba.	*— à fleurs blanches.*
heterophylla *Encycl.*	*à feuilles var.* inde. s. ch. ♇
brasiliana L.	*du Brésil.* ☉
virginiana L.	*de Virginie.* ☉
glabella / Galactia glabella *Mich. Fl.*	*glabre.* am. s. ♆
GLYCINE	*GLYCINÉ*
monoica L.	*monoïque.* am. s. ♆
caribæa *Jacq. ic.*	*des Antilles.* s. ch. ♄
tomentosa L.	*cotonneux.* am. s. ♆
bituminosa L.	*bitumineux.* cap. or. ♆
Apios L.	*Apios.* am. s. ♆
frutescens L.	*arbrisseau.* am. s. ♄ (orn.)
rubicunda *Bot. Mag.* / Kennedia rubicunda *Vent. Malm.*	*à fl. rouges.* n. holl. or. ♄ (orn.)
bimaculata *Bot. Mag.* / Kennedia monophylla *Vent. Malm.*	*à deux taches.* n. holl. or. ♄
coccinea *Bot. Mag.* / Kennedia coccinea *Vent. Malm.*	*écarlate.* n. holl. or. ♄
ABRUS	*ABRUS*
precatorius *S. Veg.* / Glycine Abrus L.	*à chapelet.* Antilles. s. ch. ♄
AMORPHA	*AMORPHA*
fruticosa L.	*faux indigo.* am. s. ♄ (orn.)
pumila *Mich. Fl.*	*nain.* am. s. ♄
PISCIDIA	*PISCIDIA*
erythrina L.	*erythrina.* Antilles. s. ch. ♄
ROBINIA	*ROBINIA*
pseudo-acacia L.	*faux acacia.* am. s. ♄ (orn.)
inermis.	*sans épines.* ♄ (orn.)
viscosa *Vent. H. cels.*	*visqueux.* am. s. ♄ (orn.)
hispida L. *Mant.*	*Acacia rose.* am. s. ♄ (orn.)
altagana *Ener. stirp.*	*Altagana.* Daourie. ♄ (orn.)

caragana *L.* — *caragana.* sibérie. ♄ (orn.)
pygmæa *L.* — *grêle.* sibérie. ♄
frutescens *L.* — *arbrisseau.* sibérie. ♄
chamlagu *l'Her. stirp.* — *chamlagu.* chine. ♄ (orn.)
spinosa *L. Mant.* — *épineux.* sibérie. ♄
halodendron *L. f.* — *satiné.* sibérie. ♄
squamata *Vahl, symb.* — *écailleux.* Antilles. s. ch. ♄

COLUTEA — *BAGUENAUDIER*
arborescens *L.* — *en arbre.* F. m. ♄ (orn.)
alepica *Encycl.* / pocockii *Willd. sp.* — *d'Alep.* orient. ♄ (orn.)
orientalis. *Encycl.* / cruenta *H. K.* — *d'Orient.* ♄ (orn.)
media *Willd. Enum.* — *hybride.* ♄
frutescens *L.* — *d'Ethiopie.* cap. or. ♂ (orn.)

LESSERTIA — *LESSERTIA*
perennans *Dec. Astr.* / colutea perennans *S. Veg.* — *vivace.* sibérie. ♆
annua *Dec. Astr.* / colutea herbacea *L.* — *annuel.* cap. ☉

PHACA — *PHACA*
bœtica *L.* — *de Portugal.* or. ♆
astragalina *Dec. Astr.* / Astragalus alpinus *L.* — *faux Astragale.* F. ♆
alpina *L.* — *des Alpes.* ♆

OXYTROPIS. — *OXYTROPIS*
campestris *Dec. Astr.* / Astragalus campestris *L.* — *des champs.* F. ♆
pilosa *Dec. Astr.* / Astragalus pilosus *L.* — *velu.* Alpes. ♆
deflexa *Dec. Astr.* / Astragalus deflexus *Pallas, Astr.* / hians *Jacq. Ic.* / parviflorus *Encycl.* — *à fruit pendant.* sibérie. ♆

ASTRAGALUS. — *ASTRAGALE.*

1. *Stipulis caulinis ; floribus rubris.* — 1. Stipules adhérentes à la tige ; fleurs rouges.

austriacus *L.* — *d'Autriche.* F. m. ♄
annularis *Forsk. Ægypt.* / maculatus *Encycl.* / subulatus *Desf. Atl.* — *annulaire.* Afr. s. ☉
stella *S. Veg.* — *étoilé.* F. m. ☉
sesameus *L.* — *à fleurs sessiles.* F. m. ☉

vesicarius L.	*vésiculeux.* Alpes. ♆
pentaglottis L. *Mant.*	*pentaglotte.* Barbarie. or. ♄
purpurens *Encycl.*	*pourpre.* F. m. ♄
hypoglottis L. *Mant.*	*hypoglotte.* F. ☉
Glaux L.	*Glaux.* Esp. ☉
onobrychis L.	*onobrychis.* F. ♄
— major.	— *de Sibérie.*
hispidulus *Dec. Astr.*	*hérissé.* égypte.
sulcatus L.	*sillonné.* sibérie. ♆

2. *Stipulis caulinis ; floribus ochroleucis.*

2. Stipules adhérentes à la tige ; fleurs d'un blanc jaune.

bœticus L.	*de Portugal.* ☉
depressus L.	*déprimé.* F. ♄
epiglottis L.	*épiglotte.* F. ☉
contortuplicatus L.	*recroquevillé.* sibérie. ☉
trimestris L.	*hâtif.* égypte. ☉
hamosus L.	*en hameçon.* F. m. ☉
reptans *Willd. H. Ber.*	*rampant.* Mexique. or. ♄
glyciphyllos L.	*à feuilles de réglisse.* F. ♄
cicer L.	*à gousse ronde.* F. ♄
galegiformis L.	*galéga.* sibérie. ♄
asper *Jacq. Ic.* / chloranthus *Pallas Astr.*	*rude.* sibérie. ♄
canadensis L.	*de Canada.* ♄
uliginosus L.	*des marais.* sibérie. ♆
odoratus *Encycl.*	*odorant.* orient. ♆
falcatus *Encycl.*	*falciforme.* Russie. ♄
christianus L.	*de Judée.* or. ♆
tomentosus *Encycl.*	*cotonneux.* Égypte. or. ♆
alopecuroides L.	*queue-de-renard.* sibérie. ♄
narbonensis *Gouan, Ill.*	*de Narbonne.* F. m. ♆

3. *Stipulis petiolo adhærentibus ; inermes.*

3. Stipules adhérentes au pétiole ; feuilles non épineuses.

caprinus L.	*odorant.* Barbarie. or. ♆
exscapus L.	*sans tige.* suisse. ♆
incanus L.	*blanc.* F. m. ♆
monspesulanus L.	*de Montpellier.* ♆

4. *Spinescentes.*

4. Feuilles terminées en épine.

longifolius *Encycl.*	*à long. feuilles.* orient. or. ♄
massiliensis *Encycl.* / Tragacantha L.	*de Marseille.* F. m. ♄
sempervirens *Encycl.* / aristatus *l'Her. Stirp.* / Tragacantha *Vill. Delph.*	*toujours vert.* F. ♄

BISERRULA	*BISERRULA*
pelecinus *L.*	*en rateau.* barbarie. ☉
GLYCYRRHIZA	*RÉGLISSE*
echinata *L.*	*hérissée.* tartarie. ♆
glabra *L.*	*officinale.* F. ♄ (méd.)
fœtida *Desf. Atl.*	*fétide.* barbarie. or. ♄
GALEGA	*GALÉGA*
officinalis *L.*	*officinal.* F. ♆
orientalis *Encycl.*	*d'Orient.* ♆
rosea *Encycl.*	*rose.* cap. or. ♄
pulchella *Scop. insub.* / stricta *H. K.*	*élégant.* cap. or. ♄
cinerea *L.*	*cendré.* Antilles. ☉
coronillæfolia.	*à feuill. de coronille.* s. ch. ♄
caribæa *Jacq. Am.*	*des Antilles.* s. ch. ♄
pubescens *Encycl.*	*pubescent.* Antilles. s. ch. ♄
longifolia *Jacq. ic.* / clitoria micrantha *Scop. ins.*	*à long. feuilles.* Ant. s. ch. ♄
INDIGOFERA	*INDIGOTIER*
viscosa *Encycl.*	*visqueux.* Antilles. s. ch. ♆
tinctoria *L.*	*des teintur.* Inde. s. ch. ♄ (écon.)
Anil *L. Mant.*	*Anil.* Inde. s. ch. ♂ (écon.)
argentea *l'Her. stirp.* / glauca *Encycl.*	*argenté.* orient. or. ♄ (écon.)
psoraloides *Willd. sp.*	*faux psoralea.* cap. or. ♄
cytisoides *S. Veg.*	*faux cytise.* cap. or. ♄
macrostachya *Vent. Malm.*	*à grands épis.* Chine. or. ♄
australis *Willd. sp.*	*austral.* N. Holl. or. ♄
enneaphylla *L. Mant.*	*à neuf feuilles.* Inde. ☉
LATHYRUS.	*GESSE.*
1. *Pedunculis unifloris.*	1. Pédoncules à une fleur.
Aphaca *L.*	*Aphaca.* F. ☉
nissolia *L.*	*de Nissole.* F. ☉
axillaris *Encycl.* / sphæricus *Retz. obs.*	*axillaire.* F. m. ☉
cicera *L.*	*sillonnée.* Esp. ☉
sativus *L.*	*cultivée.* F. ☉ (écon.)
setifolius *L.*	*à feuilles étroites.* F. m. ☉
tumidus *Encycl.*	*renflée.* ♆
2. *Pedunculis bifloris.*	2. Pédoncules à deux fleurs.
clymenum *L.*	*d'Espagne.* ☉
articulatus *L.*	*articulée.* F. m. ☉
odoratus *L.*	*odorante.* ceylan. ☉ (orn.)
tingitanus *L.*	*de Tanger.* ☉
annuus *L.*	*jaune.* F. m. ☉

3. *Pedunculis multifloris.*

hirsutus L.
tuberosus L.
pratensis.
sylvestris L.
latifolius L.
palustris L.

PISUM

sativum L.
— ecorticatum.
— umbellatum.
arvense L.
maritimum L.
ochrus L.

OROBUS

lathyroides L.
vernus L.
luteus L.
tuberosus L.
varius *Bot. Magaz.*
albus L. *f.*
sylvaticus L.
niger L.
tomentosus.
Lathyrus tomentosus *cav. ic.*
vicia fruticosa *willd. sp.*

VICIA.

1. *Pedunculis elongatis.*

pisiformis L.
dumetorum L.
sylvatica L.
cracca L.
onobrychioides *All. ped.*
atropurpurea *Desf. Atl.*
benghalensis L.
monanthos.
Ervum monanthos L.
Ervilia *willd. sp.*
Ervum Ervilia L.

2. *Floribus axillaribus, subsessilibus.*

sepium L.
sativa L.
— angustifolia.
peregrina L.

3. Pédoncules à plusieurs fleurs.

velue. F. ⊙
tubéreuse. F. ♆ (écon.)
des prés. F. ♃
sauvage. F. ♃
à larges feuilles. F. m. ♆
des marais. F. ♃

POIS

cultivé. F. ⊙ (écon.)
— sans parchemin.
— à bouquets.
des champs. F. ⊙
maritime. F. ♆
ailé. F. ⊙

OROBE

à feuilles de cesse. sibérie. ♃
printanier. F. ♆
jaune. Alpes. ♆
tubéreux. F. ♆
bigarré. Italie. ♃
blanc. Autriche. ♆
des bois. Alpes. ♃
noir. F. ♃

cotonneux. Pérou. s. ch. ♄

VESCE.

1. Pédoncules allongés.

pisiforme. F. ♆
des buissons. F. ♆
des bois. F. ♆
à fleurs nombreuses. F. ♆
à feuill. de sainfoin. Alpes. ⊙
brun-pourpre. Barbarie. ⊙
du Bengale. ⊙

à une fleur. F. ⊙

ers. F. ⊙

2. Fleurs axillaires, presque sessiles.

des haies. F. ♃
cultivée. F. ⊙ (écon.)
— à feuilles étroites.
étrangère. F. ⊙

torulosa. — *bosselée.* ⊙
lathyroides L. — *printanière.* F. ⊙
ERVUM soloniense L. (ex *Willd.*) — *printanière.* F. ⊙
lutea L. — *jaune.* F. ⊙
hybrida L. — *hybride.* F. ⊙
pannonica *Jacq. Austr.* — *de Hongrie.* ⊙
narbonensis L. — *de Narbonne.* ⊙

FABA — *FÉVE*
major. — *de marais.* PERSE. ⊙ (écon.)
— minor. — *féverole.*
— viridis. — *verte.*

ERVUM — *LENTILLE*
hirsutum L. — *velue.* F. ⊙
tetraspermum L. — *à quatre graines.* F. ⊙
LENS L. — *cultivée.* F. M. ⊙ (écon.)
cicer LENS *Willd. sp.* — *cultivée.* F. M. ⊙ (écon.)
— minor. — *petite.*

CICER — *CICER*
arietinum L. — *pois-chiche.* orient. ⊙

IV. Legumen articulatum ; articulis monospermis.

IV. Gousse articulée ; articulations monospermes.

SCORPIURUS — *CHENILLETTE*
vermiculata L. — *écailleuse.* F. M. ⊙
muricata L. — *hérissée.* F. M. ⊙
sulcata L. — *sillonnée.* F. M. ⊙

ORNITHOPUS — *PIED-D'OISEAU*
perpusillus L. — *petit.* F. ⊙
compressus L. — *comprimé.* F. M. ⊙
scorpioides L. — *queue-de-scorpion.* F. M. ⊙

HIPPOCREPIS — *HIPPOCRÉPIS*
unisiliquosa L. — *à gousses solitaires.* F. M. ⊙
multisiliquosa L. — *à plusieurs gousses.* F. M. ⊙
comosa L. — *des champs.* F. ♆
balearica *Jacq. ic.* — *de Mahon.* OR. ♄

CORONILLA — *CORONILLE*
EMERUS L. — *Émérus.* ALPES. ♄ (orn.)
valentina L. — *à grandes stipules.* F. M. OR. ♄
stipularis *Encycl.* — *à grandes stipules.* F. M. OR. ♄
glauca L. — *glauque.* F. M. OR. ♄
juncea L. — *jonciforme.* F. M. OR. ♄
minima L. — *petite.* F. ♃
varia L. — *bigarrée.* F. ♃ (orn.)
globosa *Encycl.* — *globuleuse.* ORIENT. OR. ♃
cretica L. — *de Crète.* ⊙
securidaca L. — *à gousses plates.* F. ⊙

HEDYSARUM.	*SAINFOIN.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples;
maculatum *L.*	*panaché.* inde. ☉
gangeticum *L.*	*du Gange.* inde. ☉
vaginale *L.*	*à gaînes.* inde. ☉
vespertilionis *L. f.*	*Aile-d'oiseau.* cochinchine. s. ch. ♂
triquetrum *L.*	*triangulaire.* inde. s. ch. ♄
2. *Foliis ternatis.*	2. Feuilles ternées.
junceum *L.*	*effilé.* sibérie. ♆
coriaceum.	*à feuilles coriaces.* or. ♄
canadense *L.*	*de Canada.* ♆
canescens *L.*?	*blanchâtre.* Am. s. or. ♇
marilandicum *L.*	*de Mariland.* ♇
diffusum.	*étalé.* s. ch. ♄
gyrans *L. f.*	*oscillant.* bengale. s. ch. ♂
3. *Foliis pinnatis.*	3. Feuilles pennées.
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♇
obscurum *L.*	*à fruit lisse.* Alpes. ♆
coronarium *L.*	*d'Espagne.* ♂ (orn. écon.)
flexuosum *L.*	*tortueux.* orient. ☉
fruticosum *L. f.*	*arbrisseau.* sibérie. ♄
muricatum *Jacq. ic.*	*hérissé.* Afr. ♆
lanuginosum.	*laineux.* orient. ♆
capitatum *Desf. Atl.*	*à fleurs en tête.* Alger. ☉
onobrychis *L.*	*cultivé.* F. (écon.)
saxatile *L.*	*des rochers.* Alpes. ♇
caput-galli *L.*	*tête-de-coq.* F. m. ☉
crista-galli *s. veg.*	*crête-de-coq.* orient. ☉
ÆSCHINOMENE	*ESCHINOMÉNÉ*
grandiflora *L.* coronilla grandiflora *willd. sp.*	*à grandes fleurs.* inde. s. ch. ♄
sesban *L.* coronilla sesban *willd. sp.*	*sesban.* Égypte. s. ch. ♂
picta *cav. ic.* coronilla picta *willd. sp.*	*tacheté.* N. esp. s. ch. ♂
fusca.	*à fleurs brunes.* s. ch. ♄
V. Corolla papilionacea; legumen capsulare, submonospermum sæpè, non dehiscens.	V. Corolle papilionacée; gousse capsulaire à une loge, ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.
DALBERGIA.	*DALBERGIA*
latisiliqua *pers. syn.*	*à gousse large.* Ant. s. ch. ♄
GEOFFRÆA	*GÉOFFRÉA*
inermis *swartz. prodr.*	*sans épines.* Antilles. s. ch. ♄

Pterocarpus
ecastaphyllum *willd. sp.*

Securidaca
scandens *L.*
volubilis *willd. sp.*

ORDO XII.

TEREBINTHACEÆ.

Germen simplex; fructus unilocularis, monospermus.

Anacardium
occidentale *L.*

Mangifera
indica *L.*

Rhus.

1. *Foliis pinnatis.*

coriaria *L.*
typhinum *L.*
glabrum *H. K.*
vernix *L.*
copallinum *L.*
semialatum *Syst. Veg.*
javanicum *L.*

2. *Foliis ternatis.*

toxicodendrum *L.*
aromaticum *H. K.*
tomentosum *L.*
dentatum *Thunb. prodr.*
cuneifolium *L. f.*
glaucum.
Thezera *Desf. Atl.*
Rhamnus pentaphyllus *L.*
oxyacanthoides.
angustifolium *L.*
viminale *H. K.*
heterophyllum.
levigatum *L.*
lucidum *L.*
villosum *L. f.*
undulatum *Jacq. H. sch.*
nervosum.

Ptérocarpus
à feuilles simples. Ant. s. ch. ♄

Sécuridaca
sarmenteux. Antilles. s. ch. ♄

ORDRE XII.

TÉRÉBINTHACÉES.

I. Un seul ovaire; fruit à une seule loge monosperme.

Anacarde
d'Occident ou *Noix d'Acajou.* Antilles. s. ch. ♄ (écon.)

Manguier
cultivé. Inde. s. ch. ♄ (écon.)

Sumac.

1. Feuilles pennées.

des corroyeurs. F. m. ♄ (écon.)
de Virginie. ♄ (orn.)
glabre. Am. s. ♄ (orn.)
vernis. Am. s. ♄
ailé. Am. s. ♄
semi-ailé. Inde. s. ch. ♄
de Java. s. ch. ♄

2. Feuilles ternées.

vénéneux. Am. s. ♄
aromatique. Am. s. ♄
cotonneux. cap. or. ♄
denté. cap. or. ♄
cunéiforme. cap. or. ♄
glauque. cap. or. ♄
Thézéra. Alger. or. ♄
à f. d'Aubépine. orient. or. ♄
à feuilles étroites. cap. or. ♄
flexible. cap. or. ♄
à feuilles variables. or. ♄
lisse. cap. or. ♄
luisant. cap. or. ♄
velu. cap. or. ♄
ondulé. cap. or. ♄
veiné. cap. or. ♄

3. *Foliis simplicibus.*

cotinus L.

CNEORUM
tricoccum L.

COMOCLADIA
ilicifolia *swartz. prodr.*

AMYRIS
polygama *cav. ic.*
maritima *jacq. am.*

SCHINUS
molle L.

PISTACIA
terebinthus L.
trifolia L.
vera L.
chia.
atlantica *desf. atl.*
lentiscus L.

BURSERA
gummifera L.

SPONDIAS
monbin *s. veg.*
purpurea L.
cytherea *encycl.*
dulcis *willd. sp.*
myrobalanus *s. veg.*
lutea L.

II. Germen multiplex; fructus multicapsularis.

AYLANTUS
glandulosa *desf. acad.*

BRUCEA
ferruginea *l'her. stirp.*

FAGARA
pterota L.
microphylla.

ZANTHOXYLUM
fraxineum *willd. sp.*
cauliflorum *mich. fl.*
clava-herculis L.

3. Feuilles simples.

fustet. F. ♄ (orn. teint.)

CNÉORUM
à trois coques. F. m. ♄

COMOCLADIA
à f. de houx. Ant. s. ch. ♄

AMYRIS
polygame. chili. s. ch. ♄
maritime. Antilles. s. ch. ♄

SCHINUS
mollé. Pérou. or. ♄ (orn.)

PISTACHIER
térébinthe. F. m. ♄
cultivé. orient. or. ♄ (écon. méd.)
de Chio. or. ♄
de l'Atlas. or. ♄ (écon.)
lentisque. orient. or. ♄ (écon.)

BURSÉRA
gommifère. Antilles. s. ch. ♄

SPONDIAS
monbin. Inde. s. ch. ♄
Arbre de Cythère. Île de Fr. s. ch. ♄
jaune. Antilles. s. ch. ♄

II. Plusieurs ovaires; autant de capsules.

AYLANTE
glanduleux. Japon. ♄ (orn.)

BRUCÉA
ferrugineux. Afr. s. ch. ♄

FAGARA
à f. de jasmin. Ant. s. ch. ♄
à petites feuilles. Ant. s. ch. ♄

ZANTHOXYLUM
à feuilles de frêne. Am. s. ♄
à gros aiguillons. Ant. s. ch. ♄

PTELEA
trifoliata L.

DODONÆA
viscosa L. f.
ptelea viscosa L.
angustifolia L. f.
triquetra *Willd. sp.*

AVERRHOA
bilimbi L.

JUGLANS
regia L.
— serotina.
fraxinifolia *Encycl.*
alba L.
olivæformis *H. K.*
cylindrica *Encycl.*
cinerea L.
nigra L.

PTÉLÉA
à trois feuill. Am. s. ♄ (orn.)

DODONÉA
visqueux. inde. s. ch. ♄
à feuill. étroites. inde. s. ch. ♄
triangulaire. N. holl. or. ♄

AVERRHOA
bilimbi. inde. s. ch. ♄

NOYER
cultivé. Asie. ♄ (écon.)
— *tardif.*
à feuilles de Frêne. Asie. ♄
blanc. Am. s. ♄
pacanier. Am. s. ♄ (écon.)
cendré. Am. s. ♄
noir. Am. s. (écon.)

ORDO XIII.

RHAMNOIDEÆ.

I. Stamina petalis alterna; fructus capsularis.

STAPHYLÆA
pinnata L.
trifoliata L.

EVONYMUS
europæus L.
latifolius L.
americanus L.
atropurpureus *Jacq. Hort.*
verrucosus *Jacq. Austr.*

CELASTRUS
scandens L.
cassinoides *l'Her. sert.*
octogonus *l'Hert. sert.*
lucidus *l'Her. sert.*
cassine concava *Encycl.*
buxifolius L.
pyracantha L.
senegalensis *Encycl.*
phyllacanthus *l'Her. sert.*
multiflorus *Encycl.*

ORDRE XIII.

RHAMNOÏDES.

I. Étamines alternes avec les pétales ; une capsule.

STAPHYLÉA
à feuilles pennées. F. ♄ (orn.)
à f. ternées. Am. s. ♄ (orn.)

FUSAIN
d'Europe. F. ♄ (écon. orn.)
à larges feuilles. F. ♄ (orn.)
d'Amérique. Am. s. ♄
noir-pourpre. Am. s. ♄
galeux. Autriche. ♄

CÉLASTRUS
grimpant. Am. s. ♄
à f. de cassiné. canar. or. ♄
octogône. pérou. s. ch. ♄
luisant. cap. or. ♄
à feuilles de buis. cap. or. ♄
à épines rouges. cap. or. ♄
du Sénégal. s. ch. ♄
à fleurs nombr. cap. or. ♄

II. Stamina petalis alterna ; drupa aut bacca.

RUBENTIA
mauritiana.

CASSINE
capensis L. *Mant.*
maurocenia L.
xylocarpa *Vent. choix de pl.*

ILEX
AQUIFOLIUM L.
— crassifolium.
— ferox.
— serratum.
— variegatum.
balearica.
maderiensis *Encycl.*
PERADO *H. K.*
cassine L.
canadensis *Mich. Fl.*
— angustifolia.
æstivalis *Encycl.*
prinoides *H. K.*
vomitoria *H. K.*
cassine peragua L.

PRINOS
verticillatus L.
glaber L.
lucidus *H. K.*

II. Étamines alternes avec les pétales ; un drupe ou une baie.

RUBENTIA
bois d'olive. île de F. s. ch. ♄

CASSINÉ
du Cap. or. ♄
à f. convexes. cap. or. ♄
à fruit osseux. ant. s. ch. ♄

HOUX
commun. F. ♄ (orn. écon.)
— à feuilles épaisses.
— hérisson.
— en scie.
— panaché.
de Mahon. ♄
de Madère. or. ♄
à f. de Laurier. carol. or. ♄
de Canada. ♄
— à feuilles étroites.
d'été. caroline. or. ♄
purgatif, Apalachine. Floride. or. ♄

PRINOS
verticillé. Am. s. ♄
glabre. Am. s. ♄
luisant. ♄

III. Stamina petalis opposita ; fructus drupaceus.

RHAMNUS.

1. *Spinosi.*

catharticus L.
infectorius *Willd. sp.*
thecezans L. *Mant.*
lycioides L.
oleoides L.
saxatilis *Jacq. Austr.*
erythroxylum *Pallas, Ross.*

2. *Inermes.*

frangula L.
colubrinus Z.

III. Étamines opposées aux pétales ; un drupe.

NERPRUN.

1. Tiges épineuses.

purgatif. F. ♄ (arts, méd.)
graine d'Avignon. F. m. ♄ (teint.)
de Chine. or. ♄
à f. linéaires. F. m. or. ♄
à feuill. d'olivier. Esp. or. ♄
des rochers. Alpes. ♄
à longues feuilles. Sibérie. ♄

2. Tiges sans épines.

BOURGÈNE. F. ♄ (arts.)
ferrugineux. Antilles, s. ch. ♄

hybridus *l'Her. sert.*	*hybride.* ♄
burgundiacus.	
alpinus *L.*	*des Alpes.* F. ♄
alnifolius *l'Her. sert.*	*à feuilles d'Aune.* Am. S. ♄
pumilus *Jacq. ic.*	*nain.* Alpes. ♄
glandulosus *H. K.*	*glanduleux.* canaries. or. ♄
ellipticus *H. K.*	*elliptique.* Antilles. S. ch. ♄
ceanothus reclinatus *l'Her. sert.*	
Alaternus *L.*	*Alaterne.* F. m. ♄ (orn.)
— angustifolius.	— *à feuilles étroites.*
— hispanicus.	— *d'Espagne.*
— rotundifolius.	— *à feuilles rondes.*
— variegatus.	— *panaché.*
ZIZYPHUS	*JUJUBIER*
sinensis *Encycl.*	*de Chine.* or. ♄
inguanea *Encycl.*	*des Inguanes* ou *croc-de-chien.* Antilles. S. ch. ♄
Lotus *Desf. Atl.*	*des Lotophages.* Tunis. or. ♄
sativa.	*cultivé.* orient. ♄ (écon. méd.)
vulgaris *Encycl.*	
spina-christi.	*Napéca.* égypte. S. ch. ♄ (écon.)
volubilis *L. f.*	*sarmenteux.* Am. S. ♄
PALIURUS	*PALIURUS*
aculeatus.	*épineux.* F. m. ♄
PITTOSPORUM	*PITTOSPORUM*
undulatum *Vent. H. Cels.*	*ondulé.* N. Holl. or. ♄
coriaceum *Andr. Rep.*	*coriace.* Madère. or. ♄
revolutum *H. K.*	*recourbé.* N. Holl. or. ♄
Tobira *H. K.*	*Tobira.* chine. or. ♄
Evonymus Tobira *Willd. sp.*	
sinense.	*de Chine.* or. ♄
ELÆODENDRUM	*ELÉODENDRUM*
orientale *Jacq. ic.*	*d'Orient.* madagascar. S. ch. ♄
Rubentia longifolia.	
australe *Vent. Malm.*	*austral.* N. Holl. or. ♄
Argan *Retz. obs.*	*Argan.* Maroc. or. ♄ (écon.)
IV. Stamina petalis opposita; fructus tricoccus.	IV. Étamines opposées aux pétales; fruit à trois coques.
POMADERRIS	*POMADERRIS*
apetala *Bill. N. Holl.*	*apétale.* N. Holl. or. ♄
COLLETIA	*COLLÉTIA*
Ephedra *Vent. ch. de Pl.*	*sans feuilles.* Pérou. or. ♄

CEANOTHUS
africanus L.
americanus L.
azureus.
discolor *vent. malm.*
macrophyllus.

PHYLICA
ericoides L.

axillaris *lamk, ill.*
linearis.
plumosa L.
pubescens *H. K.*
squarrosa.
myrtifolia *encycl.*
paniculata *willd. sp.*
cordata L.
thymifolia *vent. malm.*

Genera Rhmnoideis affinia.

BRUNIA
lanuginosa L.
capitata.

LASIOPETALUM
ferrugineum *Andr. rep.*

GOUANIA
integrifolia *encycl.*

AUKUBA
japonica *Thunb. jap.*

CÉANOTHUS
d'Afrique. cap. or. ♄
d'Amérique. AM. S. ♄
azuré. ♄
de deux couleurs. N. HOLL. or. ♄
à larges feuilles. ♄

PHYLICA
bruyère du Cap. cap. or. ♄ (orn.)
axillaire. cap. or. ♄
à feuilles linéaires. cap. or. ♄
plumeux. cap. or. ♄
pubescent. cap. or. ♄
à feuilles roides. cap. or. ♄
à feuilles de myrte. cap. or. ♄
à feuilles en cœur. cap. or. ♄
à f. de Thym. N. HOLL. or. ♄

Genres qui ont de l'affinité avec les Nerpruns.

BRUNIA
lanugineux. cap. or. ♄
à fleurs en tête. cap. or. ♄

LASIOPÉTALUM
ferrugineux. BOT. BAY. or. ♄

GOUANIA
à feuilles entières. S. CH. ♄

AUKUBA
du Japon. ♄

CLASSIS XV.

DICOTYLEDONES

APETALÆ.

(Stamina idiogyna.)

ORDO I.

ÆUPHORBIACEÆ.

I. Styli plures definiti, sæpiùs 3.

MERCURIALIS
perennis L.

CLASSE XV.

DICOTYLÉDONS

APÉTALES.

(Fleurs unisexuelles.)

ORDRE I.

EUPHORBIACÉES.

I. Plusieurs styles définis, souvent trois.

MERCURIALE
vivace. F. ♃

annua L. — *annuelle.* F. ☉ (méd.)
tomentosa L. — *cotonneuse.* F. m. ♄
elliptica *Encycl.* — *elliptique.* Portugal. or. ♄

EUPHORBIA. — *EUPHORBE.*

1. *Herbaceæ; umbella bifida aut nulla.* — 1. Tiges herbacées; ombelle bifide ou nulle.

hypericifolia L. — *à f. d'Hypéricum.* Inde. ☉
maculata *Jacq. Hort.* — *tacheté.* Am. s. ☉
picta *Jacq. Ic.* — *panaché.* Am. m. s. ch. ♆
pilulifera L. } capitata *Encycl.* } — *à globules.* Inde. ☉
thymifolia L. — *à feuilles de Thym.* Inde. ☉
canescens L. — *blanchâtre.* Esp. ☉
chamæsyce L. — *chamésycé.* F. m. ☉
peplis L. — *péplis.* F. m. ☉
prunifolia *Jacq. H. Sch.* — *à feuilles de Prunier.* ☉

2. *Herbaceæ; umbella trifida.* — 2. Tiges herbacées; ombelle à trois rayons.

micrantha *Willd. Sp.* — *à petites fleurs.* Perse. ☉
peplus L. — *péplus.* F. ☉
falcata L. — *falciforme.* F. ☉
exigua L. — *menu.* F. ☉

3. *Herbaceæ; umbella quadrifida.* — 3. Tiges herbacées; ombelle à quatre rayons.

Lathyris L. — *Épurge.* F. ♂ (méd.)

4. *Herbaceæ; umbella quinquefida.* — 4. Tiges herbacées; ombelle à cinq rayons.

purpurata *Thuil. Fl.* — *purpurin.* F. ☉
flavicoma *Dec. Cat.* — *jaune d'or.* F. ♄
alepica L. — *d'Alep.* Syrie. or. ♆
segetalis L. — *des moissons.* F. ☉
Helioscopia L. — *Réveille-matin.* F. ☉
serrata L. — *en scie.* F. ♄
verrucosa L. — *tuberculeux.* F. ♆
platiphylla L. — *à feuilles larges.* F. ☉
litterata *Jacq. Ic.* — *bariolé.* ☉
buplevroides *Desf. Atl.* — *à f. de Buplèvre.* Alger. or. ♄
orientalis L. — *d'Orient.* ♄
hyberna L. — *à feuilles de Lauréole.* F. ♆
sylvatica L. — *des bois.* F. ♄

5. *Herbaceæ; umbella multifida.* — 5. Tiges herbacées; ombelle à plus de cinq rayons.

Esula L. — *ésule.* F. ♄
virgata *Wald. et Kitt. Hung.* — *effilé.* Hongrie. ♄
illyrica *Encycl.* — *de Dalmatie.* ♆
linariæfolia *Encycl.* — *à feuilles de Linaire.* F. ♄

pinifolia *Encycl.*	*à feuilles de Pin.* F. ♄.
cyparissias *L.*	*petit cyprès.* F. ♆
palustris *L.*	*des marais.* F. ♆
salicifolia *Dec. Itin.*	*à feuilles de saule.* F. ♆
myrsinites *L.*	*Myrsinitès.* F. m. ♆
amygdaloides *Encycl.* / nicensis *Jacq. Ic.*	*à feuilles d'Amandier.* F. ♄
6. *Caule suffruticoso aut fruticoso.*	6. Tige ligneuse ou presque ligneuse.
characias *L.*	*à fleurs brunes.* F. m. ♄
paralias *L.*	*maritime.* F. ♄
pithyusa *L.*	*à feuilles de Genévrier.* F. ♄
spinosa *L.*	*piquant.* F. m. or. ♄
mauritanica *L.*	*de Mauritanie.* or. ♄
virgata.	*effilé.* Afr. or. ♄
dendroides *L.*	*en arbre.* Barbarie. ♄
atropurpurea *Dec. Cat.*	*noir-pourpre.* canaries. or. ♄
longifolia *Encycl.* / mellifera *H. K.*	*mellifère.* canaries. or. ♄
linearis *Retz. obs. et Encycl. suppl.*	*linéaire.* Antilles. s. ch. ♄
cotinifolia *L.*	*à f. de Fustet.* Ant. s. ch. ♄
verticillata.	*verticillé.* Antilles. s. ch. ♄
heterophylla *L.*	*à feuilles var.* Ant. s. ch. ♄
7. *Carnosæ inermes.*	7. Tiges charnues, sans épines.
tithymaloides *L.* / myrtifolia *Encycl.*	*à feuilles ov.* Ant. s. ch. ♄
lophogona *Encycl.*	*à crêtes.* Madagascar. s. ch. ♄
caput-medusæ *L.*	*tête-de-Méduse.* cap. s. ch. ♄
tridentata *Encycl.* / anacantha *H. K.*	*à trois dents.* cap. s. ch. ♄
8. *Carnosæ spinosæ.*	8. Tiges charnues, épineuses.
uncinata *Dec. Pl. Gr.*	*à crochets.* s. ch. ♄
canariensis *L.*	*des Canaries.* s. ch. ♄
histrix *Jacq. H. sch.* / loricata *Encycl.*	*hérissé.* cap. s. ch. ♄
neriifolia *L.*	*à f. de Nérium.* Inde. s. ch. ♄
officinarum *L.*	*des boutiques.* cap. s. ch. ♄
mamillaris *L.*	*mamillaire.* cap. or. ♄
polygona.	*polygône.* cap. or. ♄
PHYLLANTHUS.	PHYLLANTHUS.
1. *Fruticosæ.*	1. Tiges ligneuses.
grandifolia *L.*	*à grandes feuill.* Ant. s. ch. ♄
brasiliensis *Encycl.*	*du Brésil* ou *Bois enivrant.* s. ch. ♄
reticulata *Encycl.*	*à réseau.* île de F. s. ch. ♄

2. *Herbaceæ.*

niruri L.
caroliniensis *Mich. Fl.*

KIRGANELIA
phyllanthoides.
virginea *Encycl. suppl.*
phyllanthus kirganelia *Willd. sp.*

XYLOPHYLLA
falcata *Swartz, prodr.*
angustifolia *Swartz, prodr.*
latifolia *Swartz. prodr.*
ramiflora *H. K.*
obovata *Willd. Enum.*
phyllanthus lucidus.

KIGGELLARIA
africana L.

CLUTIA
pulchella L.
alaternoides L.
polygonoides L.
daphnoides *Willd. sp.*

ANDRACHNE
telephioides L.

AGYNEIA
impubes L. *Mant.*

BUXUS
sempervirens L.
— suffruticosa.
— angustifolia.
balearica *Encycl.*

SECURINEGA
nitida *Pers. Syn.*

ADELIA
acitodon L. ?
acuminata *Mich. Fl.*
ovata.

RICINUS
communis L.
— rutilans.
viridis *Willd. sp.*
inermis *Jacq. Ic.*

2. Tiges herbacées,

Niruri. inde. ☉
de Caroline.

KIRGANÉLIA
à f. de phyllanthus. île de fr. s. ch. ♄

XYLOPHYLLA
falciforme. Antilles. s. ch. ♄
à f. étroites. Antilles. s. ch. ♄
à f. larges. Antilles. s. ch. ♄
à fleurs axillaires. sibérie. ♄
ovale renversé. s. ch. ♄

KIGGELLARIA
d'Afrique. cap. or. ♄

CLUTIA
élégant. cap. or. ♄
à feuill. d'alaterne. cap. or. ♄
à f. de polygonum. cap. or. ♄
daphnoïde. cap. or. ♄

ANDRACHNÉ
couché. orient. ♂

AGYNÉIA
glabre. chine. ☉

BUIS
toujours vert. F. ♄ (arts, orn.)
— nain.
— à feuilles étroites.
de Mahon. ♄

SÉCURINÉGA
à f. luisantes. île de F. s. ch. ♄

ADÉLIA
Acitodon. Antilles. s. ch. ♄
acuminé. Am. s. ♄
ovale.

RICIN
commun. inde. ☉ (méd. écon. orn.)
— pourpre.
vert. inde. ☉
à fruit lisse. inde. s. ch. ♄

JATROPHA	*JATROPHA*
curcas *L.*	*pignon-d'inde.* s. ch. ♄ (méd.)
multifida *L.*	*lacinié.* Antilles. s. ch. ♄
napæifolia *Encycl.*	*à f. de Napéa.* Ant. s. ch. ♄
gossypiifolia *L.*	*à f. de cotonnier.* ant. s. ch. ♄
acuminata *Encycl.* panduræfolia *Andr. Rep.*	*à f. pointues.* cuba. s. ch. ♄
LOUREIRA	*LOUREIRA*
cuneifolia *Cav. Ic.* Mozinna spatulata *Ortega, Dec.*	*cunéiforme.* mexique. s. ch. ♄
ALEURITES	*ALEURITÈS*
moluccana. Ambinux *Pers. Syn.* croton moluccanum *L.*	*Noix de Bancoul.* inde. s. ch. ♄
CROTON.	*CROTON.*
1. *Fruticosa.*	1. Tige ligneuse.
sebiferum *L.*	*Arbre à suif.* inde. s. ch. ♄ (écon.)
penicillatum *Vent. ch. de Pl.* ciliato-glanduliferum *Ortega, Dec.*	*pénicillé.* cuba. s. ch. ♄
punctatum *Jacq. Ic.*	*ponctué.* Antilles. s. ch. ♄
balsamiferum *L. Mant.*	*balsamique.* Antilles. s. ch. ♄
lacerum.	*lacéré.* s. ch. ♄
2. *Herbacea.*	2. Tige herbacée.
dioicum *Cav. Ic.*	*dioïque.* mexique. ♄
argenteum *L.*	*argenté.* Antilles. ⊙
tinctorium *L.*	*des teinturiers* ou *tournesol.* f. m. ⊙ (écon.)
lobatum *L.*	*lobé.* Antilles. s. ch. ♂
ACALYPHA	*ACALYPHA*
virginica *L.*	*de Virginie.* ⊙
alopecuroidea *Jacq. Ic.*	*queue-de-renard.* ⊙
cuspidata *Jacq. H. sch.*	*en pointe.* caracas. s. ch. ♄
virgata *L.*	*effilé.* Antilles. s. ch. ♄
scabrosa *Swartz, Prodr.*	*à feuilles rudes.* Ant. s. ch. ♄
II. Stylus unicus.	II. Un style.
TRAGIA	*TRAGIA*
volubilis *L.*	*sarmenteux.* inde. s. ch. ♄
involucrata *L.*	*à involucre.* inde. s. ch. ♄
plumosa.	*plumeux.* Antilles. s. ch. ♄
SAPIUM	*SAPIUM*
laurocerasum.	*à f. de Laurier-cerise.* Antilles. s. ch. ♄

HURA
crepitans *L.*

DALECHAMPIA
villosa *Encycl.*
scandens *L.*

SABLIER
élastique. Antilles. s. ch. ♄

DALÉCHAMPIA
sarmenteux. Antilles. s. ch. ☉

ORDO II.

CUCURBITACEÆ.

GRONOVIA
scandens *L.*

SICYOS
angulata *L.*

BRYONIA
dioica *Jacq. Austr.*
africana *L.*
palmata *L.*
laciniosa *L.*
pubescens.

MELOTHRIA
pendula *L.*

MOMORDICA
charantia *L.*
Luffa *L.*
Balsamina *L.*
Elaterium *L.*

CUCUMIS
colocynthis *L.*
prophetarum *L.*
Anguria *L.*
acutangulus *L.*
Melo *L.*
— saccharinus.
— cantalou.
— viridis.
chate *L.*
Dudaim *L.*
sativus *L.*
— minor.
flexuosus *L.*

CUCURBITA
leucantha.
— lagenaria.
— latior.

ORDRE II.

CUCURBITACÉES.

GRONOVIA
sarmenteux. vera-crux. ☉

SICYOS
anguleux. Am. s. ☉

BRYONE
dioïque. F. ♆ (méd.)
d'Afrique. cap. or. ♆
palmée. ceylan. s. ch. ♄
laciniée. ceylan. s. ch. ♄
pubescente. s. ch. ♆

MÉLOTHRIA
à fruit pendant. Am. s. ☉

MOMORDICA
charantia. Inde. ☉
Luffa. ceylan. ☉
Balsamine. Inde. ☉
concombre sauvage. F. m. ☉

CONCOMBRE
coloquinte. Barb. ☉ (méd.)
des prophètes. Arabie. ☉
d'Amérique. ☉
à angles aigus. Inde. ☉
melon. Asie. ☉ (alim. méd.)
— *brodé.*
— *cantalou.*
— *vert.*
Abdélaoui. Égypte. ☉
orange. Afr. s. ☉
commun. ☉ (alim.)
— *petit.*
serpentin. Inde. ☉

COURGE
à fleur blanche. Am. m. ☉
— *cougourde.*
— *gourde.*

— pyrotheca.
— longa.
PEPO L.
— luteus.
— viridis.
MELOPEPO L.
— verrucosus.
— aurantiiformis.
— pyriformis.
— clypeatus.
— radiatus.
CITRULLUS L.

TRICHOSANTHES
ANGUINA L.

ORDO III.

PASSIFLORÆ.

PASSIFLORA.

1. *Foliis simplicibus.*

MALIFORMIS L.

LAURIFOLIA L.
QUADRANGULARIS L.

ALATA H. K.
SERRATIFOLIA L.
CUPREA L.

2. *Foliis bilobis.*

NORMALIS L.
TUBEROSA *Jacq. H. sch.*
RUBRA L.
BIFLORA *Encycl.*

3. *Foliis trilobis.*

CILIATA H. K.
PUNCTATA L.
LUTEA L.
SUBEROSA L.
MINIMA L.
HETEROPHYLLA H. K.
ANGUSTIFOLIA *Willd sp.*
LONGIFOLIA *Encycl.*
GLAUCA *Jacq. H. sch.*
ADIANTUM *Willd. enum.*
GLABRA *Wendl. collect.*

— *poire-à-poudre.*
— *calebasse.*
PEPON. ⊙ (alim.)
— *jaune.*
— *vert.*
MÉLOPEPON. ⊙ (alim.)
— *tuberculeux.*
— *orange.*
— *pyriforme.*
— BONNET-D'ÉLECTEUR.
— *ARTICHAUX.*
PASTEQUE. orient. ⊙ (alim.)

TRICHOSANTHÈS
ANGUINA. chine. ⊙

ORDRE III.

GRENADILLES.

GRENADILLE.

1. Feuilles simples.

à gros fruit. ANTILLES. s. ch. ♄ (alim.)
à f. de Laurier. surin. s. ch. ♄
quadrangulaire. ANTILLES. s. ch. ♄ (orn.)
ailée. INDE. s. ch. ♄ (orn.)
à feuill. en scie. surin. s. ch. ♄
cuivrée. BAHAMA. s. ch. ♄

2. Feuilles bilobées.

à lobes tronqués. AM. m. s. ch. ♄
tubéreuse. AM. m. s. ch. ♄
rouge. ANTILLES. s. ch. ♄
à deux fleurs. ANT. s. ch. ♄

3. Feuilles trilobées.

ciliée. ANTILLES. s. ch. ♄
ponctuée. PÉROU s. ch. ♄
jaune. VIRGINIE. or. ♄
fongueuse. ANTILLES. s. ch. ♄
à petites fleurs. ANT. s. ch. ♄
à feuilles var. ANT. s. ch. ♄
glauque. CAYENNE. s. ch. ♄
Adiantum. s. ch. ♄

holosericea L.
peltata *cav. Diss.*
fœtida L.
incarnata L.

4. *Foliis multilobis.*

cœrulea L.
filamentosa *cav. Diss.*

CARICA
papaya L.
monoica. *Desf. Ann.*
microcarpa. *Jacq. H. sch.*
cauliflora *Jacq. H. sch.*

ORDO IV.

URTICÆ.

I. Flores in communi involucro monophyllo reconditi.

FICUS
carica L.
— violacea.
mauritiana *Encycl.*
ulmifolia *Encycl.*
symphytifolia *Encycl.*
macrophylla
nymphæifolia L. *Mant.*

laurifolia *Encycl.*
martinicensis *Willd. sp.*
citrifolia *Encycl.* (non *Willd.*)
crassinervia

benghalensis L.
rubiginosa *Vent. Malm.*
australis *Willd sp.*
populnea *Willd. sp.*
religiosa L.
racemosa L.
vestita.
phytolaccæfolia.
glaucophylla.
cordata *Thunb. Prodr.*
undulata.
pyrifolia.
arbutifolia.
microcarpa. L. *f.*

veloutée. Mexique. s. ch. ♄
en bouclier. Antilles. s. ch. ♄
fétide. Antilles. s. ch. ♄
incarnate. Brésil. s. ch. ♄

4. Feuilles à plus de trois lobes.

bleue. Brésil. or. ♄ (orn.)
filamenteuse. Antilles. s. ch. ♄

PAPAYER
commun. Inde. s. ch. ♄
monoïque. s. ch. ♄
à petit fruit. Caracas. s. ch. ♄
à tige fleurie. Caracas. s. ch. ♄

ORDRE IV.

ORTIES.

I. Fleurs renfermées dans un involucre monophylle.

FIGUIER
cultivé. F. (écon.)
— *violet.*
de l'Ile de France. s. ch. ♄
à f. d'orme. Inde. s. ch. ♄
à f. de consoude. Inde. s. ch. ♄
à grandes f. N. Holl. or. ♄
à f. de Nymphéa. Caracas. s. ch. ♄
à f. de Laurier. Ant. s. ch. ♄
à f. de citronnier. Ant. s. ch. ♄
à grosses nervures. Antilles. s. ch. ♄
du Bengale. s. ch. ♄
rouillé. N. Holl. or. ♄
à f. de Peuplier. Ant. s. ch. ♄
des pagodes. Inde. s. ch. ♄
à grappes. Inde. s. ch. ♄
écailleux. s. ch. ♄
à f. de Phytolacca. s. ch. ♄
glauque. cap. s. ch. ♄
ondulé. Antilles. s. ch. ♄
à feuilles de Poirier. s. ch. ♄
à f. d'Arbousier. Ant. s. ch. ♄

pumila L.
scandens *Encycl.*
stipulata *Willd. sp.*

DORSTENIA
contrayerva L.

II. Flores receptaculo communi multifloro impositi, aut squamis involucrantibus capitati, aut distincti sparsi.

CECROPIA
peltata L.

ARTOCARPUS
integrifolia L. *f.*

MORUS
alba L.
italica *Encycl.*
constantinopolitana.
nigra L.
rubra L.

BROUSSONETIA
papyrifera *Willd. sp.*
MORUS papyrifera L.

URTICA.

1. *Foliis alternis.*

baccifera L.
nivea L.
canadensis L.

2. *Foliis oppositis.*

pumila L.
crassifolia *Willd. sp.*
cylindrica L.
cannabina L.
dioica L.
urens L.
pilulifera L.
DODARTII L.

FORSKALEA
tenacissima L. *Mant.*
angustifolia *Willd. sp.*

PARIETARIA
officinalis L.
arborea *l'Her. stirp.*
urtica arborea L. *f.*

à réseau. chine. s. ch. ♄
sarmenteux. Antilles. s. ch. ♄

DORSTÉNIA
contrayerva. pérou. s. ch. ♆ (méd.)

II. Fleurs sur un réceptacle commun, ou réunies en une tête accompagnée d'écailles, ou distinctes et éparses.

CÉCROPIA
en bouclier. cayenne. s. ch. ♄

ARTOCARPUS
à f. entières. Antilles. s. ch. ♄

MURIER
blanc. Asie min. ♄ (écon.)
d'Italie. ♄ (écon.)
de Constantinople. ♄ (écon.)
noir. Asie min. ♄ (écon.)
rouge. Am. s. (écon.)

BROUSSONÉTIA
mûrier à papier. chine. ♄ (écon.)

ORTIE.

1. Feuilles alternes.

baccifère. Antilles. s. ch. ♄
cotonneuse. chine. or. ♄
de Canada. ♄

2. Feuilles opposées.

naine. Am. s. ♆
à f. épaisses. Ant. s. ch. ♄
cylindrique. Am. s. ♄
de Sibérie. ♆ (écon.)
dioïque. F. ♄
grièche. F. ☉
à globules. F. ☉
de Dodart. F. ☉

FORSKALÉA
à larges feuilles. barbarie. ☉
à feuilles étroites. Afr. ☉

PARIÉTAIRE
officinale. F. ♆ (méd.)
en arbre. canaries. or. ♄

HUMULUS
lupulus L.

CANNABIS
sativa L.

THELIGONUM
cynocrambe L.

DATISCA
cannabina L.

Genera urticis affinia.

PIPER
medium *Jacq. ic.*
plantagineum *Encycl.*
aduncum L.
scabrum *Encycl.*
discolorum.
umbellatum L.
celtidifolium
tuberculatum *Jacq. ic.*
cuneifolium *Jacq. ic.*
magnoliæfolium *Jacq. ic.*
portulacoides *Lmk ill.*
pereskiæfolium *Jacq. ic.*
blandum *Jacq. ic.*
rhomboidale.
suaveolens.
nitens.
pulchellum *H. K.*

IVA
frutescens L.

AMBROSIA
bidentata *Mich. Fl.*
artemisiæfolia L.
maritima L.
trifida L.
arborescens *Encycl.*
xanthium fruticosum L. *f.*
franseria ambrosioides *Cav. ic.*

XANTHIUM
strumarium L.
orientale L.
spinosum L.

HOUBLON
cultivé. ♄ (écon.)

CHANVRE
cultivé. inde. ☉ (écon.)

THÉLIGONUM
cynocrambé. F. ☉

DATISCA
chanvre de Crète. orient. ♆

Genres qui ont de l'affinité avec les Orties.

POIVRE
moyen. Antilles. s. ch. ♄
crochu. cayenne. s. ch. ♄
de deux couleurs. Ant. s. ch. ♄
ombellifère. Antilles. s. ch. ♄
à feuilles de celtis. s. ch. ♄
tuberculeux. Am. m. s. ch. ♄
cunéiforme. Antilles. s. ch. ♄
à f. de Magnolia. Ant. s. ch. ♄
à f. de Pourpier. Ile de Fr. s. ch. ♄
à f. de Péreskia. Ant. s. ch. ♆
à longs épis. Ant. s. ch. ♆
rhomboïdal. s. ch. ♆
odorant. s. ch. ♄
vernissé. s. ch. ♆
élégant. Antilles. s. ch. ♄

IVA
arbrisseau. virginie. or. ♄

AMBROISIE
à deux dents. Am. s. ♆
à feuilles d'Armoise. Am. s. ♄
maritime. F. ♄
à trois lobes. Am. s. ☉
en arbre. Pérou. or. ♄

LAMPOURDE
commune. F. ☉
d'Orient. ☉
épineuse. F. m. ☉

ORDO V.

AMENTACEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

FOTHERGILLA
- alnifolia *L. f.*
- — lanceolata.

ULMUS
- campestris *L.*
- — latifolia.
- — suberosa.
- pedunculata *Foug. Acad.*
- effusa *Willd. sp.*
- americana *L.*
- rubra *Mich. Arb.*
- fulva *Mich. Fl.*
- chinensis.
- parvifolia *Jacq. H. sch.*

PLANERA
- ulmifolia *Mich. Fl.*
- crenata.
- richardi *Mich. Fl.*
- ulmus polygama *Encycl.*
- rhamnus carpinifolius *Pall. Ross.*

II. Flores unisexuales.

CELTIS
- australis *L.*
- occidentalis *L.*
- cordata.
- crassifolia *Encycl.*
- Tournefortii *Encycl.*
- sinensis *Bosc. Dict.*
- aspera.
- missipipiensis *Bosc, Dict.*

SALIX.

1. *Folia glabra.*

- helix *L.*
- triandra *L.*
- hermaphroditica *L.*
- pentandra *L.*
- purpurea *L.*
- rubra *smith, Fl.*
- vitellina *L.*

ORDRE V.

AMENTACÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLA
- *à feuilles d'Aune.* Am. s. ♄
- *— lancéolé.*

ORME
- *champêtre.* F. ♄ (arts.)
- *— à larges feuilles.*
- *— fongueux.*
- *pédonculé.* F. ♄
- *d'Amérique.* ♄
- *rouge.* Am. s. ♄
- *de Chine.* Or. ♄

PLANÉRA
- *à feuilles d'orme.* Am. s. ♄
- *à feuilles crénelées.* Sibér. ♄

II. Fleurs unisexuelles.

MICOUCOULIER
- *de Provence.* ♄ (arts, orn.)
- *de Virginie.* ♄ (arts, orn.)
- *à feuilles en cœur.* Am. s. ♄
- *de Tournefort.* Orient. ♄
- *de Chine.* ♄
- *râpeux.* Am. s. ♄
- *du Missipipi.* ♄

SAULE.

1. Feuilles glabres.

- *nélix.* F. ♄
- *à trois étamines.* F. ♄
- *hermaphrodite.* F. ♄
- *à cinq étamines.* F. ♄
- *pourpre.* F. ♄
- *rouge.* F. ♄
- *osier jaune.* F. ♄

nigra *Willd. sp.*	*noir.* Am. s. ♄
fragilis L.	*fragile.* F. ♄
præcox *Willd. sp.*	*précoce.* F. ♄
amygdalina L.	*à feuilles d'Amandier.* F. ♄
babylonica L.	*pleureur.* orient. ♄
pontederana *Willd. sp.*	*de Pontédéra.* Alpes. ♄
myrsinites L.	*Myrsinitès.* Alpes. ♄
retusa L.	*émoussé.* F. ♄
2. *Folia villosa.*	2. Feuilles velues.
reticulata L.	*à réseau.* Alpes. ♄
incubacea L.	*des dunes.* F. ♄
fusca L. / incubacea *Encycl.*	*brunâtre.* F. ♄
lanata. / arenaria L. ?	*laineux.* Alpes. ♄
riparia *Willd. sp.* / lavandulæfolia *Lapeyr. Fl.*	*à f. de Lavande.* Pyrénées. ♄
alba L.	*blanc.* F. ♄
viminalis L.	*à longues feuilles.* F. ♄
acuminata *Smith, Fl.*	*acuminé.* F. ♄
aurita L.	*auriculé.* F. ♄
aquatica *Smith, Fl.*	*aquatique.* F. ♄
caprea L.	*Marceau.* F. ♄
POPULUS	*PEUPLIER*
alba L.	*blanc.* F. ♄
—grisea.	*— grisaille.*
tremula L.	*Tremble.* F. ♄
grandidentata *Mich. Arbr.*	*à grandes dents.* Am. s. ♄
græca *H. K.*	*d'Athènes.* orient. or. ♄
fastigiata / dilatata *Willd. sp.*	*d'Italie.* ♄
nigra L.	*noir.* F. ♄
hudsoniana *Mich. Arbr.*	*de la baie de Hudson.* ♄
virginiana / molinifera *H. K.*	*suisse.* Am. s. ♄
canadensis *Mich. Arbr.*	*de Canada.* ♄
angulata *H. K.*	*anguleux* ou *de Caroline.* ♄
marilandica *Bosc, Dict.*	*de Mariland.* ♄
heterophylla L. / argentea *Mich. Arbr.*	*argenté.* Am. s. ♄
balsamifera L.	*Baumier.* Am. s. ♄
candicans *Willd. sp.*	*blanchâtre.* Am. s. ♄
MYRICA	*MYRICA*
Gale L.	*Galé.* F. ♄
cerifera L.	*cirier de la Louis.* ♄ (écon.)
pensylvanica / caroliniensis *Willd. sp.*	*de Pensylvanie.* ♄ (écon.)

cordifolia L.
quercifolia L.
serrata *Encycl.*
faya *H. K.*
trifoliata.
rhus suaveolens L.

à feuilles en cœur. cap. or. ♄
à feuilles de chêne. cap. or. ♄
à feuilles en scie. cap. or. ♄
Faya. madère. or. ♄
à feuilles ternées. am. s. ♄

BETULA

alba L.
populifolia *Mich. Arbr.*
nigra *H. K.*
lutea *Mich. Arbr.*
papyrifera *Mich. Fl.*
lenta L.
excelsa *Willd. sp.*
nana L.
pumila L.

BOULEAU

blanc. f. ♄ (écon.)
à feuill. de peuplier. am. s. ♄
noir. am. s. ♄
jaune. am. s. ♄
à papier. am. s. ♄
merisier. am. s. ♄
élevé. am. s. ♄
nain. sibérie. ♄
à feuill. de marceau. am. s. ♄

ALNUS

communis.
glutinosa *Willd. sp.*
—laciniata.
subrotunda
incana *Willd. sp.*
serrulata *Willd. sp.*
cordata.

AUNE

commun. f. ♄
— lacinié
à feuilles arrondies. am. s. ♄
blanc. alpes. ♄
à feuilles en scie. am. s. ♄
à feuilles en cœur. ♄

CARPINUS

betulus L.
—quercifolius.
americana L.
virginiana L.
ostrya virginiana *Willd. sp.*
ostrya L.
ostrya vulgaris *Willd. sp.*
—americana.

CHARME

commun. f. ♄
— à feuilles de chêne.
d'Amérique. ♄
de Virginie. ♄
houblon. italie. ♄
d'Amérique.

FAGUS

sylvatica L.
purpurea
ferruginea *Willd. sp.*

HÊTRE

des bois. f. ♄
pourpre. am. s. ♄ (orn.)

CASTANEA

vesca *Willd. sp.*
fagus castanea L.
pumila *Willd. sp.*
fagus pumila L.

CHATAIGNIER

commun. f. ♄ (écon.)
chincapin. am. s. ♄ (écon.)

QUERCUS.

1. *Foliis perennantibus.*

CHÊNE.

1. Feuilles persistantes.

ilex L.
yeuse. f. ♄

—integrifolia.	—*à feuilles entières.*
—longifolia.	—*à feuilles longues.*
suber L.	*Liége.* F. m. or. ♄ (écon.)
ballota *Desf. Atl.*	*Ballote* ou *à glands doux.* Alger. or. ♄ (écon.)
coccifera L.	*au Kermès.* F. m. ♄
cinerea *Mich. Arbr.*	*cendré.* Am. s. ♄
virens *Mich. Arbr.*	*verdoyant.* Am. s. ♄
2. *Foliis deciduis.*	2. Feuilles tombantes.
phellos L.	*à feuilles de saule.* Am. s. ♄
pseudo-suber *Desf. Atl.*	*faux Liége.* Alger. ♄
ægylopifolia *Encycl.*	*à feuilles d'Ægylops.* F. ♄
crinita *Bosc, Dict.*	*crinite.* F. ♄
cerris L.	*cerris.* F. ♄
Tauza *Bosc, Dict.* / pubescens *Willd.*	*Tauzin.* F. ♄
lusitanica *Bosc, Dict.*	*de Portugal.* ♄
infectoria *Oliv. Itin.*	*à la noix de galle.* Perse. ♄
prasina *Bosc. Dict.*	*Prase.* Portugal. ♄
rubra L.	*rouge.* Am. s. ♄
coccinea *Mich. Arbr.*	*écarlate.* Am. s. ♄
catesbæi *Mich. Arbr.*	*de Catesby.* Am. s. ♄
obtusiloba *Mich. Arbr.*	*à lobes obtus.* Am. s. ♄
aquatica L.	*aquatique.* Am. s. ♄
pannosa *Bosc. Dict.* / discolor *Mich. Arbr.*	*velouté.* Am. s. ♄
tinctoria *Mich. Arbr.*	*Quercitron.* Am. s. ♄ (écon.)
Prinus *Mich. Arbr.*	*Prinus.* Am. s. ♄
alba L.	*blanc.* Am. s. ♄
Robur L.	*Rouvre.* F. ♄
pedunculata *Willd. sp.*	*pédonculé.* F. ♄
fastigiata *Encycl.*	*pyramidal.* Portugal. ♄
apennina *Encycl.*	*des Apennins.* ♄
Corylus	*Noisetier*
rostrata *H. K.*	*cornu.* Am. s. ♄
americana *Mich. Arbr.*	*d'Amérique.* ♄
Avellana L.	*Avelinier.* F. ♄
tubulosa *Willd. sp.*	*Avelinier rouge.* F. ♄
colurna L.	*glabre.* orient. ♄
bizantina	*de Byzance.* ♄
Liquidambar	*Copalme*
styraciflua L.	*d'Amérique.* ♄
imberbe *H. K.*	*d'Orient.* ♄
Comptonia	*Comptonia*
asplenifolia *H. K.*	*à f. d'Asplénium.* Am. s. ♄

PLATANUS
orientalis L.
— acerifolia.
occidentalis L.

PLATANE
d'Orient. ♄ (orn. écon.)
— à feuilles d'érable.
d'Occident. AM. S. ♄ (orn. écon.)

ORDO VI.

CONIFERÆ.

EPHEDRA
monostachya L.
distachya L.
altissima *Desf. Atl.*

CASUARINA
equisetifolia L. *f.*
torulosa *H. K.*
stricta *H. K.*
distyla *vent. H. cels.*
quadridentata.

TAXUS
baccata.

PODOCARPUS
elongata *l'Her. Mss.*
TAXUS elongata *H. K.*

JUNIPERUS
communis L.
— suecica.
oxycedrus L.
bermudiana L.
virginiana L.
phœnicea L.
sabina mas *C. B.*
sabina fœmina *C. B.*
thurifera *H. K.*
prostrata *Mich. Fl.*
excelsa *Willd. sp.*
Hermanni *Pers. syn.*

CUPRESSUS
sempervirens L.
— horizontalis.
pendula *l'Her. stirp.*
lusitanica *Mill. Dict.*
thyoides L.
juniperoides L.

ORDRE VI.

CONIFÈRES.

EPHÉDRA
à un épi. sibérie. ♄
à deux épis. F. ♄
élevé. BARBARIE. ♄

CASUARINA
à f. de prêle. INDE. S. CH. ♄
tuberculeux N. HOLL. OR. ♄
ramassé. N. HOLL. OR. ♄
à quatre dents. N. HOLL. OR. ♄

IF
commun F. ♄ (écon.)

PODOCARPUS
allongé. CAP. OR. ♄

GENÉVRIER
commun. F. ♄ (écon.)
— de Suède.
cade. F. ♄ (écon.)
des Bermudes. ♄ (écon.)
de Virginie. ♄ (orn. écon.)
de Phénicie. F. M. OR. ♄
sabine mâle. F. ♄ (méd. orn.)
sabine femelle. F. ♄ (méd.)
à l'encens. ESPAGNE. ♄
couché. AM. S. ♄
élevé. ORIENT. ♄

CYPRÈS
pyramidal. CRÈTE. ♄ (écon.)
— horizontal.
pendant. GOA. OR. ♄
faux Thuya. AM. S. ♄ (écon.)
faux Genévrier. CAP. OR. ♄

SCHUBERTIA *Mirbel.*	*SCHOUBERTIA*
disticha. } cupressus disticha L. }	*cyprès chauve.* ♄ (écon.)
THUYA	*THUYA*
occidentalis L.	*d'Occident.* AM. S. ♄ (orn.)
orientalis L.	*de la Chine.* ♄ (orn.)
articulata *Vahl, symb.*	*articulé.* BARBARIE. OR. ♄ (écon.)
PINUS	*PIN*
sylvestris L.	*sauvage.* ♄
— genevensis.	— *de Genève.*
— rubra.	— *rouge.*
LARICIO *Encycl.*	*LARICIO.* CORSE ♄
MUGHUS *Willd. sp.*	*MUGO.* ALPES. ♄
PUMILIO *Willd. sp.*	*PUMILIO.* CARINTHIE. ♄
MARITIMA *Encycl.*	*MARITIME* F. ♄ (écon.)
PINEA L.	*à pignons.* F. M. ♄ (écon.)
HALEPENSIS *Willd. sp.*	*d'Alep.* F. ♄
MITIS *Mich. fl.*	*jaune.* AM. S. ♄
TÆDA L.	*téda.* AM. S. ♄
RIGIDA *Mich. Arbr.*	*épineux.* AM. S. ♄
INOPS *Mich. Arbr.*	*chétif.* ♄
PALUSTRIS *Willd. sp.* } AUSTRALIS *Mich. Arbr.* }	*de marais.* AM. S. ♄
STROBUS L.	*de Weimouth.* AM. S. ♄ (écon.)
ADUNCA *Bosc.*	*de Monteray.* ♄
CEMBRO L.	*cembro.* ALPES. ♄
ABIES	*SAPIN*
taxifolia. } PINUS PICEA L. }	*argenté.* F. ♄ (écon.)
BALSAMEA L.	*baumier de Gilead.* AM. S. ♄ (méd.)
CANADENSIS *Mich. Arbr.*	*HÉMELOCK-SPRUCE.* AM. S. ♄ (orn.)
NIGRA *Mich. Arbr.*	*sapinette noire.* AM. S. ♄
ALBA *Mich. Arbr.*	*sapinette blanche.* AM. S. ♄
PICEA. } PINUS ABIES L. }	*EPICIA.* F. ♄ (écon.)
COLUMBARIA.	*hérissé.* ÎLE NORFOLCK. OR. ♄
LARIX	*MÉLÈZE*
europæa } PINUS LARIX L. }	*d'Europe.* ALPES. ♄ (écon.)
AMERICANA *Mich. fl.* } PINUS MICROCARPA *Lambert, pin.* }	*d'Amérique.* ♄
CEDRUS. } PINUS CEDRUS L. }	*cèdre du Liban.* ASIE MIN. ♄ (orn.)

Genera incertæ sedis.

POLLICHIA
campestris *H. K.*
Nekeria campestris *Gmel. syst.*

ARDISIA
crenulata *Vent. ch. de Pl.*

CHLORANTHUS
inconspicuus *L'Her. sert.*

AZIMA
tetracantha *Encycl.*
Monetia barlerioides *L'Her. stirp.*

MONOTROPA
hypopitys *L.*

EUCLEA
racemosa *L. f.*

ARISTOTELIA
macqui *L'Her. stirp.*

SARRACENIA
purpurea *L.*
flava *L.*

BEGONIA
nitida *H. K.*
obliqua *L'Her. stirp.*
minor *Jacq. ic.*
purpurea *Swartz, prodr.*
dichotoma *Jacq. ic.*
suaveolens.
humilis *Willd. sp.*
hirsuta *Aublet, Guyan.*
discolor *H. K.*

COMMERSONIA
echinata *L. f.*

ANTIDESMA
alexiteria *L.*

POGONIA
debilis *Andr. Rep.*
scabra.

BALANOPTERIS
rothila *Gærtn. Fruct.*

Genres non classés.

POLLICHIA
des champs. cap. or. ♂

ARDISIA
crénelé. Antilles. s. ch. ♄

CHLORANTHUS
à petites fleurs. chine. s. ch. ♄

AZIMA
à quatre épines. inde. s. ch. ♄

MONOTROPA
hypopitys. F. ♌

EUCLÉA
à grappes. cap. or. ♄

ARISTOTÉLIA
macqui. chili. or. ♄

SARRACÉNIA
pourpre. Am. s. ♆
jaune. Am. s. ♌

BÉGONIA
luisant Antilles. s. ch. ♄
dicotome. caracas. s. ch. ♄
odorant. s. ch. ♄
nain. inde. s. ch. ♂
hérissé. cayenne. s. ch. ♂
discolor. chine. s. ch. ♌

COMMERSONIA
à fruit hérissé. otaiti. s. ch. ♄

ANTIDESMA
alexitère. Ile de Fr. s. ch. ♄

POGONIA
à tiges grêles. N. Holl. or. ♄
à feuilles rudes. N. Holl. or. ♄

BALANOPTÉRIS
rothila. inde. s. ch. ♄

CONDALIA microphylla *cav. ic.*	*CONDALIA* *à petites feuilles.* chili. s. ch. ♄
SAMYDA serrulata *L.*	*SAMYDA* *à feuilles en scie.* ant. s. ch. ♄
CORIARIA myrtifolia *L.*	*REDOUL* *à feuill. de myrte.* F. ♄ (écon.)
PANDANUS odoratissimus *Jacq. Fragm.* utilis *Willd. Enum.*	*VACOUA* *odorant.* madagascar. s. ch. ♄
GINKGO biloba *L. Mant.* salisburia adiantifolia *Smith, Soc. L.*	*GINKGO* *bilobé.* chine. ♄ (écon.)

FIN.

INDEX GENERUM.

A

Abies.	*Page* 247	Alcina.	*Page* 127
Abroma.	175	Aletris.	28
Abrus.	220	Aleurites.	236
Acacia	207	Alisma.	26
Acalypha.	236	ALISMACEÆ.	*Ibid.*
ACANTHEÆ.	61	Allamanda.	93
Acanthus.	*Ibid.*	Allium.	32
Acer.	159	Allophyllus.	159
ACERA.	*Ibid.*	Alnus.	244
Achillea.	125	Aloe.	28
Achras.	94	Alopecurus.	11
Achyranthes.	53	Alsine.	181
Aconithum.	148	Alstroemeria.	33
Acorus.	7	Althæa.	170
Acrostichum.	2	Alyssum.	155
Actæa.	149	AMARANTI.	52
Adansonia.	173	Amarantus.	*Ibid.*
Adelia.	235	Amaryllis.	34
Adenanthera.	210	Ambrosia.	241
Adiantum.	4	Ambrosinia.	6
Adonis.	146	Amellus.	129
Adoxa.	190	AMENTACEÆ.	242
Ægilops.	16	Amethystea.	66
Ægiphila.	64	Amirola.	159
Ægopodium.	138	Ammi.	143
Æschinomene.	226	Amomum.	59
Æsculus.	159	Amorpha.	220
Æthusa.	140	Amygdalus.	206
Agapanthus.	33	Amyris.	228
Agave.	*Ibid.*	Anacardium.	227
Ageratum.	116	Anacyclus.	117
Agrimonia.	203	Anagallis.	57
Agriphyllum.	130	Anagyris.	211
Agrostemma.	185	Anamenia.	146
Agrostis.	13	Anarrhinum.	78
Agyneia.	235	Anastatica.	156
Aira.	16	Anchusa.	87
Ajuga.	69	Ancistrum.	202
Aizoon.	193	Andrachne.	235
Albuca.	31	Andromeda.	97
Alchimilla.	203	Andropogon.	15

Androsace.	*Page* 57	Aroideæ.	*Page* 6
Andryala.	105	Artemisia.	112
Anemone.	146	Artocarpus.	240
Anethum.	139	Arum.	6
Angelica.	141	Arundo.	21
Anigozanthos.	34	Asarum.	43
Anona.	174	Asclepias.	93
Anonæ.	174	Ascyrum.	160
Anthemis.	124	Asparagineæ.	23
Anthericum.	29	Asparagus.	*Ibid.*
Antholiza.	38	Asperugo.	87
Anthospermum.	134	Asperula.	132
Anthoxanthum.	10	Asphodelus.	30
Anthyllis.	215	Aspidium.	2
Antidesma.	248	Asplenium.	3
Antirrhinum.	78	Asprella.	18
Apargia.	104	Aster.	121
Aphyllantes.	25	Astragalus.	221
Apium.	139	Astrantia.	144
Apocyneæ.	92	Athamanta.	142
Apocynum.	*Ibid.*	Athanasia.	117
Aquilegia.	148	Atractylis.	108
Arachis.	215	Atragene.	145
Aralia.	138	Atraphaxis.	47
Araliæ.	*Ibid.*	Atriplex.	51
Arbutus.	97	Atriplicæ.	49
Arctium.	108	Atropa.	81
Arctotis.	130	Aucuba.	232
Ardisia.	248	Avena.	21
Arduinia.	93	Averrhoa.	229
Arenaria.	182	Aurantia.	161
Aretia.	57	Axyris.	52
Argemone.	149	Ayenia.	173
Aristida.	14	Aylantus.	228
Aristolochiæ.	42	Aytonia.	163
Aristolochia.	*Ibid.*	Azalea.	95
Aristotelia.	248	Azima	248

B

Baccharis.	114	Banksia.	45
Balanites.	161	Barleria.	61
Balanopteris.	248	Basella.	50
Balbisia.	129	Bauhinia.	211
Ballota.	75	Beckmannia.	12
Balsamita.	111	Befaria.	96
Baltimora.	127	Begonia.	248
Banisteria.	160	Bellis.	117

Bellium. Page 119
Berberides. 175
Berberis. Ibid.
Beta. 50
Betonica. 72
Betula. 244
Bidens. 129
Bignonia. 90
Bignoniæ. 90
Billardiera. 84
Biscutella. 154
Biserrula. 225
Bistropogon. 71
Bixa. 177
Blackwellia. 207
Blakea. 199
Blechnum. 5
Blitum. 52
Bocconia. 150
Boebera. 120
Boerhaavia. 55
Boltonia. 121
Bombax. 173
Bonplandia. 89
Bontia. 84
Boragineæ. 84
Borago. 87
Borbonia. 212
Boronia. Page 179
Bosea. 49
Botrychium. 1
Brassica. 151
Briza. 21
Bromelia. 55
Bromus. 18
Broussonetia. 240
Browallia. 79
Brucea. 228
Brunia. 252
Brunnichia. 47
Brunsfelsia. 84
Bryonia. 257
Bubon. 140
Bucida. 43
Budleia. 76
Bufonia. 181
Bulliarda. 187
Bunias. 157
Bunium. 145
Buphthalmum. 126
Buplevrum. 143
Bursera. 228
Butomus. 26
Buxus. 255
Byttneria. 173

C

Cacalia. 115
Cachrys. 142
Cacti. 191
Cactus. Ibid.
Cæsalpinia. 210
Cakile. 157
Caladium. 6
Calceolaria. 78
Calea. 117
Calendula. 119
Calla. 6
Callicarpa. 64
Callicoma. 190
Calligonum. 48
Callistachys. 212
Callitriche. 5
Caltha. 149
Calycanthus. 207
Calyptranthes. 198
Calyxymenia. 55
Camellia. 162
Cameraria. 92
Campanula. 98
Campanulaceæ. Ibid.
Camphorosma. 49
Canarina. 98
Canna. 59
Cannabis. 241
Cannæ. 59
Cantua. 89
Capparideæ. 157
Capparis. 158
Capraria. 76
Caprifolia. 136

Capsicum. Page 85
Cardamine. 154
Cardiospermum. 158
Carduus. 107
Carex. 7
Carica. 259
Carlina. 108
Carpesium. 112
Carpinus. 244
Carthamus. 108
Carum. 139
Caryophylleæ. 180
Caryota. 22
Cassia. 209
Cassine. 250
Castanea. 244
Casuarina. 246
Catabrosa. 16
Catananche. 106
Caucalis. 143
Ceanothus. 252
Cecropia. 240
Cedrela. 163
Celastrus. 229
Celosia. 55
Celsia. 79
Celtis. 242
Cenchrus. 15
Centaurea. 109
Centunculus. 56
Cephalanthus. 135
Cephalophora. 116
Cerastium. 181
Ceratonia. 209
Ceratophyllum. 5
Cerbera. 93
Cercis. 211
Cercodia. 195
Cerinthe. 85
Cestrum. 84
Ceterach. 2
Chærophyllum. 139
Chamærops. 22
Chamagrostis. 14
Chara. 5
Cheilanthes. 4
Cheiranthus. 152
Chelidonium. 150
Chelone. Page 99
Chenopodium. 51
Cherleria. 182
Chiococca. 135
Chionanthus. 67
Chironia. 91
Chlora. *Ibid.*
Chloranthus. 248
Chloris. 15
Chondrilla. 101
Chondrosum. 15
Chorizema. 212
Chrysanthemum. 118
Chrysocoma. 115
Chrysophyllum. 94
Chrysosplenium. 190
Cicer. 225
Cichorium. 106
Cicuta. 140
Cinara. 107
Cineraria. 125
Cinna. 10
Circæa. 196
Cissus. 163
Cisti. 177
Cistus. *Ibid.*
Citharexylum. 65
Citrus. 162
Claytonia. 193
Clematis. 145
Cleome. 157
Cleonia. 76
Clerodendrum. 64
Clethra. 97
Cliffortia. 205
Clinopodium. 74
Clitoria. 220
Clusia. 161
Clutia. 255
Clypeola. 154
Cneorum. 228
Cnicus. 106
Cobœa. 89
Coccoloba. 40
Cochlearia. 155
Coffea. 133
Coïx. 22
Colchicaceæ. 27

Colchicum. *Page* 27
Colletia. 231
Collinsonia. 68
Columnea. 58
Colutea. 221
Comarum. 204
Commelina. 26
COMMELINEÆ. *Ibid.*
Commersonia. 248
Comocladia. 228
Comptonia. 243
Condalia. 249
CONIFERÆ. 246
Conium. 143
Convallaria. 24
CONVOLVULACEÆ. 88
Convolvulus. *Ibid.*
Conyza. 114
Cookia. 161
Corchorus. 176
Cordia. 84
Coreopsis. 127
Coriandrum. 140
Coriaria. 249
Coris. 57
Corispermum. 52
Cornucopiæ. 11
Cornus. 137
Cornutia. 64
Coronilla. 225
Coronopus. 155
Correa. 179
Corrigiola. 195
Cortusa. 58
Corylus. 245
Cosmos. 128
Costus. 40
Cotula. 117
Cotyledon. 188
Crambe. 157
Crassula. 187
Cratægus. *Page* 206
Cratæva. 158
Crepis. 103
Crescentia. 84
Crinum. 34
Crithmum. 142
Crocus. 38
Crotalaria. 214
Croton. 236
Crovea. 179
Crucianella. 135
CRUCIFERÆ. 150
Crypsis. 11
Cucubalus. 185
Cucumis. 237
Cucurbita. *Ibid.*
CUCURBITACEÆ. *Ibid.*
Cuminum. 140
Cupania. 159
Cuphea. 199
Cupressus. 246
Curcuma. 40
Cuscuta. 89
Cussonia. 138
Cyanella. 31
CYCADEÆ. 4
Cycas. *Ibid.*
Cyclamen. 58
Cydonia. 200
Cymbidium. 41
Cynanchum. 93
Cynodon. 12
Cynoglossum. 87
Cynosurus. 17
CYPEROIDEÆ. 7
Cyperus. 10
Cypripedium. 41
Cyrilla. 97
Cyrthantus. 54
Cytisus. 215

D

Dactylis. 17
Dahlia. 127
Dais. 44
Dalbergia. 226
Dalea. 215
Dalechampia. 237
Danthonia. 20
Daphne. 44

Datisca. Page 241
Datura. 80
Davallia. 4
Daucus. 143
Daviesia. 212
Decumaria. 198
Delphinium. 148
Dentaria. 154
Dianella. 23
Dianthus. 183
Diasia. 58
Dichondra. 85
Dictamnus. 179
Diervilla. 136
Digitalis. 78
Digitaria. 12
Dillenia. 174
Dineba. 17
Dioscorea. 25
Diosma. 180
Diospyros. 94
Diotis. 117
Dipsaceæ. Page 130
Dipsacus. 131
Dirca. 44
Disandra. 60
Disodium. 127
Dodartia. 77
Dodecatheon. 58
Dodonæa. 229
Dolichos. 219
Dombeya. 175
Dorianthes. 55
Doronicum. 120
Dorstenia. 240
Draba. 155
Dracæna. 25
Dracocephalum. 75
Dracontium. 7
Drepania. 105
Drimmia. 30
Drosera. 158
Dryas. 205
Duranta. 65

E

Ebenus. 215
Echeandia. 29
Echinaria. 16
Echinophora. 144
Echinops. 111
Echioides. 87
Echium. 86
Eclypta. 126
Ehretia. 84
Ehrharta. 22
Elæagneæ. 43
Elæagnus. *Ibid.*
Elæodendrum. 231
Elatine. 181
Elephantopus. 111
Eleusine. 17
Elichrysum. 113
Ellisia. 85
Elymus. 17
Embothrium. 45
Empetrum. 98
Encelia. 127
Ephedra. 246
Epidendrum. 42
Epigæa. 97
Epilobium. 196
Epimedium. 175
Epipactis. 41
Equisetaceæ 4
Equisetum. 4
Erianthus. 14
Erica. 96
Ericæ. *Ibid.*
Erigeron. 121
Erinus. 60
Eriocephalus. 119
Eriogonum. 49
Eriophorum. 9
Eriospermum. 31
Erodium. 166
Ervum. 225
Eryngium. 144
Erysimum. 152
Erythrina. 220
Erythronium. 27
Erythroxylum. 180

Ethulia. Page 111
Eucalyptus. 198
Euclea. 248
Eucomis. 50
Eugenia. 198
Evolvulus. 89
Evonymus. 229
Eupatorium. Page 116
Euphorbia. 253
Euphorbiaceæ. 252
Euphoria. 159
Euphrasia. 60
Eutaxia. 212

F

Faba. 225
Fabricia. 197
Fagara. 228
Fagonia. 179
Fagus. 244
Fedia. 152
Ferraria. 56
Ferula. 142
Festuca. 19
Ficoideæ. 193
Ficus. 259
Filago. 115
Filices. 1
Flacurtia. 176
Flaveria. 111
Flosculosæ. 106
Fontanesia. 63
Forskalea. 240
Fothergilla. 242
Fragaria. 204
Frankenia. 186
Fraxinus. 62
Fritillaria. 27
Fuchsia. 197
Fumaria. 150

G

Galanthus. 55
Galardia. 129
Galaxia. 58
Galega. 223
Galenia. 49
Galeobdolon. 72
Galeopsis. *Ibid.*
Galinsoga. 129
Galium. 133
Gardenia. 134
Garidella. 148
Gastridium. 13
Gaultheria. 97
Gaura. 196
Genista. 212
Gentiana. 91
Gentianeæ. *Ibid.*
Geoffræa. 226
Gerania. 164
Geranium. 166
Geropogon. 105
Gesneria. 99
Geum. 204
Ginkgo. 249
Githago. 185
Gladiolus. 58
Glaux. 199
Glecoma. 72
Gleditsia. 209
Glinus. 193
Globba. 59
Globularia. 58
Glycine. 220
Glycyrrhiza. 223
Gnaphalium. 113
Gnidia. 44
Gomphrena. 53
Goodenia. 100
Goodia. 214
Gordonia. 175
Gorteria. 120
Gossypium. 172
Gouania. 252
Gramineæ. 10

Grangea. Page 112
Gratiola. 79
Grewia. 176
Grindelia. 120
Gronovia. 257
GUAIACANÆ. 94
GUAIACUM. 179
Guazuma. 173
Guettarda. Page 135
Guilandina. 210
GUTTIFERÆ. 161
Gymnocladus. 209
Gymnostyles. 111
Gypsophila. 182
Gyrocarpos. 160

H

Hæmanthus. 33
Hæmatoxylum. 210
Hakea. 45
Halesia. 95
Halleria. 76
Hamamelis. 175
Hamellia. 135
Hebenstreitia. 66
Hedera. 137
Hedychium. 40
Hedysarum. 226
Helenium. 119
Helianthemum. 177
Helianthus. 128
Heliconia. 59
Helicteres. 173
Heliocarpus. 176
Heliophila. 152
Heliotropium. 85
Helleborus. 148
Helmintia. 104
Helonias. 27
Hemerocallis. 33
Hemitomus. 79
Heracleum. 141
Hermannia. 175
Hernandia. 46
Herniaria. 54
Hesperis. 152
Heterosperma. 129
Heuchera. 189
Hibiscus. 171
Hieracium. 102
Hippia. 111
Hippocratea. 160
Hippocrepis. 225
Hippophae. 43
Hippuris. 5
Hoffmenseggia. 210
Holcus. 15
Holosteum. 180
Homalium. 207
Hopea. 95
Hordeum. 18
Horminum. 75
Hornemannia. 78
Hortensia. 190
Hottonia. 57
Houstonia. 134
Humea. 111
Humulus. 241
Hura. 237
Hyacinthus. 30
Hydrangea. 190
HYDROCHARIDÉÆ. 42
Hydrocharis. *Ibid.*
Hydrocotyle. 144
Hydroglossum. 1
Hydrophyllum. 85
Hymenea. 211
Hyosciamus. 80
Hyoseris. 103
Hypecoum. 150
HYPERICA. 160
Hypericum. 160
Hypochæris. 105
Hypoxis. 35
Hyptis. 72
Hyssopus. 70

I

Jambolifera.	*Page* 174	Iresine.	*Page* 55
Jasione.	100	Irideæ.	36
Jasmineæ.	62	Iris.	*Ibid.*
Jasminum.	63	Isatis.	157
Jatropha.	236	Isnardia.	199
Iberis.	156	Isopyrum.	148
Ilex.	230	Itea.	96
Illecebrum.	53	Iva.	241
Illicium.	174	Juglans.	229
Impatiens.	167	Junceæ.	25
Imperatoria.	139	Juncus.	*Ibid.*
Indigofera.	223	Juniperus.	246
Inga.	209	Jussiæa.	196
Inula.	120	Justicia.	61
Ionidium.	178	Ixia.	57
Ipomœa.	88	Ixora.	135

K

Kæmpferia.	40	Kirganelia.	235
Kalankoe.	188	Kitaibelia.	168
Kalmia.	95	Knautia.	132
Kiggellaria.	235	Koelreuteria.	158
Killingia.	10	Kuhnia.	116

L

Labiatæ.	66	Laserpitium.	141
Lachenalia.	51	Lasiopetalum.	232
Lachnea.	44	Latania.	23
Lactuca.	101	Lathræa.	61
Lagasca.	111	Lathyrus.	225
Lagerstromia.	199	Lavandula.	70
Lagoecia.	145	Lavatera.	169
Lagunea.	172	Laurineæ.	46
Lagurus.	14	Laurus.	*Ibid.*
Lamarkia.	17	Lawsonia.	199
Lamium.	72	Ledum.	95
Lampsana.	100	Leersia.	11
Lantana.	65	Leguminosæ.	207
Larix.	247	Lemna.	5
Larrea.	179	Leonurus.	73

Lepidium. Page 156
Leptospermum. 197
Lessertia. 221
Leucoium. 35
Leuzea. 108
Liatris. 115
Ligusticum. 141
Ligustrum. 64
LILIACEÆ. 27
Lilium. 28
Limodorum. 41
Limonia. 162
Limosella. 57
Linaria. 77
Lindernia. 79
Linnæa. 156
Linum. 186
Liquidambar. 245
Liriodendrum. 174
Lithospermum. 86
Littorella. 55
Lobelia. Page 99
Lolium. 17
Lomandra. 25
Lonicera. 136
Lopezia. 195
Lotus. 218
Loureira. 256
Ludolphia. 13
Ludwigia. 196
Lunaria. 154
Lupinus. 214
Luzula. 25
Lychnis. 185
Lycium. 83
Lycopersicum. 81
Lycopsis. 87
Lycopus. 66
Lygeum. 22
Lysimachia. 57
LYSIMACHIÆ. 56
Lythrum. 199

M

Madia. 119
Magnolia. 174
MAGNOLIÆ. *Ibid.*
Mahernia. 176
Maianthemum. 24
Malachra. 170
Malaxis. 41
Malope. 168
Malpighia. 160
MALPIGHIACEÆ. *Ibid.*
Malva. 169
MALVACEÆ. 168
Malvaviscus. 172
Malus. 199
Mammea. 161
Mangifera. 227
Manulea. 60
Maranta. 40
Marrubium. 73
Marsilea. 4
Martynia. 90
Massonia. 30
Matricaria. 117
Medeola. 23
Medicago. 217
Melaleuca. 197
Melampodium. 127
Melampyrum. 60
Melastoma. 199
MELASTOMÆ. *Ibid.*
Melia. 163
MELIACEÆ. *Ibid.*
Melianthus. 180
Melica. 16
Melilotus. 216
Melissa. 74
Melittis. 75
Melochia. 172
Melotria. 257
MENISPERMA. 175
Menispermum. 175
Mentha. 71
Mentzelia. 197
Menziezia. 96
Menyanthes. 58
Mercurialis. 252

Merendera. Page 27
Mesembryanthemum. 193
Mespilus. 201
Messerschmidia. 85
Methonica. 27
Metrosideros. 197
Michauxia. 98
Micropus. 113
Milium. 13
Milleria. 119
Mimosa. 209
Mimulus. 79
Minuartia. 180
Mirabilis. 55
Mitchella. 135
Mitella. 190
Mœrenghia. 181
Mogorium. 63
Molinia. 16
Mollugo. 180
Molucella. 74
Momordica. Page 27
Monarda. 66
Monotropa. 248
Monsonia. 167
Montia. 195
Moræa. 57
Morina. 130
Moringa. 210
Morus. 240
Murraya. 162
Musa. 59
Musæ. Ibid.
Muscari. 30
Myagrum. 157
Myosotis. 87
Myosurus. 147
Myrica. 245
Myriophyllum. 195
Myrsine. 94
Myrti. 197
Myrtus. 198

N

Naiades. 5
Naias. Ibid.
Nandina. 175
Napæa. 170
Narcisseæ. 53
Narcissus. Ibid.
Nardus. 22
Narthecium. 27
Nemesia. 78
Neottia. 41
Nepeta. 70
Nerium. 92
Nicandra. 81
Nicotiana. 80
Nigella. 148
Nitraria. 195
Nolana. 87
Notelæa. 65
Nyctagineæ. 55
Nymphæa. 42
Nyssa. 43

O

Ocymum. 75
OEdera. 111
OEnanthe. 140
OEnothera. 196
Olea. 63
Onagræ. 195
Onoclea. 3
Ononis. 214
Onopordon. 107
Onosma. 86
Opercularia. 135
Ophioglossum. 1
Ophrys. 41
Ophyoxylum. 93
Orchideæ. 40
Orchis. Ibid.

	Page		Page
Origanum.	74	Osmundā.	2
Ornithogalum.	31	Osteospermum.	119
Ornithopus.	225	Osyris.	45
Orobanche.	60	Othonna.	124
Orobus.	224	Oxalis.	167
Orontium.	7	Oxylobium.	212
Ortegia.	180	Oxytropis.	221
Oryza.	22		

P

Pæderia.	155	Perilla.	70
Pæonia.	159	Periploca.	92
Palavia.	168	Peronia.	40
Paliurus.	231	Persoonia.	46
Pallasia.	49	Peiveria.	49
Palmæ.	22	Peucedanum.	142
Panax.	138	Phaca.	221
Pancratium.	55	Phalangium.	29
Pandanus.	249	Phalaris.	11
Panicum.	12	Pharnaceum.	181
Papaver.	149	Phaseolus.	219
Papaveraceæ.	*Ibid.*	Phellandrium.	140
Parietaria.	240	Philadelphus.	199
Paris.	23	Phillyrea.	65
Parkinsonia.	209	Philyca.	232
Parnassia.	158	Phleum.	11
Paronychia.	53	Phlomis.	73
Parthenium.	126	Phlox.	89
Paschalia.	129	Phœnix.	22
Paspalum.	12	Phormium.	31
Passerina.	44	Phyllanthus.	234
Passifloræ.	238	Phyllis.	134
Passiflora.	*Ibid.*	Physalis.	81
Pastinaca.	139	Phyteuma.	99
Paullinia.	158	Phytolacca.	49
Pavonia.	170	Picridium.	105
Pectis.	119	Picris.	104
Pediculares.	58	Pilularia.	4
Pedicularis.	60	Pimpinella.	138
Peganum.	179	Pinguicula.	58
Pelargonium.	164	Pinkneia.	134
Penicillaria.	14	Pinus.	247
Pentapetes.	173	Piper.	241
Penstemon.	90	Piqueria.	116
Penthorum.	189	Piscidia.	220
Peplis.	199	Pisonia.	53

Pistacia.	*Page* 228	Pomaderris.	*Page* 251
Pisum.	224	Pontederia.	38
Pitcairnia.	28	Populus.	245
Pittosporum.	251	Porliera.	179
Planera.	242	Portesia.	165
PLANTAGINEÆ.	54	Portulaca.	192
Plantago.	*Ibid.*	Portulacaria.	193
Platanus.	246	PORTULACEÆ.	192
Platilobium.	212	Potamogeton.	5
Plectrantus.	75	Potentilla.	203
Plocama.	155	Poterium.	202
PLUMBAGINEÆ.	56	Pothos.	7
Plumbago.	*Ibid.*	Prasium.	76
Plumiera.	92	Prenanthes.	101
Poa.	20	Primula.	57
Podalyria.	211	Prinos.	250
Podocarpus.	246	Priva.	65
Podophyllum.	149	Proserpinaca.	195
Pogonia.	248	Protea.	45
Poinciana.	210	PROTEACEÆ.	*Ibid.*
POLEMONIACEÆ.	89	Prunella.	76
Polemonium.	*Ibid.*	Prunus.	205
Polianthes.	55	Psidium.	198
Pollichia.	248	Psoralea.	215
Polycarpea.	180	Psychotria.	155
Polycarpon.	*Ibid.*	Ptelea.	229
Polycnemum.	49	Pteranthus.	49
Polygala.	58	Pteris.	3
Polygonatum.	24	Pterocarpus.	227
POLYGONEÆ.	46	Pulmonaria.	86
Polygonum.	47	Punica.	198
Polymnia.	127	Pyrola.	97
Polypodium.	2	Pyrus.	200
Polypogon.	14		

Q

Quercus.	244	Queria	180

R

RADIATÆ.	117	RANUNCULACEÆ.	145
Rafnia.	214	Ranunculus.	146
Rajania.	24	Raphanus.	159
Ramonda.	80	Ravenala.	59
Randia.	134	Rauvolfia.	93

Reaumuria.	*Page* 193	Robinia.	*Page* 220
Reseda.	158	Rondeletia.	134
Rhagadiolus.	100	Rosa.	201
Rhamnoideæ.	229	Rosaceæ.	199
Rhamnus.	230	Rosmarinus.	67
Rhapis.	23	Rottbollia.	16
Rheum.	48	Royena.	95
Rhinanthus.	60	Rubentia.	230
Rhizospermæ.	4	Rubia.	134
Rhododendra.	95	Rubiaceæ.	132
Rhododendrum.	*Ibid.*	Rubus.	205
Rhodora.	*Ibid.*	Rudbeckia.	128
Rhus.	227	Ruellia.	61
Ribes.	191	Rumex.	47
Ricinus.	235	Ruppia.	5
Ricotia.	154	Ruscus.	24
Rindera.	87	Ruta.	179
Rivina	49	Rutaceæ.	*Ibid.*

S

Sabal.	22	Satureia.	70
Saccharum.	14	Saururus.	5
Sagina.	181	Saxifraga.	189
Sagittaria.	26	Saxifragæ.	*Ibid.*
Salicariæ.	199	Scabiosa.	131
Salicornia.	52	Scandix.	140
Salix.	242	Scheuchzeria.	26
Salsola.	50	Schinus.	228
Salvia.	67	Schizandra.	175
Sambucus.	137	Schkuhria.	120
Samolus.	58	Schœnus.	9
Samyda.	249	Schrankia.	209
Sanguinaria.	149	Scilla.	51
Sanguisorba.	202	Scirpus.	9
Sanicula.	144	Scleranthus.	195
Sanseveria.	28	Sclerocarpus.	127
Santolina.	117	Scolopendrium.	3
Sanvitalia.	128	Scolymus.	106
Sapindi.	158	Scoparia.	76
Sapindus.	*Ibid.*	Scorpiurus.	225
Sapium.	236	Scorzonera.	104
Saponaria.	182	Schottia.	209
Sapotæ.	94	Scrophularia.	76
Saracha.	81	Scrophulariæ.	*Ibid.*
Sarothra.	91	Scutellaria.	75
Sarracenia.	248	Secale.	12

Securidaca. Page 227
Securinega. 255
Sedum. 188
Selago. 66
Selinum. 142
SEMIFLOSCULOSÆ. 100
SEMPERVIVÆ. 187
Sempervivum. 189
Senebiera. 156
Senecio. 123
Serapias. 41
Serjania. 158
Seriola. 105
Serissa. 135
Serratula. 108
Sesamum. 90
Seseli. 139
Sesleria. 17
Sesuvium. 167
Sherardia. 132
Sibbaldia. 205
Sibthorpia. 60
Sicyos. 237
Sida. 170
Sideritis. 71
Sideroxylum. 94
Sigosbeckia. 126
Silene. 184
Silphium. 127
Sinapis. 151
Sison. 140
Sisymbrium. 153
Sisyrinchium. 36
Sium. 141
Smilacina. 24
Smilax. *Ibid.*
Smyrnium. 139
Solandra. 81
SOLANEÆ. 79
Solanum. 82
Soldanella. 58
Solidago, Page 122
Sonchus. 101
Sophora. 211
Sorbus. 200
Sorghum. 14
Spaendoncea. 210
Sparganium. 7
Spartina. 16
Spartium. 213
Spergula. 181
Spermacoce. 134
Sphæranthus. 111
Sphærolobium. 212
Spielmannia. 65
Spigelia. 92
Spilanthus. 130
Spinacia. 50
Spiræa. 205
Spondias. 228
Stachys. 72
Stachytarpheta. 65
Stæhelina. 108
Stapelia. 92
Staphylea. 229
Statice. 56
Stellaria. 182
Stellera. 44
Sterculia. 175
Stevia. 116
Stipa. 14
Stratiotes. 42
Strelitzia. 59
Struthiola. 44
Stuartia. 173
Styphelia. 98
Styrax. 95
Swertia. 91
Swietenia. 163
Symphoricarpos. 136
Symphitum 86
Syringa. 62

T

Tabernæmontana. 92
Tagetes. 120
Talinum. 192
Tamarindus. 209
Tamarix. 195
Tamus. 25

Tanacetum. *Page* 112
Taraxacum. 104
Tarchonanthus. 117
Taxus. 246
Telephium. 195
Terebinthaceæ. 227
Terminalia. 43
Ternstromia. 162
Tetragonia. 195
Teucrium. 69
Thalictrum. 145
Thapsia. 139
Thea. 162
Theligonum. 241
Theophrasta. 93
Thesium. 43
Thlaspi. 156
Thuya. 247
Thymbra. 74
Thymeleæ. 44
Thymus. 74
Tiarella. 190
Tigridia. 56
Tilia. 176
Tiliaceæ. 175
Tillæa. 187
Tillandsia. 55
Tordylium. 143
Tormentilla. 203
Tournefortia. 85
Trachelium. 99
Tradescantia. *Page* 26
Tragia. 236
Tragopogon. 105
Tragus. 15
Trapa. 195
Trianthema. 195
Tribulus. 179
Trichilia. 165
Trichodium. 15
Trichosanthes. 258
Trientalis. 57
Trifolium. 216
Triglochin. 26
Trigonella. 218
Triguera. 80
Trillium. 25
Triopteris. 160
Triosteum. 136
Triplaris. 48
Tripsacum. 15
Triticum. 18
Tritoma. 28
Triumfetta. 176
Trollius. 148
Tropæolum. 167
Tulipa. 27
Turnera. 192
Turritis. 151
Tussilago. 114
Typha. 7
Typhæ. 7

U

Ulex. 212
Ulmus. 242
Umbelliferæ. 138
Uniola. 21
Urena. 170
Urospermum. 105
Urtica. 240
Urticeæ. 239
Usteria. 78
Utricularia. 58
Uvularia. 27

V

Vaccinium. 97
Valantia. 134
Valerianeæ 132
Valeriana. *Ibid.*
Vallisneria. 42
Vanilla. 42
Varronia. 85
Velezia. 186

Vella. Page 157
Veltheimia. 28
Veratrum. 27
Verbascum. 79
Verbena. 66
Verbesina. 129
Vernonia. 115
Veronica. 59
Viburnum. 136
Vicia. 224
Vieusseuxia. 57
Villarsia. 91
Viminaria. Page 212
Vinca. 92
Viola. 178
Virgilia. 211
Viscum. 156
Visnea. 95
VITES. 163
Vitex. 64
VITICEÆ. 64
Vitis. 163
Volkameria. 64

W

Wachendorfia. 38
Waldsteinia. 202
Waltheria. 175
Westeringia. 67
Winterania. 163
Woodwardia. 3

X

Xanthium. 241
Xeranthemum. 113
Ximenesia. 127
Xylophylla. 235

Y

Yucca. 28

Z

Zacintha. 104
Zamia. 4
Zanichellia. 5
Zanthorhiza. 149
Zanthoxylum. 228
Zappania. 65
Zea. 22
Zinnia. 129
Ziziphora. 66
Ziziphus. 231
Zoegea. 109
Zygophyllum. 179

SUPPLÉMENT.

Nota. Ce Supplément renferme plusieurs plantes que le Jardin royal a acquises depuis la publication de mon Tableau, et autres que j'avois omises. J'y indique aussi un nombre assez considérable d'espèces cultivées dans les pepinières du Roi, près Versailles, dans les jardins de MM. Cels, Noisette et autres, qui manquent à la collection du Jardin des Plantes, et que l'on pourra facilement se procurer par des échanges.

Je me fais un devoir et un plaisir de déclarer ici que mon collègue, M. Bosc, m'a beaucoup aidé dans ce travail, en me communiquant des observations qu'une longue expérience lui a acquises sur plusieurs arbres et arbrisseaux étrangers, dont il a enrichi les pépinières du Roi, et qu'il y cultive avec un grand succès.

ACER hybridum *bosc. dict.*	*ERABLE hybride.* AM. S. ♄
nigrum *mich. arbr.*	*noir.* AM. S. ♄
ACOSMUS pruriens *desvaux.*	*ACOSMUS piquant.* S. CH. ♄
ADELIA acuminata, *p.* 235.	
BORIA acuminata *willd. sp.*	
ligustrina *mich. fl.*	*à feuill. de troëne.* AM. S. ♄
BORIA ligustrina *willd. sp.*	
AGRIPHYLLUM grandiflorum.	
RHORIA grandiflora *thunb. prodr.*	*AGRIPHYLLUM à grande fleur.* CAP. OR. ♄
BERCKHEIA grandiflora *willd. sp.*	
ALNUS macrophylla.	*AUNE à grandes feuilles.* ♄
oblongata *willd. sp.*	*à feuill. oblongues.* EUROPE. ♄
rubra.	*rouge.* ♄
ANDROMEDA acuminata *h. k.*	*ANDROMEDA acuminé.* AM. S. ♄
canescens.	*velouté.* AM. S.? ♄
lanceolata.	*lancéolé.* AM. S.? ♄
ANNONA grandiflora.	
ORCHIDOCARPON grandiflorum *mich. fl.*	*ANNONE à grandes fleurs.* AM. S. ♄
ANNONA parviflora.	
ORCHIDOCARPON parviflorum *mich. fl.*	*à petites fleurs.* AM. S. ♄
ANNONA pygmæa *mich. fl.*	
ORCHIDOCARPON pygmæum *mich. fl.*	*petite.* AM. S. ♄
ANTHEMIS elongata.	*ANTHÉMIS à longs pédoncules.* ☉
ARALIA pubescens *dec. cat.*	*ARALIA pubescent.* N. ESP. S. CH. ♄
ARCTOTIS anthemoides *l.*	*ARCTOTIS anthémoïde.* CAP. ☉
ARISTOLOCHIA tomentosa *bot. mag.*	*ARISTOLOCHE cotonneuse.* AM. S. ♄
ARTEDIA squamata *l.*	*ARTÉDIA écailleux.* ORIENT. ☉
ARUM pumilum.	*ARUM petit.* AM. S. ♆
ARUNDO ægyptia.	*ROSEAU d'Egypte.* ♆
ASCLEPIAS angustifolia *willd. h. ber.*	*ACLÉPIAS à f. étroites.* MEXIQUE? S. CH. ♄
ASPARAGUS amarus *dec. cat.*	*ASPERGE à gros fruit.* F. ♆
ASTER canus *jacq. hort.*	*ASTER incane.* ALLEM. ♆
ericoides, *p.* 123, *deleat. l.* et *mich. fl. subjice.*	
multiflorus *willd. sp.*	

heterophyllus *willd. Enum.*	*à feuill. changeantes.* Am. s. ♆
leptophyllus.	*à feuilles grêles.* ♆
lithospermifolius *H. p.* / altaicus *willd. Enum.*	*à feuill. de grémil.* sibérie. ♄
paniculatus *willd. sp.*	*paniculé.* Am. s. ♄
pannonicus *wald. et kitt. hung.*	*de Hongrie.* ♄
pendulus *willd. sp.?*	*à rameaux inclinés.* Am. s. ♆
reflexus *L.*	*recourbé.* cap. or. ♄
secundiflorus.	*à grappes unilatérales.* ♆
sparsiflorus *Mich. Fl.*	*à fleurs éparses.* Am. s. ♄
Astragalus micranthus *Desvaux, Journ.*	*Astragale à petites fleurs.* ♆
Atragene sibirica *Bot. Magaz.* / alpina *Pallas, Ross.*	*Atragéne de Sibérie.* ♆
Atriplex salina *Desvaux, Journ.*	*Arroche des marais.* F. ☉
Ballota discolor.	*Ballota discolor.* or. ♄
parvifolia.	*à petites feuilles* or. ♄
Barleria lactea.	*Barléria à fl. blanches.* s. ch. ♄
Betonica stricta *H. K.* (an varietas).	*Bétoine à fleurs serrées* F. ♆
Betula fruticans *Pallas, Ross.*	*Bétula arbrisseau.* Russie. ♄
pontica.	*de Pont.* ♄
pubescens *willd. sp.*	*pubescent.* F. ♄
rubra *Mich. Arbr.*	*rouge.* Am. s. ♄
Buchnera viscosa *H. K.*	*Buchnéra visqueux.* cap. or. ♄
Cacalia villosa *Jacq. Ic.* / Senecio purpureus *willd. sp.*	*Cacalia velu.* cap. or. ♄
Caladium pinnatifidum *willd. sp.* / Arum pinnatifidum *Jacq. H. sch.*	*Caladium pinnatifide.* caracas. s. ch. ♄
Calycanthus nanus *Dum. cours. Bot. cult.*	*Calycanthus nain.* Am. s. ♄
Campanula lactiflora *Fischer.*	*Campanula à fl. blanche* Russie. ♆
versicolor *Smith, Fl. Græcæ, Prodr.*	*versicolor.* orient. or. ♄
Carduus tenuiflorus *Smith, Fl.*	*Chardon à fleurs menues.* F. ☉
Cassia sulcata *Dec. Cat.*	*Casse sillonnée.* s. ch. ♄
Chrysanthemum broussonetii *Pers. Syn.* / Pyrethrum grandiflorum *willd. Enum.*	*Chrysanthéme de Broussonet.* canaries. or. ♄
Cineraria heterophylla.	*Cinéraire à feuilles variables.* ♄
platanifolia.	*à feuilles de platane.* s. ch. ♄
Cnicus araneosus.	*Cnicus à tête cotonneuse.* ♂
semipinnatus. / carduus pratensis *Encycl.*	*pinnatifide.* F. ♄
Commelina pallida *willd. H. Ber.* / rubens *Red. Lil.*	*Commélina à fleur pâle.* Am. m. s. ch. ♆
stricta.	*ramassée.* s. ch. ♆
Corchorus japonicus *Willd. sp.*	*Corchorus du Japon.* or. ♄
Cornus canadensis *L.*	*Cornouiller de Canada.* ♆

Crassula dejecta *Jacq. h. sch.*	*Crassule étalée.* cap. or. ♄
Cratægus sorbifolia.	*Alisier à feuilles de cormier.* ♄
Croton lineare *Jacq. Am.*	*Croton à f. linéaires.* ant. s. ch. ♄
Croton punctatum *Jacq. pele*, et quinquepartitum.	Croton mucronatum *Willd. sp. subjice*, *p.* 256.
variegatum *L.*	*à cinq lobes.* s. ch. ♄
	panaché. inde. s. ch. ♄
Cucumis lineatus *Bosc. Journ. d'Hist. nat.*	*Concombre strié.* cayenne. ⊙
Cupressus disticha *L. p.* 247.	
Taxodium distichum *Richard, Ann. du Mus.*	
Curtisia faginea *H. K.*	*Curtisia à f. de hêtre.* cap. or. ♄
Cyclamen coum *Willd. sp.*	*Cyclamen de Cos.* or. ♃
Cytisus albidus *Dec. cat.*	*Cytise blanc.* or. ♄
alpinus *Willd. Enum.*	*des Alpes.* ♄.
purpureus *Scop. carn.*	*pourpre.* carniole. ♄
Dalea purpurea *Vent. H. cels.*	*Daléa à fl. pourpres.* Am. s. ♃
Daphne altaica *Pallas, Ross.*	*Daphné de Sibérie.* ♄
oleoides *L. mant.*	*à feuill. d'olivier.* orient. or. ♄
Dioscoræa waltheri.	*Dioscoræa de Walther.* Am. s. ♃
Dombeya erithroxylum *Willd. sp.*	*Dombeya de deux couleurs.* île sainte-Hélène. s. ch. ♄
Donia fruticosa.	
glutinosa *H. K.*	
inula glutinosa, *p.* 121.	*Donia arbrisseau.* or. ♄
doronicum glutinosum *Willd. sp.*	
squarrosa *Bot. Magaz.*	*à calice rude.* Am s.? ♃
Draba fladniziensis *Jacq. miscel.*	*Draba de Fladniz.* ♆
Echium parviflorum *Willd. Enum.*	*Vipérine à petites fleurs.* maroc. ⊙
Equisetum variegatum *Willd. sp.*	*Prêle rameuse.* f. ♆
ramosum *Dec. Fl.*	
Erodium lucidum *Lapeyr. Fl. pyren.*	*Erodium luisant.* pyrénées. ♃
Erythrina velutina *Willd. sp*	*Erythrina velouté.* carac. s. ch. ♄
Exacum viscosum *Smith. ic. pict.*	*Exacum visqueux.* canaries. or. ♆
Fagus comptoniifolia (varietas)	*Hêtre à feuilles de comptonia.* ♄
Festuca multiflora *Walther.*	*Festuca à fl. nombreuses.* Am. s. ♄
Flemingia trinervia.	*Flémingia à trois nervures.* île de fr. s. ch. ♄ (légumineuses).
Fraxinus caroliniana *Willd. sp.*	*Frêne de Caroline.* or. ♄
lancea *Bosc. Dict.*	*à feuilles en lance.* Am. s. ♄
longifolia *Willd. sp.*	*à longues feuilles.* Am. s. ♄
nigra *Bosc. Dict.*	*noir.* Am. s. ♄
pallida *Bosc. Dict.*	*vert-pâle.* Am. s. ♄
parvifolia *Encycl.*	*à petites feuilles.* Esp. ♄
Richardi *Bosc. Dict.*	*de Richard.* Am. s. ♄
viridis *Mich. Arbr.*	*vert.* Am. s. ♄
Fumaria formosa *H. K.*	*Fumeterre à gr. fleurs.* Am. s. ♆
Galium ellipticum *Willd. En. suppl.*	*Caillelait elliptique.* ♆

Goodia lotifolia *h. k.*	*Goodia à feuill. de lotier.* n. holl. or. ♄ (légumineuses).
Grindelia inulòides, *p.* 120.	
Inula serrata *pers. syn.*	
Helianthemum alpestre.	
Cistus alpestris *jacq. fl. austr.*	*Hélianthème des Alpes.* ♄
œlandicus *jacq.* ibid. (an lin.)	
Hermannia flammea *jacq. h. sch.*	*Hermannia couleur de feu.* cap. or. ♄
tenuifolia *bot. magaz.*	*à feuilles menues.* cap. or. ♄
Hieracium foliosum *willd. sp.*	*Epervière feuillue.* hongrie. ♄
lævigatum *willd. h. ber.*	*lisse.* ♆
ramosum *willd. sp.*	*rameuse.* hongrie. ♆
scabrum.	*à tiges rudes.* ♄
tubulosum, *p.* 102, species distincta ab H. intybaceo.	
Hibbertia crenata *andr. rep.*	Hibbertia *à f. crenelées.* n. holl. or. ♄
grossulariæfolia *bot. magaz.*	
Hyosciamus ægyptiacus.	*Jusquiame d'Egypte.* or. ♄
senecionis *willd. enum.*	
Iberis nudicaulis, *p.* 156.	
Guepinia iberis *bastard, fl. suppl.*	
Teesdalia nudicaulis *h. k.*	
Ilex dahoon *mich. fl.*	*Houx Dahoon.* caroline. or. ♄
opaca *h. k.*	*opaque.* am. s. ♄
Iris triflora *balbis, add.*	*Iris à trois fleurs.* ♆
Ixora americana *jacq. h. sch.*	*Ixora d'Amérique.* mexiq. s. ch. ♄
Juglans amara *mich. arbr.*	*Noyer amer.* am. s. ♄
aquatica *mich. arbr.*	*aquatique.* am. s. ♄
squamosa *mich. arbr.*	*écailleux.* am. s. ♄
Juncus bicornis *mich. fl.*	*Jonc à deux cornes.* am. s. ♄
Juniperus rigida.	*Génévrier à feuilles roides.* n. holl. or. ♄
Laurus diospyroides *mich. fl.*	*Laurier à feuilles de diospyros.* am. s. ♄
glaucescens.	*glaucescent.* ♄
Leonurus multifidus.	*Léonurus laciniè.* ☉
Linaria viscosa.	
Antirrhinum viscosum *bot. magaz.* (an lin.).	*Linaire visqueuse.* rsp. ☉
Lithospermum dispermum *l. dec.*	
retortum *pallas, itin.* (eadem *marsch.*).	*Gremil à deux graines*, sibérie. ☉
Lobelia alata *bill. n. holl.*	*Lobélia ailé.* n. holl. or. ♆
lutea *l.*	*à fleurs jaunes.* cap. or. ♆
Lonicera balearica.	
Caprifolium balearicum *dum. cours. bot. cult.*	*Chèvrefeuille de Mahon.* ♄
Lupinus perennis *bot. magaz.*	*Lupin vivace.* am. s. ♄
Madia mellosa *jacq. h. sch.*	*Madia à fl. pédonculées.* chili. ☉

Malvaviscus mollis.	*Malvaviscus velouté.* s. ch. ♄
Achania mollis *H. K.*	
Manulea alternifolia, *p.* 60.	
Buchnera fœtida *Jacq. H. sch.*	
Melaleuca chlorantha *Bonpl. Malm.*	*Melaleuca à fleurs blanches.* N. Holl. or. ♄
Melochia varroniæfolia.	*Mélochia à f. de varronia.* s. ch. ♄
Mespilus carolina *Encycl.*	*de Caroline.* ♄
celsiana *Dum. cours. suppl.*	*de Cels.* orient. ♄
elliptica *Bosc.*	*elliptique.* Am. s. ♄
eriocarpa *Dec. syn.* tomentosa *Willd. sp.*	*à fruit velu.* F. ♄
fissa *Bosc.*	*incisée.* Am. s. ♄
flabellata *Bosc.*	*en évantail.* ♄
flavescens *Bosc.*	*jaunâtre.* ♄
heterophylla *Flugge, Ann.*	*à feuilles variables.* ♄
lobata *Bosc.*	*lobée.* Am. s. ♄
lucida *Dum. cours. Bot. cult.*	*luisante.* Am. s. ♄
nigra *Willd. sp.*	*à fruit noir.* sibérie. ♄
obovata *Bosc.*	*ovale-renversée.* ♄
odorata *Andr. Rep.*	*odorante.* ♄
oliveriana *Dum. cours. B. cult.*	*d'olivier.* perse. ♄
orientalis *Bosc.*	*d'Orient.* ♄
parvifolia. cratægus parvifolia *Willd. sp.*	*à petites f.* pinchaw. Am. s. ♄
pectinata *Dum. cours. Bot. cult.*	*pectinée.* orient. ♄
prunellifolia *Bosc.*	*à feuill. de prunellier.* Am. s. ♄
purpurea *Bosc.*	*pourpre.* ♄
quinqueloba *Bosc.*	*à cinq lobes.* Am. s. ♄
trifoliata *Bosc.*	*trifoliée.* orient. ♄
Metrosyderos crassifolia *Dum. cours. suppl.*	*Métrosydéros à feuill. épaisses.* N. Holl. or. ♄
citrina.	*à fleurs pâles.* N. Holl. or. ♄
Mirabilis hybrida *Willd. Enum.*	*Mirabilis hybride.* ♆
Morus tartarica *L.*	*Murier de Tartarie.* ♄
Narcissus polyanthos *Delongch. Sav. Etr.*	*Narcisse à fleurs nombreuses.* F. ♆
subalbidus *Delongch. Sav. Etr.*	*blanchâtre.* F. ♄
Nauenburgia trinervata *Willd. sp.*	*Navenburgia à trois nervures.* Am. m. ☉
Brotera contrayerva *Schrad. Journal.*	
Nicotiana humilis.	*Nicotiane petite.* ☉
Ochroma lagopus *Willd. sp.*	*Ochroma lagopus.* Antilles. s. ch. ♄
Œnothera salicifolia.	*Onagre à feuilles de saule.* ♂
Olea exasperata *Jacq. H. sch.*	*Olivier tuberculeux.* cap. or. ♄
Ornithopus lotoides *Viviani, Fragm.*	*Ornithopus à feuilles de lotier.* Italie. ☉
Osmunda struthiopteris *L.* Struthiopteris germanica *Willd. sp.*	*Osmonde d'Allemagne.* ♃

Pachysandra procumbens *mich. fl.*	*Pachysandra à tige tombante.* am. s. ♄
Pancratium parviflorum.	*Pancratium à petites fleurs.* ♄
Paullinia caracasana *jacq. h. sch.*	*Paullinia de Caracas.* s. ch. ♄
cauliflora *jacq. ic.*	*cauliflore.* caracas. s. ch. ♄
Peucedanum petroselinum.	*Peucédanum à feuill. de persil.* ♄
Phyllanthus ellipticus.	*Phyllanthus à f. elliptiq.* s. ch. ♄
ovatus.	*à feuilles ovales.* s. ch. ♄
Pinus tournefortii.	*Pin de Tournefort.* asie. ♄
Pittosporum sinense, *p.* 251.	
Pittosporum viridiflorum *bot. magaz.*	
Picris sprengeriana, *p.* 104.	
Picris pauciflora *willd. sp.*	
Poa cristata *l. p.* 20.	
Koeleria cristata *pers. syn.*	
Pogostemon plectranthoides *desf. mém. du mus.*	*Pogostémon à feuilles de plectranthus.* s. ch. ♄ (labiées).
Populus tremuloides *mich. arbr.*	*Peuplier, faux tremble.* am. s. ♄
Pothos digitata *jacq. ic.*	*Pothos digité.* caracas. s. ch. ♄
lanceolata *l.*	*lancéolé.* barbade. s. ch. ♄
Prenanthes hispida, *p.* 101, chondrillæ species.	
Prinos ambiguus *mich. fl.*	*Prinos de Caroline.* ♄
lanceolatus.	*lancéolé.* ♄
longifolius.	*à longues feuilles.* ♄
prunifolius.	*à feuilles de prunier.* ♄
Prunus acuminata *mich. fl.*	*Prunier acuminé.* am. s. ♄
chicasa *mich. fl.*	*chicasaw.* caroline. ♄
pensylvanica *willd. sp.*	*de Pensylvanie.* ♄
borealis *mich. arbr.*	
pendula.	*pendant.* ♄
sphærocarpa *mich. fl.*	*à fruit rond.* am. s. ♄
susquihana *dum. cours. suppl.*	*susquihana.* am. s. ♄
Pterospermum acerifolium *cav. diss.*	*Ptérosperme à feuilles d'érable.* inde. s. ch. ♄
Pulmonaria mollis *schrad. dec. cat.*	*Pulmonaire veloutée.* allem. ♄
Pultenæa daphnoides *smith, soc. lin.*	*Pultenæa à feuilles de daphné.* n. holl. or. ♄
Pyrus michauxii *bosc. dict.*	*Poirier de Michaux.* am. s. ♄
Quercus banisteri *mich. arbr.*	*Chêne de Banister.* am. s. ♄
prinus monticola *mich. arbr.*	*prinus de montagnes.* am. s. ♄
Rhamnus latifolius *l'her. sert.*	*Nerprun à larges feuill.* acores. ♄
Rhododendrum azaloides.	*Rhododendrum à feuilles d'azaléa.* ♄ (an species hybrida).
catesbæum *dum. cours. suppl.*	*de Catesby.* am. s. ♄
Rhus elegans *h. k.*	*Sumac élégant.* am. s. ♄
Ribes palmatum.	*Groseillier à feuilles palmées.* ♄
Rosa corymbosa *bosc. dict.*	*Rosier corymbifère.*
damascena *willd. spec.*	*de Damas.* f. ♄

pyratina *Bosc. Dict.*	*d'Evrath.* caroline. ♄
montana *Vill. Delph.*	*de montagne.* Alpes. ♄
pensylvanica *Mich. Fl.*	*de Pensylvanie.* ♄
pimpinellifolia.	*à feuill. de Pimprenelle.* F. ♄
rubrispina *Bosc. Dict.*	*à épines rouges.* Am. s. ♄
sulphurea minor.	*jaune petit.* ♄
trifoliata *Bosc. Dict.*	*trifolié.* chine. ♄
turgida *Pers. Syn.* / rapa *Bosc. Dict.*	*turneps.* Écosse. ♄

Santolina pinnata *Viviani, Fragm.* distincta species a S. eriophora, *p.* 117.

Saracha procumbens. / Atropa procumbens *Cav. Ic.*	*Saracha à tiges tombantes.* mexique. ☉
Saxifraga ajugæfolia *L.*	*Saxifrage à feuilles d'Ajuga.* pyrénées. ♃
aquatica *Lapeyr. Fl. Pyren.* / petræa *Gouan. Ill.* / ascendens *Willd. Sp.*	*aquatique.* pyrénées. ♆
aretioides *Lapeyr. Fl. Pyren.*	*arétioïde.* pyrénées. ♃
groelandica *L.*	*du Groëland.* pyrénées. ♃
luteo-purpurea *Lapeyr. Fl. Pyren.*	*jaune-pourpre.* pyrénées. ♆
nervosa *Lapeyr. Fl. Pyren.*	*à nervures.* pyrénées. ♃.
ranunculoides.	*à feuilles de renoncule.* ♆
Scutellaria orientalis *L.*	*Scutellaire d'Orient.* or. ♆
Salix acutifolia *Willd. Sp.* / violacea *Andr. Rep.*	*Saule violet.* ♄
aquatica *Smith, Fl.*	*aquatique.* F. ♄
aurita *Smith, Fl.*	*auriculé.* F. ♄
bicolor *Willd. Sp.*	*bicolor.* Allem. ♄
caroliniana *Mich. Fl.* / nigra *Willd. Sp.*	*de Caroline.* ♄
cinerea *L.*	*cendré.* F. ♄
discolor *Willd. Sp.*	*de deux couleurs.* Am. s. ♄
forbyana *Willd. Sp.*	*Forbyana.* Angleterre. ♄
lambertiana *Smith, Fl.*	*de Lambert.* Angleterre. ♄
malifolia *Willd. Sp.*	*à feuill. de Pommier.* Angl. ♄
phylicifolia *L.*	*à feuilles de Phylica.* ♄
prunifolia *Smith, Fl.*	*à feuilles de Prunier.* Écosse. ♄
repens *Smith, Fl.*	*rampant.* F. ♄
russeliana *Willd. Sp.*	*de Russel.* F. ♄
sphacelata *Willd. Sp.*	*sphacélé.* F. ♄
spathulata *Willd. Sp.*	*en spatule.* F. ♄
starkeana *Willd. Sp.*	*de Starke.* silésie. ♄
undulata *Willd. Sp.*	*ondulé.* Allem. ♄
Salvia clusii *Jacq. H. Sch.*	*Sauge de l'Ecluse.* orient. or. ♄
forskalæi *L. Mant.*	*de Forskal.* orient. ♃
Sida crispa *L.*	Sida *crépu.* Antilles. ☉
pseudo-Abutilon.	*faux Abutilon.* ☉
pulchella *Willd. Enum.*	*élégant.* N. Holl. or. ♄

Sisymbrium crysimifolium, *p.* 153, deleatur *syn.* Sisymbrium allioni *pers. syn.*

Sonchus acuminatus *willd. sp.*	*Laitron à f. pointues.* am. s. ☉
pinnatifidus.	*pinnafide Madère ?* or. ♄
virgatus.	*effilé.* am. s. ☉
prænanthes virgata *mich. fl.*	
Spiræa acutifolia *willd. enum.*	*Spiræa à feuilles aiguës.* ♄
alpina *willd. sp.*	*lancéolé.* russie. ♄
oblongifolia *wald. et kitt.*	*à feuill. oblongues.* hongrie. ♄
ulmifolia *willd. sp.*	*à feuill. d'orme.* carniole. ♄
Stevia laxiflora *dec. mss.*	*Stévia à fl. lâches.* mexique. or. ♆
ovata *willd. sp.*	*à feuill. ovales.* mexique. or. ♆

Thalictrum rugosum, *p.* 146, dele, et Th. vaginatum subjice.

Thuya australis. *bosc.*	*Thuya des terres australes.* or. ♄
inæqualis.	*à écailles inégales.* ♄
Thunbergia fragrans *willd. sp.*	*Thunbergia odorant.* inde. s. ch. ♄
Tilia rubra *dec. cat.*	*Tilleul rouge.* f. ♄
mississipiensis *bosc. dict.*	*du Misissipi.* ♄
Tordylium sulcatum.	*Tordylium sillonné.* ♆
Trifolium suaveolens *willd. h. ber.*	*Trèfle odorant.* perse. ☉
Ulmus viscosa.	*Orme visqueux.* am. s. ♄
striata *bosc. dict.*	*strié.* am. s.? ♄
Vaccinium arboreum *mich. fl.*	*Myrtille arborescent.* am. s. ♄
arctostaphylos *andr. rep.*	*d'Orient.* ♄
frondosum *l.*	*feuillu.* am. s. ♄
glaucum *mich. fl.*	*glauque.* am. s. ♄
ligustrinum *l.*	*à feuilles de troëne.* am. s. ♄
myrsinites *mich. fl.*	*myrtoïde.* am. s. ♄
nigrum.	*à fruit noir.* ♄
nitidum *andr. rep.*	*luisant.* am. s. ♄
resinosum *mich. fl.*	*résineux.* am. s. ♄
Viburnum acuminatum.	*Viorne acuminée.* am. s. ♄
edule *mich. fl.*	*comestible.* am. s. ♄
Ervum gracile *dec. suppl.*	*Lentille grêle.* f. m. ☉
Vicia gracilis *lois. fl.*	
Vicia serratifolia *jacq. austr.*	*Vesce à feuill. en scie.* autriche. ☉
Viola pedata. *l.*	*Violette digitée.* am. s. ♅

Yucca boscii Hort. paris. quæ floruit in horto dicto *Litta* juxta Milanum, est genus novum Agave affine. *Balbis* in litteris.

FIN.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
580.7D45T2 C001
TABLEAU DE L'ECOLE DE BOTANIQUE DU JARDI
3 0112 009913325